

22726/B

1/-





36492
FLORA
PRUSSICA,
SIVE

PLANTÆ
IN REGNO PRUSSIÆ
SPONTE NASCENTES.

Quarum Catalogum & Nomina

JOHANNES LOESELII

Phil. & Med. Doct. & P.P. Ordinarius.

Olim differuit,

Nunc additis nitidissimis Iconibus Rariorum,
partim ab aliis nondum delineatarum plerarumq;
Prussiae propriarum & invilinarum Plantarum,
Earundemque accuratâ descriptione,
NEC NON

Adjectis Synonymiis Veterum Botanico-
rum, interspersisq; Observationibus Historico-Philolo-
gico-Criticis & Medico-Practicis noviter efflorescentes,
Curante

JOHANNES GOTTSCHED,

Phil. & Med. D. hujusq; Extraord. Phys. Ord. P.P.

Regiæ Scientiarum Societatis Brandenburgicæ Membro.

REGIO MONTI, Anno MDCCIII.
SUMPTIBUS TYPOGRAPHIÆ GEORGIANÆ.

FLORA
PRUSSICA
SIVE

PLANTAE
IN REGNO PRUSSIAE
SPONTANEAE NASCENTES

JOHANNES LOESELIIUS

Phil. & Med. Doct. & P. P. Ordinar.

Ordinarius

PLANTAE
PARTIM AB ALIO NONDUM OBSERVATAE
PRAELIB. PROPRIUM & INDELMIT. PLANTARUM
L'ORDONNEMENT 1808

AGRIC. SYNONYMIS VETERIN. BOVICIS
INUS INTERFECT. OBSERVATIONIBUS HISTORICIS
PRO-CURIA & ACADEMIA AGRICOLA

JOHANNES GOTTSCHIED
Phil. & Med. Doct. & P. P. Ordinar.
Ordinarius



AUGUSTISSIMO,
SERENISSIMO ac POTENTISSIMO
PRINCIPI
AC
DOMINO,
DOMINO
FRIDERICO,
REGI
IN PRUSSIA,
MARCHIONI BRANDENBURGICO
SAC. ROM. IMP.
ARCHI-CAMERARIO
ET
PRINCIPI ELECTORI,
SUPREMO ARAUSIONUM
PRINCIPI.

MAGDEBURGI, CLIVIAE,
JULIAE, MONTIUM, STETINI, PO-
MERANORUM, CASSUBIORUM, VANDA-
LORUM, ITEM IN SILESIA CROSNÆ

D U C I.

PRINCIPI HALBERSTA-
DII, MINDÆ ET CAMINI.

COMITI IN HOHEN-
ZOLLERN, MARCÆ ET
RAVENSBERGÆ,

LINGÆ, MOERSIÆ, BÜRÆ ET
LEERDAMI,

MARCHIONI VERIA-
RUM ET FLISSINGÆ.

DOMINO IN RAVENSTEIN, NEC
NON TERRARUM LAUENBURG ET
BÜTAU, ARLAIÆ AC BREDÆ, &c. &c. &c.

REGI OPTIMO,

PIO, FELICI, AUGUSTO.
DOMINO MEO CLEMENTISSIMO.



AUGUSTISSIME,
SERENISSIME ac POTENTISSIME
R E X,

*Domine Clementissime,
Nutritie Munificentissime.*



Acratissimo Regiæ Ma-
jestatis Tuæ Throno
humillimè advolutam,
quam cernis, REX Se-
renissime, FLORA
PRUSSICA est. Nu-

dis quondam verborum linteis involuta,
nunc verò & splendidiori apparatu &

1007

am-

ampliori firmate felicius refulgescens.
 A Gratiâ *Serenitatis Tuæ* splendorem
 omnem mutuata, quam tot decoribus,
 quot nitidissimis iconibus, gravi ære re-
 demptis, donare & exornare voluisti:
 Coronaturus hōc ipsō quasi Divam hanc
 Patriam tūm temporis, cū à Deo Im-
 mortali concessam, Regiam Tibi adapta-
 res Coronam. Idem jam olim Serenissi-
 mus Parens, Magnus ille FRIDERICUS
 WILHELMUS, gloriosissimæ memo-
 riæ, meditatus, nisi camporum eō tempore
 devastator & Floræ hostis infensissimus
 Mars, Floram hanc tūm Adolescentem,
 alumnum verò ejus, cujus curæ Flora
 erat concredita, mors præcox contumu-
 lāssent. Volentibus sic Fatis, ut Plantæ
 Prussicæ non nisi tūm demum in apricum
 prodirent, cū circumfævientibus undi-
 que & ubiq; Bellorum procellis in solâ
 ferè

ferè Prussiâ exoptatissimæ pacis spirarent
 Etesiæ. Auspice Rege, cujus pietas esset
 campus, immarcescibiles quarumcunque
 Regiarum Virtutum flores alens; quas
 inter summa in Musas Clementia eminet,
 non stipendiorum saltem augmentatione,
 sed & Academiarum & Societatum Sci-
 entiarum novâ fundatione nuperrimè
 demonstrata. Hâc spe animatus, foetum
 hunc Botanicum, non totum quidem
 meum, impigro tamen labore partum,
 Sacratissimis Regiæ Tuæ Majestatis pe-
 dibus substerno; felicius pullulaturum,
 si gratiosissimis Clementiæ Tuæ radiis
 eum fovere fueris dignatus. Mihi verò
 hæc Gratia pro semente erit, ex quâ
 DEO benedicente, plurimus quondam
 fructus germinet. DEUS Ter Opti-
 mus Maximus TUAM REGIAM
 MA-



MAJESTATEM, Totamque DO-
MUM REGIAM *sempervivo flore*
coronet, faciatque, ut Thronum Tuum
Regium meræ semper stipent CONSO-
LIDÆ REGALES & CORONÆ
IMPERIALES!

Ita vovet

S. R. M. T.

Regiomonti
Die 1. Octobr. M DCC III.

subjeclissimus

JOHANNES GOTTSCHED.

Ad Lectorem.



Edium ferè Seculum, dempto anno, elapsum, ex quo Johannes Lœselius, Johannis Filius, Juvenis adhuc, ob Parentis adversam tunc valetudinem, ex manuscripto ejusdem, PLANTAS IN BORUSSIA SPONTE NASCENTES divul-

gavit; certò pollicitus, fore, ut, quamprimum Parens sanitati restitutus fuisset; Descriptiones Rariorum Plantarum unà cum Iconibus publici juris fierent. Sed, cum Anno sequente, Parens ipse, *Anatomie & Botanices P. P. Ordinar. Celeberrimus*, Deo animam redderet, factum, ut opus hoc diu desideratum, mancum, mutilum & imperfectum ingemisceret. Solo igitur Plantarum Catalogo, Anno 1654. divulgato, contenta vixit Juventus Medica, nec, distractis magis magisque & disjectis injuriâ temporis manuscriptis, cum Filius relicto medico Jurisprudentiæ studium amplecteretur, quicquam perfecti sperare unquam potuit. Cumque exemplaria annuatim rariora, tandem omnia ferè essent divendita, vix meo jam tempore, unum atque alterum, quibus uteremur Botanices Studiosi, exstitit. Defectum tamen hunc facile fidelis, assidua & frequentata manu ductio *Prenobilissimi, Excellentiss. atque Exper. Dni. Doct. Joh. Heinr. Starckii, S.R.M. in Prussia Consilarii Aulici & Archiatri, Anatomie & Botanices tum temporis, nunc Theoretices P.P. Ord. celeberrimi*, Præceptoris & Patroni summoperè honorandi, refarcivit. Singulis quippe annis frequentissimè nobiscum in campos excurrere solitus, singulari quâ utebatur enchei-

AD LECTOREM.

refi, fidelitate & humanitate effecit, ut tanquam aliud agendo, fummo animi cum prolubio, cognitionem Plantarum Patriarum nobis compararemus. Regiomonto dehinc Bartensteinium, ad Praxin ibi Medicam exercendam delatus, tantum abfuit, ut ftudium Botanices neglexerim, quin potius majori ardore horis fubcifivis, per aliquot æftates in id juxta incubuerim, comitem mihi adfciscens Pharmacopœum, hofpitem meum, rei herbariæ perquam gnarum. Evolvendo quoque Antiquiorum Botanicorum Pandectas, Synonymicas appellationes herbarum excerptendo, rem totam familiariorem mihi reddidi. Cumque deinde, DEO fic dirigente, Regiomontum repeterem, indeptis in Academia Patriâ, ante Novennium, fummis in Medicinâ honoribus, adeptâ quoque à Sereniffimo Rege Profefſione Extraordinariâ, calcar mihi valdiſſimum fuit additum, de Arte Medicâ quocunq; modo benè merendi. Cui demùm Soceri mei, *Domini Hermannî Dieterici Heffen; S. R. M. in Pruffiâ Secretarii intimi, & Xenodochii Regii Præfecti benè meriti, Agentis quondam Brandenburgici apud Inviſtiſſimum Magnæ Ruffiæ CZARRIUM fideliffimi,* (qui ſecunda repetens vota in thalamum duxerat laudatiſſimi Domini Doct. Lœſelii Filiam,) ante ſeptennium & quod excurrit, acceſſit cohortatio, qui manuſcripta Botanica Doct. Lœſelii, ſed heu! quadraginta jam annorum injuriam paſſa, manca, adeoque fragmenta ſaltem, unâ cum Iconibus æri incifis mecum communicans, maxime inſtitit, ut manum tandem operi admoverem, nec opportunam adeò Publico inferviendi occaſionem præmitterem. Cujus precibus eò lubentius obtempe-

ravi,

ravi, quò majori ipse, ne opus toties expetitur planè
interiret, flagrabam desiderio. Tempus itaq; reliquum,
quantum à frequentatâ praxi & privatis Collegiis re-
stabat, huic negotio impendi, Catalogumq; plantarum
olim editum, cum fragmentis manuscriptis, meisque
excerptis conferendo, hâc tandem formâ, quâ in pu-
blicum prodire posset, FLORAM PRUSSICAM in-
dui. Prodiissetq; jam ante Triennium, & amplius, nisi
Icones ænei ab Hæredibus redimendi obicem posuif-
sent, quem tamen Gratia Serenissimi Regis facilè su-
stulit. Ipsis siquidem *Coronationis Regiæ suæ Majestatis*
Feris, ante biennium cum dimidio, ad supplicem mei
instantiam, & humillimam Excellentissimorum Domi-
norum Archiattrorum commendationem, Munificen-
tissimus Rex Icones æneos ab hæredibus pretio non
levi coëmit, mihiq; ut iisdem uterer, singulari Rescrip-
tô Regiô, clementissimè concessit & demandavit.
Nec subsistebat hîc inexhausta Regis Serenissimi Cle-
mentia, sed, ut summum mihi *Rerum Prussæ Naturalium*
amorem & stimulum adderet, Professione Physices Or-
dinariâ Philosophicâ gratiosissimè me maectabat. Quam
singularem & immeritam Clementissimi Regis Grati-
am submississimâ cum veneratione exosculatus, nolui
amplius & Regi & Publico deesse, sed FLORAM hanc
PRUSSICAM, tanquam *Primam partem Historiæ Natu-
ralis Prussæ*, Erudito Orbi in præsens communicare &
præmittere; certò ratus, fore, ut, DEO vitam & vires,
Rege autoritatem & Gratiam sufficientibus, *Pars se-
cunda de Prussæ Animalibus, & Tertia de ejusdem Mineralibus*,
(subnexâ aut præfixâ Parte Meteorologicâ, cujus gratiâ
) o (2 obser-

AD LECTOREM.

observationes quotidianas condo) Totaq̃ adeo *Historia Prussie Naturalis*, Opus utut à Professione meâ tum Medicâ, cum Physicâ imprimis non alienum, multisq̃ Eruditis expetitur, maximè tamen arduum, aliquando subsequatur: Hisce Benevolum Lectorem morari necessarium duxi, tum, ut Serenissimi Regis Gratiam & Munificentiam, quem non Orbis angulum pervagantem? deprædicando, omnibus & singulis commendatissimam redderem, cum ut veniam impetrarem apud Eruditos, si opus hoc minus exasciatum & perfectum judicarent. Idem huic FLORÆ factum obtigisse arbitrati, quod orphanis, quos rarò tam feliciter Tutores educant quàm Parentes. Synonymias Veterum Botanicorum propterea adjunxi, ut omnibus constaret, quam plantæ speciem sub titulo nostro palmario intelligamus? Eandem enim plantam diversi Autores & populi diversimodè nominant. Indices, tam Germanicus quàm Latinus, ob eandem rationem fusiores facti, ut sub quâlibet synonymicâ appellatione quælibet Planta facile reperiri posset. Quò ipsò illos quoq̃, qui lingvæ Latinæ gnari non sunt, adjutos puto, ne desiderio suo excidant. Eruditiones quasdam Philologicas, Criticas & Historicas, nec non seriis jocoseria quædam interspersi, ne nimia rei Botanicæ (hortò vivò si destituatur) ariditas, curiosos Lectores deterreret. Icones omnes ad exemplar vivum, quantum fieri potuit, accuratissimè delineati & ineisi sunt. Cæterum etiam atq̃ etiam Lectorem Benevolum rogo, velit qualemcunq̃ hunc nostrum laborem æqui boniq̃ consulere, meq̃ non nisi de Publico sollicitum, sincero semper favore fovere & complecti.

INDEX

INDEX AUTORUM in hoc libro citatorum.

- Æ**gin. Paulus Ægineta.
 Aët. Aëtii Amideni Tetrabiblos.
 A. Gell. Aulus Gellius.
 Alex. Alexis Fabulæ.
 Alexand. Alexandrides.
 Anthol. Anthologia Magna.
 Anthologia Græcorum Epigrammatum.
 Anserius de Busbeck.
 Apollod. Apollodorus de Deorum Originibus.
 Apul. Apulejus.
 Arnob. Arnobius.
 Athen. Athenæus.
 August. Augustinus de Civitate Dei.
 Baal Hatturim. *Vid.* Hatturim.
 Bauh. Caspar, Bauhin, Prodromus Theatri Botanici.
 Pinax.
 In Matthiolum.
 Bock. Hieronymus Bock. *vid.* Tragus.
 Brunf. Otto Brunsfelsius. Herbarium c. Vivis Iconibus. Latine
 Bubikir Volumen Elhavi. (& Germanicè.
 Busbeck. Anserius de Busbeck.
 Cæsalp. Cæsalpinus Andreas, De Plantis. Lib. XVI.
 Camerar. Joachimus Camerarius, Joh. Filius, in Matthiolum.
 Hortus medicus.
 Hercyniæ stirpes,
 sive Sylva Hercynia.
 Carrichter. Bartholomæus. *Artduter und Artheney-Buch.*
 Carystius. Antigoni Carystii Histor. mirabilis.
 Cicero.
 Cluf. Clusius, Pannon.
 Historia Rariorum Plantarum.
 Editio Hispanica.


INDEX AUTORUM.

- Column.** Fabius Columna in Phytobasano.
min. Cogn. stirp. & rar. Minus cognitarum stirpium & rariorum. Part. II.
- Cord.** Hist. Valerius Cordus. Historia Stirpium lib. IV.
Hispan. Lingvâ Hispanicâ editus.
in Diosc. In Dioscoridem Commentarius.
- Dalecampius.** Jacobus. in Plinium Commentar.
- Dodon.** Dodonæus Idiomate Latino, Germanico, Pannonico, Badrexelius. Lib. de Æternitate. (tavo.
- Eusebius** de Præparatione Evangelicâ.
- Eystett.** Eystettenfis Hortus.
- Fer. M. M.** Augerius Ferrerius Method. medendi.
- Fern.** Johan. Fernélii Opera Medicinalia.
- Fuchf.** Leonhardus Fuchsius. Comment. (de Historiâ stirpium)
- Galen.** Galeni Opera varia. (in Matthiolum.
- Gellius.**
- Gesn.** Hort. Conradus Gesnerus de Hortis Germaniæ.
in monte fracto. Descriptio montis fracti s. montis Pilati
propè Lucernam in Helvetiâ.
Catalogus Plantarum Latin. Græc. Germ. & Gallicè descriptus.
- Gyraldus.**
- Hatturim** (Baal) Marginal. in Biblia Venet.
- Hénricus** ab Heer. Observationes Medicæ.
- Hesychius** de Illustr. Philosophis.
- Horstii** Gregorii Senioris Observationes Medicinales.
- Juvenalis.**
- Kyber.** David Kyberus in Tragum. Cujus Commentariorum Lactantius, (lib. 3. Latine vertit 1552. 4to. Argentorati Laërtius.
- Landinus.** Christophorus, in Georgic. Virgil.
- Lobel.** Lœbel. Matthias de Lobel. seu Lobelius. Icones.
- J. L. Joh. Lœf.** Johannes Lœfelsius. } Adversaria.
- Lonicer.** Joh. Lonicerus in Diosc. Schola nova. } Observationes.
- Lucanus.**
- Lucretius.**
- Lugdunenfis** Hortus.

INDEX AUTORUM.

Martialis.
 Matthiol. Petrus Andreas Matthiolus Latinè. Germanicè.
 Nicetas.
 Ovidius.
 Pausanias.
 Pedianus.
 Pena. Petrus Pena Nova stirpium Adversaria.
 Petrus. Henricus. Lib. Nos. Diff. Nosologia Dissertationibus 50
 Phanas de Plantis. (disceptata.
 Plinius. C. Plinii Secundi Historia mundi Lib. XXXVII.
 Plutarchus. Quæstiones, Græcæ, Romanæ. Vitæ Reg. & Prin-
 Porta Joh. Baptista, (cipum.
 Propertius.
 Prudentius.
 Ruellius. Joh. de Naturâ Stirpium.
 Scaliger. Exercitationes.
 Schwenck, Lib. Stirp. Casparus Schwenckfeldius Stirpium &
 Fossilium Silesiæ Catalogus.
 Sebizius Melchior in Tragum Latinè & Germanicè,
 Servius Commentar. in Virgil.
 Statius Papinius.
 Sweert. Sweertius. Florilegium.
 Tabern. Jacob. Theodor. Tabernæmontani Kräuter-Buch.
 Tertullianus.
 Thal. Sylv. Johannis Thalii Sylva Hercynia.
 Theophrastus. Historia Plantarum.
 Trag. Hieronymus Tragus (Germanicè Bock) de Stirpibus
 Villanovanus Comment. in Galenum. (Commentar. lib. 3.
 Virgilius.
 Vitruvius.
 Vopiscus.

NB. Herbarum Asterismo * notatæ, illæ sunt; quarum Icones exstant. Ico-
 nes ipsi numeris, ad quam paginam pertineant, insigniti sunt, ut eo melius
 loco debito inferi possint.



GEORGII WOSEGINII,

Phil. ac Medicinæ Doct. P. P. Primarii,
Academiæ Senioris,

Ac p. t.

Pro-Rectoris Magnifici,

SENIS OCTOGENARII.

Ad

VIRUM

JOHANNEM Gottschedi

Phil. ac Med. Doct. Hujusque Extraord.

Physices Ordinari. P. P.

Regiæ Societatis Scientiarum Brandenburgicæ

MEMBRUM,

Floram Prussicam

publici juris facientem,

EPIGRAMMA.



RUSSIA dat Patriam *Floræ*, sed nomine
vulgi,

Quod tamen expoliit Gratia LOESELII.
GOTTSCHEDIUS lucem affundens congeffit amœ-

Utile doctrinæ consiliique decus. (num

Multa dedêre alii *Floræ*, stat Gloria in uno;

Qui *Floræ* vultum contulit, Omne dedit.



PLAN-



PLANTÆ IN PRUSSIA SPONTE NASCENTES.

I.

Abies, Bauh. in Matth. f. 102. Lob. ic. 231. o. Tab. lib. 3. fol. 640. Picea Dod. Lat. 863. Gråhnen-Holz Thuringis. Abies Plinii, & foemina Theophrasti, Clus. Pann. p. 21. Clus. Hist. lib. 1. fol. 34. Abies alba five foemina C. B. πιν. 505. weisser Thannen-Baum ἐλάτη Græc. Thauie Germ. Im Löbenichtſchen Wald/ & paſſim in aliis ſylvis.

Caudicis abiegni ima & enodis pars *Sapinus*, ſuperior nodosa *Fuſterna* eſt Plinio lib. 16. c. 39. Viſcum abietis Plinius ex Theophrasto *Stelin* nominat, baccis illud eſt albis, norante Cluſio. Cortices inter *lacryma* continetur, quam pro Theribinthina Veneta Inſtitores ſæpe diſtrahunt. Vim habet molliendi, diſſipandi, abſtergendi, vulnera ſolidandi, calculum expellendi. Oleum ejus ſtillatitium in ulceribus & vulnerationibus internis magnæ utilitatis.

Libra una vel altera reſinæ abiegnæ cereviſiæ inter coquendum admixta, eam ab acore præſervat; ſed cum inſatuandi virtute. Cacumina abietis decocta & pota, ſcorbuticum expugnare malum certò creduntur.

Piceam, veluti feralem arborem & Diti ſacram, in lugubri domo Patriciorum, amiſſis fratribus, liberis & propinquis, ap- ponere olim mos erat. Apud nos, quæ ad funus olim perti-

nuit arbor, festivitatem nuprialem jam indicit, ante fores locata. Hanc vulgus, ubi scythiffat, cantilenâ sæpius honorat:

D Dannenbaum/ **D** Dannenbaum/ du bist ein edler Zweig &c.

Strobili abiegni, copiosius pullulantes, opimas tritici messes ac largas vindemias promittunt. Ex abiete factus est equus Ilio fatalis, quem Lucretius lib. 1. *durateum* vocat, sive ligneum. $\Delta\epsilon\delta\omicron\upsilon\nu$ enim veteribus Græcis lignum erat, unde $\delta\epsilon\delta\omicron\upsilon\varsigma$ & $\delta\epsilon\delta\omicron\upsilon\alpha\tau\epsilon\omicron\varsigma$ ligneus. Propertius verò *abiegnum* dixit lib. 4. eleg. 1. *Laferat abiegni venter apertus equi*. Vaccam quoque Pasiphaës abiegnam dixit idem Propertius lib. 3. eleg. 18. Dædalus è piceâ simulachrum Herculis fecit. Vide Apollodorum lib. 2. de Deor. orig. Statius 4. Thebaid. v. 425.

Nec caret umbra Deo. Nemori Latonia cultrix

Additur: hanc Piceæ, cedrique & robore in omni

Effictam sanctis occultat sylva tenebris.

II. Abrotanum campestre, C. B. $\pi\iota\nu$ 136. Tab. lib. 1. fol. 62. Abrotanum sylvestre, vel 4. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch. 271. Artemisia leptophyllos, Gef. hort. fol. 248. Ambrosia Matth. deutsch, 359. Ambrosia altera, Bauh. in Matth. 619. **B**esemkraut/ **W**ildstabweiz mit schmalen Blättern. Caulis alit modò rubentes, modò albicantes, racemoso semine, botryos instar, refertos: Adstringit, reprimat, ac repellit: gargarisatione faucium ac tonsillarum inflammationes, infessu mulierum profluvia corrigit secundum Matth. In der **S**arckau & alibi &c.

III. Absinthium, Brunf. tom. 3. fol. 142. Sebitz in Trag. deutsch fol. 265. Matth. deutsch 276. Bauh. in Matth. 508. Ablinthium latifolium. Dod. Lat. fol. 23. Absinthium vulgare Fuch. fol. 1. Lob. Ic. p. 752. Tab. lib. 1. fol. 1. Absinthium Ponticum. Ruell. lib. 3. fol. 493. Absinthium Ponticum seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis. C. B. $\pi\iota\nu$ 138. **B**er-
muth

muth/ Gemeiner Bermuth. Pol. Piolin Polny. Passim. Aperit, detergit, jecur & ventriculū adstrictione roborat, appetitū excitat, humoresq; biliosos ac pituitosos vacuat, tum per alvum, tum per urinas: vermes evocat; ac lienosos, faculentum sanguinem *αλω ηδη κατω* magnō impetu sæpe egerentes, egregiè juvat, Dod. Radix dulcis est ac insipida ferè, quod mirum, cum succum tanti amaroris è terrā sorbeat.

IV. Acer major Cordi, Lob. ic. p. 199. o. Borussis *Leit-Baum/ Maszholder/ Alhorn*. Ligni Materies tenera ac fissilis. Folia petiolo longo insistentia ampla sunt, profundius incisa, seu crenata. Flores fert in umbellis mense Majo, quibus succedunt siliqvæ binæ circa connexum duræ & à fructu extumidæ. Effigie scarabæorum alas exprimentes. Cortex vernō tempore sauciatus, liqvorem fundit limpidum, quō nonnulli aquæ betulinæ locō utuntur. Radix tusa & foris affirmata, dolores compescere repertum, Auctore Ruellio lib. 1. c. 47. *Aluff den Huben bey Königsberg*.

Acer operum elegantia ac subtilitate cedro secundum, teste Plinio lib. XVI. Natur. Hist. c. 15. Vertumnus acernus de se apud Propertium lib. IV. Eleg. 2.

Stipes acernus eram, properanti falce dolatus,

Ante Numam grata pauper in urbe Deus.

Ovidius lib. I. de arte, vaccam *acernam* dixit, quæ Propertio abiegna bos dicebatur. Ovidius deniq; in Ibin, equi acerni meminit,

Utq; loqvax in equo est elisus guttura acernō.

V. Acetosa pratenfis, C. B. *πιν* 114. Oxalis, Trag. Seb. in Trag. deutf. h. 249. Matth. deutf. h. 151. b. Fuch. 464. Dod. Lat. 648. Bauh. in Matth. 353. Oxalis, Acetosa 1. Tab. lib. 2. fol. 149. Oxalis sive laparsum oxalida, Lob. ic. 290. *Ge mein Saurampff. Szczaw* Polonis.

Jecur & lienem aperit, renum infractus expedit & crassa incidit. Hinc ictero medetur, lienem aperit, arenulas expurgat, & menses moderatè citat. Semen malignitati obliſtit, lumbricos necat, dysenterias, alvi profluvia & ſanguinis ſputa adſtrictione leni coërcet, ac robur aſtuanti ventriculo, hepatis ac cordi confert. Bey Holland & paſſim in pratis copioſè.

Radix acetofa, prout in Officinis divenditur decocta, cereviſiam & colore & ſupernatante pulcherrimâ ſpumâ exactiſſimè æmulatur & incautos fallit. Præterea addito partim Cinnamoni potum egregium extemporaneum, bilioſis præſertim, porrigit, quò agri nonnulli per annum integrum & quod excurrit, uſitantes, ab oppilatione hepatis liberati fuerunt. Aſtatis tempore, peregrinantes, decocto ejus, loco cereviſiæ ut plurimum aceſcentis, ruri uti poterunt.

VI. Acetofa arvenſis lanceolata, C. B. *πiv* 114. Acetofella, Lon. *deuſch.* 119. Oxalis minima, Trag. Sebiz. in Trag. 249. Dod. Lat. 650. Oxalis minor, Bauhin. Matth. 354. Oxalis tenuifolia ſinuata vervecina, Adv. Lob. 126. Oxalis ovina Tab. lib. 2. fol. 150. Klein Saurampff / Schaaff Saurampff / Szczáwik Poloniſ. Pingvius & aridius ſolum plantæ magnitudinem variat. Eadem, quæ prior agit, nec infirmioribus pollet viribus. Ruſuli ejus flores elegantiffimam dant tincturam, roſis vix cedentem, quam foriolis in febris malignis ſalutarem cenſeo. Am Tragheimſchen Walle copioſe.

VII. Aconitum racemoſum. C. B. *πiv* 183. Chriſtophoriانا. Dod. Lat. 402. Lob. Ic. 682. Tab. lib. 2. fol. 454. St. Chriſtoffels Kraut Omieg Polon. Baccae ejus Auguſto aut ſeriùs, maturantur. Exitialis ac novercalis eſt planta. Bey der Neuhausiſchen Mühl am Berge. Item bey'm Penartiſchen Walde.

VIII. *Aconitum cœruleum* L. *Napellus* I, C. B. *πiv*. 183. *Napellus*, Bauh. Matth. 768. Dod. Lat. fol. 442. *Napellus* verus *Cœruleus*. Adv. Lob. 301. *Napellus* maj. Latifol. & angustifoli⁹, Tab. lib. 2. fol. 186. *Eysenhart*/*Narrenkap*/*Münchskap*. Foliis est modò latioribus, modò angustioribus: flore sapiùs cœruleò, aliquando purpureò vel albò. Tota internecina animalibus, exceptò muscarum genere, cantharidibus haud absimili, quod turmatim napello insidere scribitur; Flores ejus rostellò delibans. *Bey Rogitten*. Item *Bey der Hoppenbruchschen Mühl* in Districtu Balgensl. It. *Bey der Creusburgschen Papier-Mühl am Fluß*. Proveniat etiam olim *bey Mergen/ am Berge bey m Haff/* sed post à rusticis effossus, in hortum translatus ac coronamentis additus, vocatus est *Königsblum*. *Napelli* radicem unam vel alteram eqvisones antidoto prasentissimo porrigunt eqvis in detestabili affectu, quem nominant *die Wurstsucht/ den stießenden Wurm*. Malum hoc tubera quædam farcimina facie imitantia, ac depilia sapè, excludit, quæ temporis tractu in sinuosa & maligna abeunt ulcera. Exstantias has fertiles in quibusdam locis vanescere, in aliis iterum extumescere haud rarò conspicies, antequam congressu sordidam sui exulcerationem ostendunt. Sunt, qui opinantur, vivos vermiculos carnem inter & tergus eqvitare, tubera excitare, eademq; exedere, qui acu exempti, & ad lychnum positi, deorsum sursum cursitent. Hos *Aqvâ Forti* immisâ necant, ac vino adusto sinuosas mox eluunt ulcerationes.

Aconitum olim pœna. *Aristoteles* ob Pœana fuscum ad *Hermiam Evnuchum* socerum suum, judicum sententiis damnatus, *aconiti poculo* interiit. *Hesych. Illustr. de Philosophis*.

IX. *Acorus verus*, sive *calamus aromaticus officinarum*

C. B. πiv . 34. *Acorus* Diosc. & *Acoros* Theophrasti, officinis falso *calamus*, Lob. ic. 57. *Acorum*, & *Acorum* cum suo julo, Tab. lib. 3. fol. 329. *Acorum* legitimum Clus. Hispan. p. 121. *Äckerwurz* oder *Calmus*.

Calefacit & siccatur ordine tertio, Gal. 6. simpl. *Radix alexipharmaca* est, attenuat, incidit, abstergit, aperit, urinas movet. In alveis apum suspensa facit, ne examinent, Apulejus. Zu *Schwanis* bey der *Mühl* copiosè, cum nucamentis, quæ Matthiol. se non vidisse consitetur. It. zu *Brandenburg* am *Haff*/ ubi absq; julis provenit. Anserius de Busbeck Clusio retulit, quod nec semen, nec florem proferat, ubi spontè nascitur, sed duntaxat quædam nucamenta. Clus. Hisp. Inquirendum hoc exactius.

X. *Acorus adulterinus* C. B. πiv 34. *Acorum* officinarum, Fuch. fol. 12. *Pseudoacorus*, Bauhin. Matth. 21. *Acorum adulterinum*. Trag. Seb. in Trag. deutsch 555. *Acorus palustris*, & *Butomon* Theophr. Lob. ic. 58. *Iris palustris* lutea, Tab. lib. 2. fol. 330. *Pseudoiris* Dod. Lat. 248. *Butomon*, Clus. hist. fol. 232. *Fœmellis Äckerwurz*. Alias *Geel Wasser-Lilgen* / *Drachenwurz*. Polonis *Kosaciec dziki zolty*. In fossis, in der *Hollen-Grund*.

Radix siccatur, adstringit, unde magnas obtinet vires in sistendo sanguine, undecunq; erumpente, Dod. Sunt, qui radice, Majo mense eradicatâ, collo (ut scrobiculum cordis attingat) appensâ post in rivum conjectâ foriolos, & ad lasanum crebrius conquiniscentes, restituere satagunt. An robur concipiendi mulieribus adimat, ut opinatus est ille apud Clusium Medicus, affirmare non possum.

XI. *Adiantum aureum minus*, Tab. lib. 2. fol. 476. *Polytrichon* Apuleji, vel 2. *Lonic. deutsch* 249. *Muscus capillaris*, Dod. Lat. 475. *Polytrichum aureum medium* C. B.

πιν. 356. *Wiedertodt/ Guldewiedertodt/ Jungfrauenhaar.* Mátky Bozey wloshi zlotek Pol. Siccat ac discutit aliquantulum, adeoq; *σύμμετρον* est & temperatum. In locis mucosis, carieq; exsis lignis sæpius visitur.

XII. *Alcea* Matth. Bauhin. in Matth. fol. 663. Fuch. fol. 80. Tab. lib. 2. fol. 446. *Alcea* & herba Simeonis Brunsf. tom. 1. fol. 197. *Alcea* malvæ roseæ sylv. genus, Trag. Kyb. in Trag. Lat. 365. *Alcea* vulgaris Dod. Lat. fol. 656. Lob. Observ. 374. adv. 295. *Alcea* vulgaris major C. B. *πιν* 316. *Sygmarswurz/ Simarswurz.* Lentum ac viscidum quod obtinet planta, potissimum radix, quæ glutinosa, dulcis & modicè constringens est degustata. Dysentericis ac ruptis medetur radix, ex vino velaqvâ pota. Sunt, qui radicibus alceæ, altheæ locò utuntur in tumoribus emolliendis ac solvendis. Collo suspensa radix aciem oculorum tueri creditur vulgò. *In der Holley Grund.*

XIII. *Alchimilla*, Trag. Seb. in Trag. deutsch 408. Dod. Lat. 140. Tab. lib. 1. fol. 308. *Pes leonis*, Brunsf. tom. 3. fol. 79. Fuch. 612. *Lonic.* deutsch 245. *Stellaria* Matth. deutsch 513. Bauhin. Matth. 819. *Δροσσερά Δράσιον* sive *Φιὰδδον*, Cord. hisp. fol. 147. *Sinnaw/ Sonnentaw.* Lewensfuß. Unser Frauen Mantel. Przywrot Pol. Bey der Altstädtischen Ziegel Schein & alibi passim. Flores communiter pallidi ac herbacei, rarius albi. Folis ros sæpè, in guttulas coactus, perlarum módo insidet. Abstergit, mundat, adstringit & solidat, unde vulneraria audit.

XIV. *Alga marina* Lob. lc. 248. o. *Fucus marinus* alter, Dod. Lat. 479. *Alga angustifolia* vitrariorum C. B. *πιν* 364. *Meergras.* An der See hin und wieder. Folia, nunc latiora, nunc angustiora, initio saturatè viridia, post exsiccata prorsus candida. *Algâ marinâ* in fasciculum collectâ & pi-

& pileis aptatâ, levis armaturæ milites cristarum locò, quas sub vertice gerunt, quondam utebantur. Superbiusculi algâ succo baccarum rubi Idæi infectâ, incedebant. In Insulâ Jar-say, vel Gerzey, Vnglorum Imperio subjectâ, cum exiguum ignis alimentum ferat, pro lignis algâ marinâ (Uraje vocant) utuntur incolæ.

XV. *Alliaria* Seb. in Trag. deutsch fol. 67. Fuch. 104. Lob. ic. p. 530. Bauhin. in Matth. 613. *Alliastrum*. Gesn. hort. 245. b. *Knobloch Kraut* / *Lauchel* / *Salt Kraut*. wsnaczech Polon. Im Domnauschen Walde. Aperit, incidit, tenuat, digerit, putredini resistit, abstergit, mundatq; Primò vere decerpta folia intinctibus ac fassamentis adduntur. Semine viscidos in pectore incidit humores, ac herbæ succo febribus ulceribusq; succurrit malignis. Cit sternutamentum succò vel semine naribus immisso, uteriq; strangu-latum tollit, cervici inditum semen linteo conclusum. Suc-cus mense Majò expressus, seu liqvidus, seu inspissatus, ut & sal magmatis, in gangrænâ, & ulceribus sordidis ac malignis perutilis.

XVI. *Allium ursinum*, Bauh. in Matth. fol. 422. Fuch. 739. Com. in Matth. 173. A. Clus. hist. lib. 1. fol. 190. *Allium ursinum latifolium*, Lob. ic. p. 159. *Allium sylv.* Brunf. tom. 3. fol. 137. Seb. in Trag. deutsch 594. *Allium sylv. lati-folium* C. B. πiv 74. *Molus*, sive *Allium ursinum*, Florib. Swert. part. 1. fol. 61. *Wald Knoblauch* / *Hunds Knoblauch* / *Häcker Knoblauch*. Czosnech Babczy Pol. Hinter Latten-walde.

Allium ursinum totum theriacæ locò ingerunt rustici Lith-vani, cum modico salis & paucillo panis, parvi ritum facien-tes Veterum. Olim *allium* qui gustasset, à delubro & sacris arcebatur. Hinc Stilpon Philosophus somnians, Deam ad-

stantem

stantem alii esum sibi exprobrare, respondit hæc in somniis: *Præbe mihi quod edam, & alliò non vescar.* Factum hoc fuerat ob gravissimum alii odorem, unde *σκοροδίζην*, molestiâ & dolore est afficere. Aristophanes in eqvitibus sub personâ Populi Atheniensis, *Φάσκων Φιλῆν μ' εὐσκοροδίστας* h. e. dum ais te diligere me, alliaſti me, Affine est huic Xenophontis *κρομμύων ὄζην*, cepe olore, quod in sordidos & illotos quadrat. Allium quantum calculosis proſit, in vulgus notum est; facile enim reliquis omnibus antinephriticis palmam præripit.

XVII. Allium montanum bicornè angustifolium flore purpurascente, C. B. *πίν* p. 74. Ampeloprasſon proliferum, Lob. Ic. 156. Allium sive Moly montanum 2. Cluſ. Hist. lib. 2. fol. 193. Moly montanum carmesino colore, Swert. Zweyhörnichter schmalblättrichter Berg Knoblauch mit Purpurfarber Blüht. In montosis.

XVIII. Allium montanum capite rotundo, C. B. *πίν*. 75. Allium seu Moly montanum 5. Cluſ. Pann. p. 219. (Cui & Moly montanum purpureo elegantissimo flore) & hist. lib. 2. fol. 195. Bergknoblauch mit runden Purpurfarben Köpfflein. Cauli viridi, rotundo, duorum vel trium cubitorum altitudine excreſcente, ac tribus vel quatuor sæpè oblongis tenuibusq; foliis ornato, capitulam insidet sphærale *Φύσιγξ* dictum ex pluſculis floribus, petiolis fultis, congestum, qui sex foliola, elegantiore purpurâ nitentia, & nunquam se explicantia obtinent. Semina mox adſunt copioſa rotunditate oblonga, candida, glumis ex nigro purpurascentibus induta. Radix bulbosa *ἀγλίστας*, seu nucleos quosdam tunicâ vestitos, ad latera interdum egerit. In der Hollen Grund. Floruit mense Julio. Notandum.

hic, quod *Φύσις* propriè folliculus sit turgidus in allii capite, quo semen continetur. Allio coronatus est Andronicus Imperator Orientalis, ab Isaacio Angelo victus, & post atrocissimos cruciatus, præcisâ dextrâ, oculo altero effosso, pedibus vivus suspensus. Nicetas & ex eo Drexel. l. de Æternitate.

XIX. Alnus. Brunf. tom. 3. fol. 235. Seb. in Trag. deutsch 860. Bauh. in Matth. 132. Lob. ic. o. 191. Tab. lib. 3. fol. 690. Alnus vulgaris, Clus. hist. lib. 1. fol. 12. Alnus rotundifolia glutinosa viridis C. B. *πίν* pag. 428. Erenbaum. Bey den Huben. Siccat, refrigerat, & adstringit, cortice ac foliis. Lassitudinem viatorum levant folia, calceis imposita. Cortex cum nucamentis & ferri scoriâ aquâ maceratus atrum suppeditat colorem coria tingentibus utilem. Aqua alni, ex foliis prolecta, expertum est medicamentum in arthritide, dolores quippe velut incantamento quodam aufert, foris admota. Eo nomine secretò ut habeatur, sunt *ἀλωπεκίζοντες*, cum vulpe vulpinantes, qui *aquam alni* transnominant & *aquilanam* vocant.

* *Alnus mense Aprili inter julos copiosissimos, eò tempore defluos, semine plenos, corpora quædam edit nana, κορυμνῶν, ruffa ac squammata, petiolis fulta suis, quæ genuini sunt alni flores, & conos post se relinquunt subvirides initio, tandem ad nigrorem abeuntes, & hiscentes.* Verrucæ alni tubercula sunt globosa, & inæqualia sæpe, arbori clavorum instar defixa, quo levi brachio, immisso cultro, eximi possunt. His pueri globorum utuntur loco, ruri lusitantes. Lintres, lembi ac scaphæ initio ex alno parabantur juxta illud Virg. 1. Georg.

Tunc alnos primùm fluvii sensere cavatos.

Emplastrum Lœselii ex Alno ita habet: R. ol. veteris libr. 1. cortic. verrucarum alni, radicam alniana libr. $\frac{1}{2}$ gemmarum alni

alni Uncias 4. fructuum alni autumn. coll. Uncias 2. ebulliant, ac stent in ahenio per 4. dies ac noctes, colato & expresso oleo adde Lithargyr. aurei triti ac creti Unc. 15. Coquantur aliquamdiu spatulâ debite materiam agitando, & inter coquendum affunde: Succo foliorum alni, corticum, radicum alni, aquæ foliorum alni ana libram. Ultimò ubi adverteris justam ferè emplastri consistentiam, adde per incerniculum pulveris florum alni, julorum alni, foliorum alni, fructuum alni autumn. collector. ana Unc. 2. M. F. l. a. absq; cerâ emplastrum. Usus discutit, dolores ac cruciatus arthriticos egregiè sistit. Erysipelata, omnesq; partium intemperaturas fervidas potentissimè extingvit. Tumores resolvit, vulnera cruenta placat, ac ulcera haud sordidata, nec non ossa fracta optumè solidat. Eò nomine cerato diachalcitidis Galeni, seu Diapalmæ, hoc longè præferendum existimo.

XX. *Alnus nigra baccifera*, C. B. *πiv*. p. 428. *Frangula Bauh.* in Matth. 875. Dod. Lat. 784. Tab. lib. 3. fol. 753. *Arbor foetida*, Lon. deutsch 60. *Faulbaum* Trag. Kyb. in Trag. p. 981. *Hünneraugen* Borussis. *In der Hollen Grund.*

Vaccæ foliorum pastu lac reddunt copiosius. *Cortex interior luteus*, vere delibratus, & siccatus obstructa expedit viscera & humores biliosos, pituitosos, ac serosos fortiter educit drachm. $\frac{1}{2}$ vel Scrup. 2. pondere cum correctore maci, vel zingibere sumptus. Aceto mistus & impositus scabiem aufert humidam, *Seb. in Tragum.*

XXI. *Aloë palustris* C. B. Pin. pag. 286 *Stratiotes sive militaris aizoides* Adv. Lob. 334. *Sedum aquatile*, sive *stratiotes potamios* Dod. Lateinisch fol. 589. *Wassersegen / Wasserfischel.* Im Graben bey dem kleinen Brückchen / nach Jerusalem zu.

XXII. **Alfne marina foliis portulacæ.* Joh. Læfel.
 „Plantula est longissimâ radice albicante, sub terrâ repente,
 „quæ novis subinde radiculis constitutis horsum vorsum ra-
 „dicationem instituit, ac nova alfines germina excludit: Thy-
 „sulis est succosioribus, rotundis, geniculatis, albicantibus,
 „nonnunquam & rubentibus, quorum geniculis ministeria
 „præstant, bina exadversum folia crassa, succo plena, viri-
 „dia, ex oblongo acuminata, gustu ferè fatua. Flosculos
 „alit quinque; foliis candidos, mense Julio, aliis quinis foli-
 „olis intervirentibus suffultos, quorum singulis assistit sta-
 „minulum subluteum. Capsæ post succedunt virides, orbi-
 „culatæ, quinis locis extumidæ, aliquantulum fastigiatæ,
 „ac in meditullio tenuissimis filamentis instructæ, quæ dis-
 „fractæ, septem semina offerunt lutea, parte convexâ ro-
 „tunda, simâ compressiunculis ternis, & pluribus insignita,
 „& plana. *Meerhünerdarm mit dicken Gartenbürgels Blät-
 tern.* In der Sarkau.

XXIII. *Alfne major, C. B. Pin. pag. 250. Alfne, sive
 Hippia major, Lob. ic. 459. Centunculus, Cæs. lib. 6. c. 53. p.
 259. Groß Hünerbiß / Meyerkraut / Vogelkraut / Meyer.
 Bey Königsberg.*

XXIV. *Alfne minor repens. Joh. Læfel. Klein fri-
 chender Hünerdarm / oder Vogelkraut. Hinter Latten-
 walde nach Runken zu. Aviarum oscines suas aves, cibum
 fastidientes, herbulâ hâc recreant.*

XXV. *Alfne minor multicaulis, C. B. Pin. pag. 250.
 Alfne minor, Fuchs. fol. 23. Lon. deutsch 203. Tab. lib. 2.
 fol. 382. Alfne minima, Dod. lateinisch fol. 30. Adv. Lob.
 fol. 193. Centunculus minutissimis caudiculis, Cæs. lib. 6. cap.
 53. pag. 259. Klein vielstengeliges Vogelkraut / oder Meyer.
 Am Ball.*

XXVI. *Alfina triphyllos cærulea*, C. B. Pin. pag. 250.
 Händelkraut cœruleis flosculis, Trag. Kyber. in Trag. pag.
 401. *Alfina parva recta*, folio *Alfines hederaceæ*, sed rutæ
 modo diviso. Lob. ic. pag. 464. *Alfina recta*, Tab. lib. 2. fol.
 383. Händelkraut / Hünerrauten / Dreyblättericht Vogel-
 Meyer mit blauen Blümlein. Auff den Aeffern.

XXVII. *Alfina veronicæ foliis*, flosculis caudicalis ad-
 hærentibus, C. B. Pin. p. 250. *Alfina folio veronicæ*, Tab.
 lib. 2. fol. 384. Alysson, Colum. in Phytobas. p. 28. Hün-
 erdarm mit Ehrenpreis-Blättern. Auff den Aeffern.

XXVIII. *Alfina hederulæ folio*, C. B. Pin. p. 250. *Al-
 fine mas*. Gefn. hort. fol. 245. *Alfina spuria prior*, sive mor-
 fus gallinæ, Dod. lateinisch fol. 31. *Morsus gallinæ folio he-
 derulæ*, Lob. ic. 463. *Centunculus hirsutior*, Cæf. lib. 6. cap.
 53. pag. 259 & seq. *Alfina hederacea*. Tab. lib. 2. fol. 384.
 Hünerdarm mit Epheu-Blättern. Am Ball.

XXIX. *Alfina spargula dicta major*, C. B. Pin. pag. 257.
Saginæ spargula. Lob. ic. pag. 803. *Spargula*, Dod. lateinisch.
 fol. 573. Wasserperlen Borussis. Unter dem Getreidig.

XXX. *Alfina foliis Triflaginis*, Lob. ic. p. 464. Tab.
 lib. 2. fol. 384. *Alfina chamædrifolia* flosculis pediculis oblon-
 gis insidentibus C. B. Pin. pag. 250. *Alfina media*, Fuchf.
 fol. 22. *Alfina spuria altera*, Dod. lateinisch. fol. 31. Hün-
 erdarm mit Gamanderlein-Blättern / dessen Blüht auff läng-
 lichten Stengeln. Am Steindamschen Ball.

XXXI. **Alfina bifolia fructu Coriandri radice ge-
 niculatâ*. Joh. Loeselii. Vogelkraut mit Coriander Saamen.
Plantula est triuncialis, & sæpè major, thyrsulis instructa “
 suis, quorum singulis geniculis bina assistunt foliola in acu-“
 tiem abeuntia, flosculos fert dilutè purpureos, foliis pro-“

„ximè affidentes, quibus succedunt conceptacula, seu vascula
 „rotunda, acuminata Coriandri facie, minutulum semen,
 „nigricans & triangulum, concludentia. Radice nititur ge-
 „niculatâ, filamentis comitatâ. Bey Rahlholz in districtu
 Balgenß auff der Wiesen. Floret mense Junio.

XXXII. *Anagallis mas phœnicea*, Lob. ic. pag. 465.
Anagallis mas, Sebit. in Trag. deutsch fol. 307. Bauh. in Matth.
 464. Fuchf. fol. 18. Dod. lateinisch fol. 32. Lon. deutsch fol. 204.
Anagallis phœniceo flore, C. B. Pin. pag. 252. Clus. hist. lib.
 6. fol. 182. Rother Gauchheil. Rother Meyer Borussia. Un-
 ter dem Getreidigt. *Anagallis mas* in sistendo sanguine adeo
 efficax, ut in volâ duntaxat manus servata eundem sufflami-
 net. Lonicerus addit fol. 204. Venam in brachio sectam
 sanguinem. haut fundere, herbulâ hâc manu detentâ. In-
 mensum nimio fluxu collo affirmetur, ut scrobiculum cor-
 dis attingat.

XXXIII. *Anagallis aquatica major folio oblongo*,
 C. B. Pin. pag. 252. *Berula major*. Tab. lib. 2. fol. 389. Grosse
 Bachungen / mit länglichten Blättern. An den Flüssen
 hin und wieder.

XXXIV. *Anagallis aquatica minor foliô oblongo*,
 C. B. Pin. pag. 252. *Anagallis aquatica minor* 2. Tab. lib. 2.
 fol. 389. Kleine Bachungen mit Poley Blättern. Rivulis
 ac fossis affistit.

XXXV. *Anagallis aquatica folio subrotundo*, re-
 ptante cauliculo. Joh. Læsel. Kleine kriechende Wasserbun-
 gen. Auff der Wiesen gegen Jerusalem über. Convenit
 cum reliquis cum *anagallide aquaticâ minore foliô subro-*
tundô, C. B. Pin. pag. 252. nisi quod hæc cauliculos obtineat
 in superficie terræ longius reptantes, & ex intervallo quo-
 dam fibris radicationem impetrantes.

XXXVI.

XXXVI. *Anagallis aquatica* brevior oblongo folio femine biseutato, J. Læfel. *Kleine Bachungen mit kurzen länglichten Blättern / dessen Saam in doppeltẽ Schildlein.* Tota radix capillata, quæ cauliculos numerosissimos quaquaversum sparfos gestat, humi jacentes ac reptantes, quorum nonnulli reptatu novas subinde acquirunt fibras, in rectum radicanter. Foliis est curtis, oblongis & acumina- tis, articulis thyrsulorum pari responso affirmatis. Semen in scutigerulâ delitescit thecâ. Im Dorff Sarkau nach dem Curischen Hase zu in loco arenoso.

XXXVII. *Anagallis aquatica* longior angusto folio, femine biseutato. Joh. Læfel. *Kleine Bachungen mit langen schmalen Blättern / dessen Saam in doppelten Schildlein.* Radice crescit nodosâ, villis instructa suis: cauliculo geniculato ac levi, bina longiora, angustissima & tenuiter serrata, situ adverso præstò sunt folia, ex quorum sinu emergunt pediculi in tenellos alios pedicellos inordinatos abeuntes, qui flosculos alunt quadrifolios, parvos ex rubro albicantes, quos vanescentes scutulæ geminæ, *Thlaspios* instar, tenuissimâ instructæ aristâ, sequuntur, seminis servatores Magnitudine variat: pumila sæpius est, vix spithamam alta rarius cubitalis & procerior. Hinter dem Tragheimischen Wall / nicht weit vom Oberteich.

XXXVIII. *Angelica aquatica*, C. B. Pin. pag. 156. *Archangelica*, Lob. ic. pag. 701. Dod. lateinisch. fol. 318. Clus. Pann. pag. 695. Clus. hist. lib. 6. fol. 195. Cam. pag. 17. Wasser: Angelicke, Arcydziegel Pol. In der Wiesen nach Lochstädt zu copiosè. Floret circa finem Junij. Ulnas sæpe quinque longitudine suâ excedit. *Angelica* sub elevatione poli 47. 48. 49. nata, ac Ole. 5. 6. occupante effossa, efficaciter operari creditur.

XXXIX.

XXXIX. *Angelica sylvestris major hirsuta*, Joh. Lœsel. *Wilde rauhe Angelick / Hundgiersch / Borussl. Ra-*
„dix crassa & fibrosa, nigricans foris, intus albicans, cau-
„lem effert bicubitalem, & ulterius sæpè productum, ro-
„tundum, medullâ intus albicante, hirsutie asperum, viridè,
„in alas brachiatum, qui digitis tritus odoris est nonnihil
„aromatici. Foliis crescit podagrariæ, sed profundius in
„ambitu incisus, hispida, atrovirentibus, & in acutiem-
„abeuntibus, quæ similiter comminuta odorem hyssopi
„ferè spirant. Flos in umbellis albicat, semine nigro post
„se relicto. Radix inodora ferè & exiguè acris calefacit &
„siccatur. Im Penartschen Walde.

XL. *Angelica sylvestris minor sive erratica*, C. B. Pin. p. 155. *Pycnocomos. Brunf. tom. 3. fol. 165. Podagaria. Adv. Lob. fol. 311. Ægopodium, Tab. lib. 1. fol. 301. Herba Gerardi, Dod. lateinisch. fol. 320. Angelica sylvestris communis, pestis hortorum, Cam. pag. 17. Angelica vitium, & osteritium sylvestre, Sebit. in Trag. deutsch / 333. Gensfuß. Nostratibus, Giersch. Girz Pol. Succulenti ejus thyrsuli, abjectis foliis verno tempore edules sunt, & creberrimi usûs. Tota vulneraria est, arthriticos unâ insigniter juvans foris & intus administrata. Radix sudorem movet aliquot dies cum vino hausta, ac febres fugat. In sylvis umbrosis passim.*

XLI. *Anonis spinosa flore purpureo*, C. B. Pin. 389. *Anonis, Bauh. Matth. fol. 501. Anonis, Anonis, Resta bovis, Cam. Matth. fol. 227. Resta bovis, Sebit. in Trag. deutsch / fol. 683. Lon. deutsch / fol. 103. Anonis. Fuchs. fol. 60. Dod. Lateinisch. fol. 743. Dod. Niederländisch fol. 1164. Anonis, Cord. in Diosc. fol. 51. Gesn. hort. fol. 269. Lob. Observ. fol. 492. Adv. Lob. fol. 378. Thal. sylv. 81. Anonis I. Tab.*

Tab. lib. 2. fol. 226. Remora aratri quibusdam. **Braun**
Hauhechel / stachlicht Stallkraut / Dhsenbrech. Cortices
 radicum vino decocti præstantissimi sunt in frangendo cal-
 culo, & lotio ciendo, *Diosc. & Plin.* Infarctus quoque jeco-
 ris & lienis expediunt, ictericis & hydropicis summopere uti-
 les. Novi quendam, (inquit Matth.) qui radice pulvere
 duntaxat plurimis mensibus sumpto carnosum ramicem ab-
 sumpsit & sanatus est: licet à Medicis nullo alio medicamento;
 quàm solâ sectione unctioneq; hunc curari posse antea statu-
 tum esset. Equis porrigitur decoctum Ononidis ischuriâ la-
 borantibus. Olim planta adhuc tenera muriatica erat ex ge-
 nere condimentario, quam sale conditam diutulè servabant
 edulem, cui anima fœtebat. Lævis est vere, & primâ æsta-
 tis parte, post aculeos contrahit. In hortis colli non debet
 Ononis, ne fiat Anonis, hoc est inutilis, & noxia aliis her-
 bis, *Gesl.* **Bei der Villau auff dem Haacken.** Floret mense
 Julio. Restâ bovis efficacissima creditur sub elevatione Po-
 li 48 nata & collecta Sole 8 ♀ occupante.

XLII. Anonis spinis carens purpurea, C. B. Pin. 389.
Braune Hauhechel ohne Stacheln. Anonis mitior prima,
Clus. histor. lib. 1. fol. 99. Anonis non spinosa, *Clus. Pann. p.*
52. *Eystett.* Ononis perpetuò lævis, *Gesl. hort. fol. 269.* Ono-
 nis 3. non spinosa purpurea, Tab. lib. 2. fol. 227. Anonis sive
 Ononis sine spinis, *Camer. hort. p. 17.* **Bei Elbing copiosè.**

XLIII. Aparine, *Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 393.* *Bauh.*
Matth. fol. 590. *Fuchf. fol. 50.* *Dod. lateinisch. fol. 353.* *Cord.*
in Diosc. fol. 57. *Lon. deutsch 270.* *Lob. ic. pag. 800.* *Cas. lib.*
8. c. 9. pag. 324. Aparine aspera, *Thal. pag. 10.* Aparine vul-
 garis, C. B. Pin. pag. 334. *Φιλάνθρωπον* ♂, *Diosc.* **Reibkraut**
Ostryca Pol. Am Rneiphöfischen Ball passim. Phalangiorum

& viperarum morfiunculis auxiliatur, Trag. Aqua in puncturis & doloribus hypochondriorum perutilis.

XLIV. Aparine palustris lævis, Thal. pag. 10. Gallium album Tab. lib. 1. fol. 537. Gallium palustre Dod. lateinisch fol. 355. Gallium palustre album, C. B. Pin. p. 335. Weiß glatt Meyerfraut. In locis palustribus passim circa Regiomontum.

XLV. Apium montanum folio ampliore, C. B. Pin. 153. Oreoselinum sive Veelgutta, id est multibona, Dod. lateinisch 696. Oreoselinum, Lob. ic. pag. 707. Clus. hist. lib. 1. 195. Oreoselinum 1. Tab. lib. 1. fol. 342. Bergpeterlein / Bergeppich / Samlod Bor. Zu Duednau aufm Berge. Opych gorny, Pol. Rusticis in frequenti est usu in sanandis pecoribus.

XLVI. Aquilegia fylvestris, C. B. Pin. p. 144. Aquilegia Sebitz. in Trag. deutsch fol. 108. Fuchs. fol. 102. Lon. deutsch fol. 116. Cas. lib. 15. cap. 38. fol. 589. Aquilegia simplex, Cam. pag. 19. Aquilina, Bauh. in Matth. fol. 469. Lob. ic. pag. 762. Tab. lib. 1. fol. 118. Wilde Agley / Cynowod Pol. In der Osterodischen Heyde hinter dem Schilling (lacus est). Item in der Johansburgschen Heyde am Wege. Semen drachmæ unius pondere cum pauxillo eroci sumptum obstructa refert viscera, & experimentum est in ictero, Trag. Variolas quoq; & morbillos egregiè provocat. Cam. Flores cordiales sunt. Aqua ejus stillatitia faciem emaculat & nitidam reddit, aciem oculorum firmat, & caliginem fugat. Aquilegiæ radix & folia colliguntur sole in 1. ☉ existente: flores, sole in ultimo II gradu: semen, ex ultimo ☿ gradu emigrante.

XLVII. Artemisia vulgaris major, C. B. Pin. 137. Artemisia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / 273. Bauh. in Matth. fol. 617. Cord. in Diosc. fol. 58. Cam. pag. 21. Artemisia latioris folii Dod. lateinisch fol. 33. Artemisia mater herbarum,

Lob.

Lob. ic. 764. *Artemisia rubra & alba*, Tab. lib. 1. fol. 34.

Weyß. Bylica Pol. An den Bäumen passim.

Menfes movet, secundinas footusq; extrahit, & uteri præ-
clusioni confert. Carbo sub radice, æstivò solstitio, & ma-
ximè Divi Johannis Baptiste pro Festo, erutâ, inventus, sin-
gularis est virtutis in epilepsiâ, teste Fernel. & aliis. Ejus
rei experimentum Matrem Illustr. Hasliæ Principis Wilhelmi
semel atq; iterum fecisse tradit Petrus, lib. 1. Nos. diss. 6. §. 53.
Artemisia decoctam veterinarii jumentis tussi devexatis utili-
ter porrigunt.

XLVIII. *Arundo palustris*, Bauh. in Matth. fol. 137.
Tab. lib. 1. fol. 703. *Harundo phragmitis*, Ruell. lib. 1. fol.
129. *Arundo vulgaris* sive *Φεγγαίτης*, Diosc. C. B. Pin. 17.
Calamus sive *arundo alia gracilis*, Cas. lib. 4. cap. 59. fol. 186.
Gemein Rohr / Deckrohr. Vitetur ejus ἀνθήλη seu ἀνθ^α
καπαππόμενον flos nempe lanosus, qui sæpissimè aures ex-
surdatur. Am frischen und Curischen Naase it. in Königsberg
in locis palustribus copiosissimè. *Arundo coronat*. Arundine
Lacedæmonii coronabantur festis Promachiorum diebus.
Quodnam id festum sit, certò dicere non possum. Existimo
ἀμυσὶ καὶ ἀπνευσὶ, ac sine inspiratione bibentes festo eo ho-
norari. Προμάχοι quippe antesignani sunt, qui aliis bibendo
præeunt. Arundine autem utebantur, ob dolorem & gra-
vitatem capitis, à vini potu molestam. Vinculum enim
quodvis temporibus admotum prodesse credebant veteres.
Arundo mortem infert. Alexinus Philosophus, qui Ἀλφὸ Φι-
λωνεικότατ^α εἶναι, s. e. ob contentionis studium ἐλεγχῆν^α
dicebatur, è vulnere arundine puncto, mortem oppetiit, in
Alphæo amne natans.

XLIX. *Afarum*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 50.

Fuchf. fol. 10. Bauh. in Matth. fol. 36. Dod. lateinisch fol. 358. Gefn. hort. fol. 249. Lon. deutsch fol. 156. C. B. Pin. pag. 197. Tab. lib. 2. fol. 423. Asarum Baccaris sive baccatus; Lob. ic. pag. 601. Haselwurz, Kopytnik Pol. Floret mense Aprili. Beym Lautschen Teich am Berge / in locis umbrosis.

Virtutes emeticæ, si crudum aut infusum sumatur; diuretica & diaphoreticæ si decoqvatur, utroq; autem modo antifebriles in vulgus notæ sunt. Asarum virtutibus maximè potens censetur, sub elevatione Poli 45. 46. 47. 48. proveniens. Colligatur Ole 15. 8 occupante.

L. Asclepias albo flore, C. B. Pin. p. 303. Hirundinaria, Trag. Sebitz. in Trag. fol. 144. Lon. deutsch fol. 163. Vincetoxicum, Matth. deutsch fol. 336. Dod. lateinisch fol. 407. Asclepias, Fuchf. fol. 130. Gefn. hort. fol. 249. Cxf. lib. 6. c. 72. fol. 269. Schwalbenwurz. Zwycie zyjad, Pol. In der Hollen Grund hinter der Bleich am Berge. Item bey S. Albrecht an den Seebergen copiosissimè.

LI. Asparagus maritimus Dioscoridis, Lob. ic. p. 786. Asparagus marinus, Clus. Hisp. pag. 462. Clus. hist. lib. 5. fol. 179. Asparagus palustris, Tab. lib. 1. fol. 515. Bauh. in Matth. fol. 373. Asparagus maritimus crassiore folio, C. B. Pin. 490. Spargen / Corallenkraut / Jáblonki Pol. Bey S. Lorenz an der See. Item in der Sackau / ubi à nobilium ministris sæpiusculè effoditur & in hortum defertur. Moderatè refrigerat, ficcatur & abstergit. Jecur ac renes infarctu liberat tum radice, tum semine, regioq; morbo succurrit. Urinam ciet, calculos exturbat, semen genitale auget, Veneremq; stimulat. Turiones ejus in acetariis sumpti alvum emolliunt. Asparagus in solo etiam infelici uberat, cornua ovilla, hircina, aut arietina vel integra, vel in pollinem acta, radici si addideris,

deris. Crescit quoq; Asparagus in campis & pascuis ad digiti majoris crassitiem, sed saporis amariusculi. *Beÿ Ragnit auf den Rampen und Wiesen copiosè.*

LII. *Asperula*, sive *Rubeola montana odora*, C. B. Pin. p. 334. *Matrifylva*, Trag. Sebitz. in Trag. fol. 394. Lon. deutsch fol. 270. *Matrifylvia vulgaris*, Thal. p. 77. *Asperula* aut *Asperula odora nostras*, Lob. ic. 801. *Asperula odorata*. Dod. lateinisch fol. 355. *Asperula odorato flore*, Clus. hist. lib. 5. fol. 175. *Aspergula odora nostras*. Adv. Lob. fol. 357. *Hepatica stellata* Tab. lib. 2. fol. 489. *Stern Leberkraut / Waldmeister / Hertzfreude / Meeske Nostratibus*. *Beÿm Lautschen Teich am Berge*. Floret mens. Maji. *Wotrobie ziele gwiãzdziſte Polonis.*

LIII. *Aster montanus luteus salicis glabro folio*, C. B. Pin. 266. *Aster Atticus secundus*, Clus. Pann. pag. 528. *Bubonium luteum*, Tab. lib. 2. fol. 50. *Arnica* item *Alisma*, Officinis. *Gelb Weydenblättericht unrauhes Sternkraut / Wolfserley mulierculis*. *Radix odorata*, & *folia subamara adstringunt*, siccant & in herniis ac ingvinum tumoribus celebrantur. *Vulgus ex præcipitio lapsum iisdem sæpiuscule utitur ad grumos sanguinis dissolvendos, & internas læsiones persanandas*. *Beÿ Wiefdehlen im Gerdauiſchen am Berge*. Flor. circa fin. Julij. *Hirsuties notanda*, quam Tab. quoque ei tribuit, Clus. detrahit. *Folia aspera sunt, & ex atro virent.*

LIV. *Aster luteus hirsuto salicis folio*, C. B. Pin. 266. *Aster Pannonicus tertius*, Clus. Pann. pag. 530. *Aster flore luteo*, Tab. Lib. 2. fol. 51. *Gelb Weydenblättericht rauhes Sternkraut mit gelben Blumen*. *Beÿ Dlenberg (pagus est.) item bey Bladaw am Teich*. Floret circa fin. mens. Julij.

LV. **Artractylis aculeata foliis maximè laciniatis*,

capitulis albis. Joh. Lœf. Stachlichte weißköpfichte Fliegen-
Distel / Weichendistel mit sehr zerschnittenen Blättern. Ex
„radice multis & crassis fibris assurgit caulis bicubitalis, ro-
„tundus, striatus pallidè virens, cui ad radicem paucula-
„assistunt folia maximè laciniata, cardui instar spinosa, dorso
„triangulo, pronâ parte excavato, his consimilia succedunt
„folia, unum alterum ex intervallo fotu suo caulem ambi-
„ens: in summitate caulis nonnihil brachiatus capitula effert
„hirsuta, foliis diffusa suis, quibus flosculi insunt purpu-
„rascentes, ætatis tractu albicantes, capillacei, semen post
„se minutum albicans, pappo instructum, velut in scolymo
„relinquentes. Caulium summitati muscæ numerosæ ad-
„hærent quandoque, & capitella florum siccata, ac concussa
„pulverem reddunt subalbidum, qui, num seminium sit in-
„sectorum, judicet alius. Bey Königsberg copiosè.

LVI. *Atriplex sylvestris* folio sinuato candicante, C.B.
Pin. 119. *Atriplex sylvestris sinuata*, Lob. ic. pag. 254. *Atriplex*
sylvestris 2. Bauh. in Matth. fol. 362. *Atriplex sylvestris*, Cord.
in Diosc. fol. 44. Cas. lib. 4. cap. 23. pag. 160. Tab. lib. 2. fol.
135. *Atriplex fimeteria major*, Thal. p. 8. Wilde Schweiß-
milde mit weißlichten Blättern.

Alternat herba foli natalis respectu: Folia modò tota ex
nigro virent, modò averſa parte albicant, nunc integra ea-
dem sunt, nunc laciniata, & parùm in ambitu incisa. Bey
Königsberg passim.

LVII. *Atriplex sylvestris prima*, Matth. deutsch fol. 158.
Atriplex sylvestris Polygoni aut *Helxines foliis*, Lob. ic. 257.
Atriplex sylvestris Polygoni folio, Cam. pag. 24. *Atriplex*
sylvestris humillima, Dod. lateinisch 615. Kleine wilde Pur-
gir-Milde. Foliis est crassis, succulentis, seminibus in folli-
culis

culis herbaceis. Semen ictericos juvat. *Beym Altstädtschen Wall nicht weit vom Baum.*

LVIII. *Atriplex sylvestris latifolia acutiore folio*, C. B. Pin. 119. *Blitum* 5. & *Atrilicis sylv. genus*, Trag. Sebitz. in Trag. 568. *Chenopodium* 2. Tab. lib. 2. fol. 136. *Breitblättriger Püer / Gänse-Fuß / oder Sämtode*. Sues interimit, Tab. *Bey Königsberg passim.*

LIX. *Balsamine lutea*, seu, *Noli me tangere*, C. B. Pin. 306. *Mercurialis sylvestris altera*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 152. *Tithymalus sylvestris*, Lon. deutsch fol. 130. *Noli me tangere*, Gesn. hort. fol. 268. Cam. pag. 106. Tab. lib. 2. fol. 540. *Persicaria siliqvosa*, sive *noli me tangere*, Lob. ic. 318. *Persicaria siliqvosa Lœbelii* Cam. pag. 122. *Impatiens herba*. Dod. lateinisch fol. 659. *Catanance altera*, Cæs. lib. 6. cap. 68. pag. 266. *Springsaamentraut / Springkraut / Waldwolffs-Milch / Hirschmälde / Borussis.*

Rustici hac plantulâ ætivô tempore aucupium instituunt, & attagenes herbâ allectos tendiculis suis illaqueant. Hirtter dem alten Hammer / in locis umbrosis.

LX. *Barba capræ floribus compactis*, C. B. Pin. 164. *Barbula caprina prior*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 224. *Barba caprina* 1. Lon. deutsch fol. 127. *Barbicapra & Ullmaria vulgi*, Lob. ic. p. 711. Adv. Lob. fol. 318. *Regina prati*, Dod. lateinisch fol. 57. Pann. pag. 699. Clus. hist. libr. 6. fol. 198. Cam. pag. 182. Tab. lib. 2. fol. 452. *Argentilla major*, Thal. p. 5. *Greißbart / Wurmkraut / Weedeßuß* Boruf. Jlmowna Pol. *Bey Königsberg in pratis passim.*

LXI. *Bellis sylvestris caule folioso major*, C. B. Pin. 261. *Oculus bovis*, Brunf. tom. 1. fol. 259. *Buphtalmum majus*, Lon. deutsch fol. 120. *Bellis major*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch

deutsch 114. Matth. deutsch fol. 388. Fuchf. fol. 148. Dod. lateinisch fol. 265. Cæf. lib. 12. cap. 26. fol. 494. Cam. p. 27. Lob. ic. 478. Bellis sylvestris major, Gefn. hort. 250. Bellium majus, Tab. lib. 2. fol. 45. Große Gänseblum / S. Johansblum / grosse Maßlieben oder Zeitlosen. S. Iana glowka Pol. Hinter dem Königsbergfchen Wall in locis arenosis passim.

LXII. Bellis sylvestris minor. C. B. Pin. 261. Primula veris Cæf. lib. 2. c. 26. pag. 493. Bellis minor Bauh. in Matth. fol. 654. Bellis minor sylvestris, Fuchf. fol. 147. Gefn. hort. 250. Tab. lib. 2. fol. 43. Kleine wilde Maßlieben / oder Zeitlosen Stoikroc, Pol. Beym Oberteich in locis palustribus.

Plantula hæc experimentum singulare est, ubi quis medios inter æstus, siti exagitatus, aquam frigidam ἀνυσὶ καὶ ἀπνευσί, h. e. raptim ductimq; sineq; interrespiratione hausit, viperibus damno inæstimabili inde attracto. Hoc casu bellidis folia emundata, & cum olivo, aceto & pauxillo salis, in acætarium componat, totam miscellam ingerat bibo. Quâ sumptâ præsentaneum auxilium visceribus à tono dejectis accessurum brevi cognoscet spatio. Remedium hoc tanto in honore habuit Mindererus de Medic. militari, c. 2, p. 71. & seqq. ut seriò svadeat, valvis foribusq; in universum omnibus, publicis & privatis, id affirmandum esse, quò messorum miseri, hemerodromi, & hujus gentilitatis plures, scirent, se malo pressos ab interitu vindicare.

LXIII. Bellis lutea foliis profundè incisis major, C. B. Pin. 262. Bellis major lutea, Trag. Sébitz. in Trag. deutsch fol. 114. Chrysanthemum, Dod. lateinisch fol. 263. Chrysanthemum folio virentiore, & plures divisuras habente, Camp. hort. pag. 41. Chrysanthemum segetum folio multiscisso, Adv. Lob. 237. Chrysanthemum segetum, Lob. ic.

pag. 552. Chrysanthemum arvense, Tab. lib. I. fol. 454. **Grosse gelbe Maßliebent mit tieff zerschnittenen Blättern.** Steatomata floribus dissolvit, & dolores sistit podagricos. **Nach Lauten** inter segetes. In hortum translatum foliis floribusq; oppidò luxuriat.

LXIV. Betonica purpurea, C. B. Pin. pag. 235. Betonica. Brunf. tom. I. fol. 88. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 157. Bauh. in Matth. fol. 672. Fuchf. fol. 350. Dod. lateinisch fol. 40. Gefn. hort. fol. 250. Lob. ic. pag. 532. Cæs. lib. II. cap. 21. pag. 444. Thal. pag. 19. Tab. lib. 2. fol. 245. **Betonica vulgaris, Clus. hist. lib. 4. fol. 39. Vetonica, Cord. in Diosc. fol. 61. Cord. hist. fol. 165. Braun Betonien.** Potenge Nostratib⁹. Bukwika Brunatna, Pol. Duplex est: altera spicâ brevior, altera longior. **Bey Straubeck** copiosè. **Beym Penar-** tischen Walde/ Item in pratis editoribus passim.

Betonica omnium efficacissima, Ole 30 II visitante: flores colligendi sole sextum vel decimū gradum ☉ occupaturo.

LXV. Betonica alba, C. B. Pin. pag. 235. Brunf. tom. 3. fol. 180. Tab. lib. 2. fol. 245. Betonica albo flore, Dod. lateinisch fol. 39. Clus. Pann. pag. 598. Clus. hist. lib. 4. fol. 38. Cam. hort. pag. 28. Betonica candida, Trag. Kyber. in Trag. lateinisch 197. Vetonica alba, Cord. hist. fol. 165. Weiß Betonien. Bukwika Biala, Pol. **Hinter Fischhausen im Rosen-** pusch.

LXVI. Betula virgulis erectis, Joh. Læfel. Gemeine Birck. passim. Folia calefaciunt, siccant, resolvunt, attenuant, abstergunt & aperiunt. Cortex bituminosus emollit ac discutit. Ex foliis pingviter succosis propolis apum extruitur, & ablactantium tergo imposita lactis ubertatem disturbat, & in arthritide humores crucios egregiè discutit. Folia

betulæ, antequam vergente autumno decidua fiunt, marcidæ ac viætæ, luteo ex marcore jam contracto colore, si diutius in arbore hæreant, hyemem promittunt conclamati frigoris. Res hæc ad trutinam experientiæ ulterius vocetur, quò constet, utrum rusticorum standum sit effatis.

LXVII. *Betula pendulis virgulis*, Joh. Læfel. *Betula*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / fol. 881. Lob. ic. p. 190. Dod. lateinisch fol. 839. *Hangelbirck*. Zu Bladau aufm Berge & alibi passim.

Caudex arboris Martio mense fauciatus dulcem reddit aquam, faciliè in acorem abeuntem. Diuretica est, ac lithontriptica, sanatq; icterum. Refrigerat acore contracto. Destillata omnem amittit gratiam, unde cocta potius cum succo citri miscetur. *Bircken-Wasser*. Sunt autem audaculi satis rustici nostrates in betulis promiscuè vulnerandis, liquoris causa, nescientes capitale olim fuisse supplicium arbores alienas incidere, juxta Servium ad illud Virgilij: atq; malâ vires incidere falce novellas. Plinius hist. natur. lib. XVIII. c. 1. Fuit & arborum cura legibus priscis, cautumq; è XII tabulis, ut qui injuriâ cecidisset alienas, lueret in singulas æris XXV. Virgæ accensæ, & in pelvim positæ succum fundunt pingvitudine oculorum albugines & cicatrices emaculantem, Lob. in Obs. Dum gemmat arbor, nonnulli gemmulas lectas & siccatas in pollinem agunt, emplastrum confecturi; arthriticas cruciabilitates frangens. Ex foliis colorem eliciunt pictores, *Schüttgellb* dictum, hóc modò: Folia tenera ac minuscule adhuc, in aheno affusâ aquâ per horam ac diutius decoqvunt, mox aliquantulo cretæ, in porphyrite pistilli circumactu cominutæ, & aluminis addito, iterum coqvunt & colatum decoctum in fictili asservant, ut subsidat spissius.

Id paulò post, abjectâ aquâ, in umbrâ exsiccant, & usui servant. Dum coquitur materies, spathâ δοκιμασῆν sæpe pauxillum ejus frusto cretæ immittitur, & plus cretæ addit, dilucior si expetatur flavedo. Stymma incolo reliquum tritum, ex fusco flavum suppeditat colorem.

Eadem folia absque cretâ decocta pauxillo alumine juncto, colorem alium pictoribus conferunt, quem *Sütgrün* nuncupant.

Axungiam quoq; betula fundit, quam vulgo *dagget* nominant. Eâ faucia ac phthiriasi infestata pecora unguuntur à veterinariis. Plebs infantulorum umbilico eam immittit, cum vermiculantur, quin & aliquot guttas internè propinat. Cortex molâ confractus cerdonum materies est, *Loh* dicta, Coriis præparandis destinata. Betula terribilis erat Magistratuum virgis: nam fasces olim ex eâ constabant. Cur autem Magistratuum virgæ sint colligatæ, appendentibus & securibus, hanc reddit causam Plutarchus quæstionum Romanarum 82. quia vitia alia sunt sanabilia, alia insanabilia: virgæ eos corrigant, qui in melius mutari possunt, secures præcidunt id, quod corrigi non potest.

LXVIII. Betula pumila. Joh. Læfel. *Kleine niedrige Birke*. Cubitalis & productior sæpe est, foliis subrotundis, julis crassis & curtis. *Im Gebrüch bey Lautenmühl*.

LXIX. Bistorta major radice minus intorta, C. B. Pin. 192. Colubrina & Dracunculus major, Brunf. tom. I. fol. 64. Bistorta major, Trag. Sebitz. in Trag. german. fol. 253. Thal. pag. 19. Tab. lib. 2. fol. 143. Clus. histor. libr. 4. fol. 69. Bistorta Cord. hist. fol. 87. Bauh. in Matth. fol. 674. Dod. lateinisch fol. 333. Cæs. lib. 4. cap. 23. fol. 167. Bistorta Britannica, Lob. ic. pag. 292. Colubrina Lon. deutsch fol. 132.

Limonium, Gefn. hort. fol. 265. *Grosse Schlangen- oder Natertourg.*

LXX. Blitum polyspermon à seminis copiâ, C. B. Pin. 118. Blitum 3. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 568. Blitum sylvestre, Cam. in Matth. 134. Polyspermon, Lob. ic. pag. 256. Tab. lib. 2. fol. 506. Blitum polyspermum, Bauh. in Matth. fol. 358. *Vielsaamen / Fischmolde / wilder Meyer.*

Est piscibus gratissima esca. In fimetis & pingvioribus locis majus in ficcioribus minus conspicitur. Iconismus verior apud Lobelium & Cam. in Matth. Braunius qui alteram Tabernæmontani partem edi accuravit, Polyspermon hoc Dioscoridis vel Tragi Lithospermum esse falso existimat.

LXXI. Blitum rubrum majus, C. B. Pin. 118. Blitum rubeum, Bauh. in Matth. 357. Blitum rubrum, Lob. ic. p. 249. Adv. Lob. fol. 94. Cam. hort. pag. 29. Cæs. lib. 4. cap. 26. pag. 161. Blitum rubens, Dod. lateinisch. fol. 617. Blitum Tab. lib. 2. fol. 141. Lob. Observ. fol. 125. *Grosser rother Meyer / Blutkraut.* Vulgus semine ruffo utitur in dysenteria, & mensium inmoderato fluxu, Tab.

LXXII. Blitum rubrum minus. C. B. Pin. p. 118. Blitum nigrum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 567. Blitum sylvestre rubrum, Gefn. hort. fol. 250. Blitum rubrum supinum, Lob. ic. p. 250. Blitum alterum sylvestre. Cæs. lib. 4. cap. 26. pag. 161. *Kleiner liegender rother Meyer.*

Crassus & succulentus est foliis, sinuatis, pronâ parte virentibus, supinâ albicantibus: caulibus humi jacentibus, rotundis & viridibus, & rubicundis insignitis. Sæpe etiam prorsus rufescunt caules, quandoq; & folia, cum racemoso semine. *Nach dem Bleichgarten bey der Hospitahl- Wiesen in fimetis.*

LXXIII. *Brassica campestris perfoliata* flore luteo. Joh. Loesel. *Brassica sylvestris perfoliata*, Dod. lateinisch 626. *Perfoliata altera*, Trag. Kyb. in Trag. pag. 483. *Perfoliata minor*, Gesn. hort. fol. 271. *Brassica campestris* 1. Clus. Hisp. p. 409. Clus. hist. lib. 5. fol. 127. *Perfoliata Napifolia Anglorum* siliquosa, Lob. ic. 396. *Perfoliata siliquosa*, Adv. Lob. 172. obs. Lob. 215. *Perfoliata Napifolia*, Tab. lib. 2. fol. 433. *Brassica campestris perfoliata* flore albô, C. B. Pin. 112. **Gelber Durchwachs mit Steckrüben-Blättern.** Kapusta Ptonna, Pol. Inter segetes passim. Provenit apud nos flore luteo.

LXXIV. *Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis* C. B. Pin. 112. *Brassica sylvestris virgata*, Cord. hist. fol. 96. *Brassica Sylvestris major latifolia*, Thal. pag. 16. Wiezyczki, Polonis. Ad viarum margines saepe.

LXXV. *Bryonia alba baccis nigris*, C. B. Pin. 297. *Bryonia nigra*, Dod. lateinisch fol. 399. Cord. hist. fol. 116. *Vitis nigra*, Cord. in Diosc. 76. **Hundestürbs / Hundesrüben / schwarze Teuffelskirschen.** Ad sepes hortorum bey Lautenmühl; item bey dem Brandenburgischen Schloß.

LXXVI. *Buglossum vulgare*, Bauh. in Matth. fol. 825. *Buglossa vulgaris*, Tab. lib. 2. fol. 128. *Buglossum angustifolium majus*, C. B. Pin. pag. 256. *Buglossa*, Caes. lib. 11. cap. 2. p. 432. *Buglossa Italica*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 186. Lon. deutsch fol. 176. *Buglossa longifolia*, Card. hist. 135. *Cirsium Italicum*, Fuchf. fol. 343. *Echium Italicum spinosum*, Fuchf. ic. 196. *Anchusa Alcibiadion*, Dod. lateinisch fol. 629. *Buglossum vulgare angustifolium*, Adv. Lob. fol. 246. *Buglossum Italicum*, & *Hispanicum grande*, Cam. hort. 30. *Buglossum Italicum* flore caeruleo. Eystett. **Grosse schmalblättrige gemeine Dohsenzunge.** Wolowy Język, Pol. Bey Königs.

Königsberg passim in locis campestribus & sabulosis. Flos interdum totus rubet.

LXXVII. Buglossum sylvestre flore albo. Joh. Lœsel. **Bey Kratau** in districtu Fischhusiensi, item **bey Holland.**

LXXVIII. Buglossum sylvestre minus alterum & asperius C. B. Pin. 256. Buglossa sylvestris Trag. Sebitz. in Trag. fol. 188. Anchusa minima Cord. hist. fol. 93. Lycopsis, Lon. deutsch fol. 176. **Waldochsenzung.** In agris cultis sæpe reperitur flore cyaneo. Radix vulneribus medetur. Trag. & Lon.

LXXIX. Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus, C. B. Pin. 257. Alysson germanicum Echiioides. Lob. ic. p. 803. Aparine major Plinij, Tab. lib. 2. fol. 467. Buglossæ sylvestris species, Thal. pag. 19. Crucialis quædam, Cæs. lib. 8. cap. 12. pag. 325. Asperugo spuria, Dod. **Niederländisch / fol. 578. Wilde Chsenzunge mit liegenden Stengeln / Schlängengängelein.** Am **Kneiphöfischen Wall** passim.

LXXX. Bursa pastoris major folio sinuato, C. B. Pin. 108. Bursa pastoris major, Brunf. tom. 3. fol. 30. Trag. Sebitz. in Trag. fol. 171. Gesn. hort. fol. 251. Bursa pastoris, Matth. deutsch fol. 213. Adv. Lob. fol. 76. Lob. ic. p. 221. Lon. deutsch 168. Thal. pag. 20. Cæs. lib. 8. cap. 74. pag. 365. Pastoria bursa, Fuchf. fol. 611. Dod. lateinisch fol. 103. Bursa Pastoris major, Tab. lib. 1. fol. 632. **Groß Tschelkraut / Hirtenasch Hirtenseckel / Seckelkraut.** Tobotky Pol. **Bey Königsberg** passim in locis arenosis.

Bursa pastoris manibus contrectata vel pedibus conculcata, ut incalescat, narium hæmorrhogiam certò sistere dicitur. Verior medela hæc: è gradibus gemoniarum scalarum lignolum latum, quò signo erecto altrinsecus affirmantur gradus (das **Berzwickhölzlein**) eximatur, sanguine stillantium narium

rium cruentetur, & inversum in locum pristinum deferatur, tudide id fortiter impellendo. Remedio hoc hæmorrhagiam tolli, deprehenditur experimento. Burse pastoris sub elevatione Poli 45. 46. 47. 48. 49. efficacissima est.

LXXXI. Bursa pastoris minor loculo oblongo, C. B. Pin. 108. Bursa pastoris sexta, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 172. Paronychia Alfinefolia, Lob. ic. pag. 469. Paronychia vulgaris, Dod. lateinisch. fol. 112. Humilis herba affinis Burse pastoris, Cæs. lib. 8. cap. 75. pag. 366. Thlaspios minima species, Thal. pag. 122. Alfine minima, Tab. lib. 2. fol. 382. Gänseblum / Brunf. lateinisch tom. 2. fol. 34. Klein Teschelkraut mit langlächtigen Schöttlein Zanokcica, Pol. Primo prodit vere in locis arenosis & sabulosis circa Regiomontum passim.

LXXXII. Calamintha arvensis verticillata, C. B. Pin. 229. Nepeta agrestis, vel 4. Trag. Kyber. in Trag. p. 17. Calamintha aquatica, Matth. Bauh. in Matth. 529. Calamintha aquatica Belgarum & Matthioli, Lob. ic. 595. Pulegium agreste officinarum, Lob. Obs. fol. 270. Calaminthæ secundum genus Fuchf. fol. 435. Calamintha arvensis, Gesn. hort. fol. 251. Tab. lib. 2. fol. 68. Nepeta Lon. deutsch fol. 142. Ackerminz / Kornminz / wilde Poley. Grati & acris est odoris. Tenuium est partium, incidendo & abstergendo infarctus omnes expedit, urinas ac menses expellit, regium morbum & asthma expugnat. Bey Königsberg passim.

LXXXIII. Caltha palustris flore simplici, C. B. Pin. 176. Caltha Virgillii, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 113. Tus-silago altera, sive farsugium, Bauh. in Matth. fol. 616. Chelidonia palustris, Cord. hist. 122. Caltha palustris, Gesn. hort. fol. 251. Dod. lateinisch, fol. 598. Lob. ic. pag. 594. Cam. hort.

hort. pag. 33. *Caltha palustris vulgaris*, Clus. hist. lib. 5. fol. 114. *Chrysanthemum*, Lon. deutsch. fol. 119. *Epimedium* Dodonæi pag. 42. *Populago*, Tab. lib. 2. fol. 422. *Goldwiesen Blum* / *Schmalzblum* / *Moosblum* / *Mottblum* / *Gelbwiesen Blum* / oder *Dotterblum* / *Ruthblühmen* Nostratibus, Kniec Pol.


Mense Majo in pratis copiosissimè. Prudentius lib. Cathe-
merin. hymn. V. *Caltha dixit numero plurium*, eaq; vo-
cat pingvia.

Illic purpureis tella rosariis

Omnis fragrat humus, calthæq; pingvia

Et molles violas, &c.

LXXXIV. *Campanula vulgatio* foliis urticæ, vel ma-
jor & asperior. C. B. Pin. 94. *Uvularia major*. Trag. Sebitz. in
Trag. deutsch fol. 727. *Campanula*, Fuchf. fol. 432. *Cervicaria*,
Lon. deutsch fol. 206. *Cervicaria major*, Dod. lateinisch fol.
164. *Cervicaria major secunda*, Tab. lib. 2. fol. 121. *Trache-
lion*, *Cervicaria* & *Uvularia* Tragi & Herbariorum Lob. ic.
326. *Trachelium foliis urticæ*, Clus. Pann. pag. 687. *Trache-
lium vulgare*, Clus. hist. lib. 5. fol. 170. *Archangelica*,
Cæs. lib. 9. cap. 29. pag. 386. *Rapi sylvestris* genus foliis ferè
urticæ, Gesl. hort. 276. *Cervicaria maxima* Thal. pag. 32. Ge-
mein Nâßelblättericht scharffes Halskraut. Semel etiam tra-
cheliū hoc viri longitudine reperi. Nach dem Penarti-
schen Walde zu. Caulis eodem tempore mihi idem præstabat,
quod Nastos vel farcta militibus. Siccat, refrigerat, abstergit so-
lidat & adstringit. In ulceribus & inflammationibus faucium,
casu uvulæ, tonsillarum tumore, gargarisatu celebris. In locis
montosis bey Königsberg.

LXXXV. *Campanula vulgaris* μονόκλάν  foliis ur-
ticæ

ticæ flore candido. Joh. Lœf. Nesselblättricht Halskraut mit weisser Blüth. Priori assimilis, sed unicaulis. Hinter Lattenwald im Gebirg.

LXXXVI. *Campanula pratensis* flore conglomerato C. B. Pin. 94. *Uvularia exigua*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 727. *Rapi sylv. genus*, *Uvularia in pratis*, Gesn. hort. 276. *Trachelium minus*, Lob. ic. pag. 326. Adv. Lob. 139. Clus. hist. lib. 5. fol. 171. *Cervicaria tertia*, sive minor, Dod. lateinisch 165. Klein Halskraut mit leicht an einander gesetzten Blumen. In der Hollen Grund.

Flores vel in summitate caulis in orbem sunt congesti, vel singulares per caulem sparsi. Bracchiata adeò nonnunquam est, ut sedecim in uno caule notàrim ramos, floribus calathyformibus onustos. Bey Lautenmühl in locis arenosis.

LXXXVII. *Campanula oblongifolia* flore cæruleo in summis cauliculis, Joh. Lœf. Blaue Glockenblum mit länglichten Blättern/ dessen Blümlein auf den obersten Stengeln. Vid. Num. 418. Beym Penardschen Wald. Floret mense Junio & Julio.

LXXXVIII. *Campanula oblongifolia* flore albo in summis cauliculis. Joh. Lœfel. Weisse Glockenblum mit länglichten Blättern/ dessen Blümlein auf den obersten Stengeln. Bey Cumainen in locis montosis & umbrosis. Floret mense Junio.

LXXXIX. *Cannabis erratica* C. B. Pin. pag. 320. *Cannabis foemella* Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 279. *Cannabis erratica paludosa sylv.* Lob. ic. 526. Adv. Lob. 227. Obs. Lob. 284. *Cannabis sterilis*, Dod. lateinisch fol. 535. Wilder Hanff. Am Rneiphöfischen Wall copiosissimè. *Cannabis hujus erraticæ decoctum cimices necat.* *Cannabina aquatica folio*

tripartitò diviso C.B. Pin. Hepatorium aquaticum Dod. ver-
bena supina vel. 3. Trag. Sebitz. in Trag. Bidens foliis tripar-
titò divisis Cæs. Conyza palustris foliis tripartitò divisis. J.L.
Wasserdürwurß mit tieff zerschnittenen Blättern.

Plantula est vulneraria, sed à nostris chirurgis negligitur.
In humidis & squalidis passim exit. Floret Jul. & Aug.

XC. Carduus in avenâ proveniens, C. B. Pin. 377. Car-
duus syl. in avenâ Trag. Sebitz. in Trag. 674. Carduus ave-
narius Thal. pag. 34. Carduus arvensis Tab. lib. 2. fol. 375.
Ackerdistel / Haberdistel. Osat Pawloczwy, Pol. Flosculus
est purpureis. Inter segetes passim.

XCI. Carduus lanceolatus, Tab. lib. 2. fol. 374. Car-
duus lanceatus latifolius C. B. Pin. 385. Breitblätterig Speer-
distel. Secus vias sæpissimè reperitur.

XCII. *Carduus spinosissimus angustifolius vulga-
ris, C. B. Pin. 385. Agriacantha, Ruel. fol. 18. lin. 9. Carduus
sylvestris tertius, Dod. lateinisch fol. 740. Carduus spinosif-
simus vulgaris. Polycantha Theophrasti, Lob. ic. 21. o. Acu-
leosa Gazæ, Adv. Lob. fol. 374. Polyacantha Theophrasti Tab.
lib. 2. fol. 376. Bielschlichte Ackerdistel mit schmalen
Blättern / klein Wegdistel / wilde sehr stechende Distel. Passim.

„ Radix ex numerosis filamentis, crassis, longis, rotundis,
„ fibratis, albis, constituta, caulem emittit digiti crassitie,
„ bicubitalem, viridem, striatum, quinis locis fimbriatum,
„ aculeatum, strenuè brachiatum, concavum: folia in solo
„ humidiore luxuriantia, ac terræ proxima, duodecim un-
„ cias longa sunt, tres lata, in ambitu profundè satis incisa
„ hirsuta, pronâ parte atrovirentia, supinâ cum lanugine
„ pallentia: ramulorum singulorum exortui subservit folium
„ spinosum, cujus generis alia ex intervallo exadversum ra-
mulis

mulis assistunt folia, minus profundè in circuitu secta ac " hirta: flores ramulorum apicibus inhærent purpurei, ex " concursu capitulorum squamosorum trium, quatuor, quin- " que vel sex interdum glomerati, tractu ætatis in pappos abe- " untes: semen oblongum & album est pappis remotis. "

XCIII. Carduus spinosissimus angustifolius pratensis.
Joh. Lœf. *Vielftachlichte Wiesen-Distel mit schmalen Blät-*
tern. Diversitas est in hoc carduo ratione ætatis. Qui an- " nosa est radice, unicaulis sæpissimè visitur, rarò multicaui- " lis, quatuor ulnarum proceritate, crassitie unciali, & quod " excedit. Thyrsus est egregiè striatus, quibusdam in locis " fimbriatus, foris viridis, quandoq; atrorubens, spinis hor- " ridus, intus concavus, in fastigio ramosus, floribus purpu- " reis congestis, in pappos dilapsis, oppidò luxurians. Fo- " lia proximè terram majora sunt, profundius incisa, aculeata, " hirsuta, queis inordinatè disposita, succedunt folia, cauli " adhærentia, ex nigro viridia, carduo lanceolato effigie pro- " xima, aversâ parte lanugine tecta. Radix ex multis fila- " mentis rotundis, crassis & candidis constituta, sapore est " aromatico, modicè adstringente & siccante. Tenerior ra- " dice carduus, ætate majori cedens, ramulorum ferè expers " est, foliis paucioribus, ad nervum usq; Jaceæ instar, pro- " fundissimè dissectis, quorum infima intrinsecus dilutè vi- " ridia & minora. Seminis figura rotunda. *In der Hullen,* " *Grund hinter der Bleich auff der Wiese.*

XCIV. Carlina acaulos magno flore, C.B.Pin. 380. Eber-
wurz / Brunf. deutsch fol. 218. Chamæleon albus, Bauh. in.
Matth. fol. 490. Cord. in Diosc. fol. 50. Cerdopatium caule
nullo, Gesn. hort. 251. Carlina herbariorum. Lob. Obs.
fol. 479. Chamæleon albus Dioscoridis, Lob. ic. 4. o.

Clus. histor. lib. 5. fol. 155. *Carlina altera*, Dod. lateinisch fol. 727. *Carlina vulgo*, Cæs. lib. 13. cap. 38. pag. 527. *Carlina sessili flore ἀκωνίτης*. Cam. hort. 35. *Weisse ohnstängliche Ebermurg*. Ofetek Pol. Sudo cœlo floris capitulum hincit, ac patulum perstat, imbrico ac pluvio clauditur. Partium est tenuium, sudores mover, jecoris ac lienis obstructions solvit, saccatum humorem mensesq; citat, ac latas interaneorum tinea expellit. In der Osterodischen Heyde hinter dem Schilling gegen Werlitten (pagus est) über. Floret circa finem Julii.

XCV. *Carum*. Bauh. in Matth. fol. 553. Cord. in Diosc. fol. 54. Lob. ic. pag. 724. Dod. lateinisch fol. 299. Tab. lib. 1. fol. 171. *Cuminum pratense*, carui officinarum, C. B. Pin. 158. *Caros*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 361. *Carus*, *Caros*, vulgo *carui*, Gesn. hort. fol. 251. *Careum*, Fuchs. ic. pag. 224. *Carui*, Lon. deutsch fol. 260. Cæs. lib. 7. cap. 25. pag. 291. Thal. p. 28. *Wiesenkümmel*. Kmin pólny. Pol. Calefacit & siccatur, aperit, incidit, digerit, concoquit & dissolvit. Radix pastinacæ instar edulis est, apris admodum expetita. In pratis & campestribus pingvibus. Zu Langkayn & Wiesdehlen / in Districtu Gerdaviensi aliquot modii sæpe colliguntur seminis.

XCVI. *Caryophyllata vulgaris*, C. B. Pin. pag. 321. *Garyophyllata*, Burnf. lateinisch tom. 3. fol. 24. Trag. Kyber. in Trag. 67. Lon. deutsch fol. 156. *Caryophyllata* Matth. Bauh. in Matth. fol. 697. Dod. *Niederländisch* 198. Tab. lib. 1. fol. 403. *Caryophyllata vulgaris*, Cam. hort. 35. Clus. hist. lib. 5. 102. *Vulgaris Caryophyllata*, Lob. ic. pag. 693. Adv. Lob. 309. *Caryophyllata seu benedicta herba*, Thal. 28. *Benedicta* Gesn. hort. fol. 250. *Gariofilata*, Cæs. lib. 14. c. 12. pag. 550. *Benedictenmurg* / *Benedictenfraut* / *Nardenmurg* /

Nasenang / Heyl aller Welt. In der Hollen Grund passim,
Radix Caryophyllatæ eruatur Olei. Q occupante: flores,
Ole 30. II inhabitante. Caryophyllatæ & hyperici radi-
ces taffetto insutæ, & collo appensæ, melancholiam avertunt,
memoriam & oculorum aciem firmant, & catharros absum-
unt. Radices effodiantur, Sole I. Q tenente: taffetto vel
sindoni includantur, Ole 15. X inhabitante: collo appendan-
tur, Ole I. 8 occupante.

XCVII. *Caryophyllata aquatica nutante flore, C. B.*
Pin. 321. Benedicta sylvestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch
412. Geum rivale, Gesn. hort. fol. 260. Caryophyllata sep-
tentrionalium rotundifolia papposo flore, Lob. ic. 694. Adv.
Lob. 309. Caryophyllata montana Dalechampii, Eystett.
Caryophyllata montana prima Clus. Pann. pag. 434. Clus.
hist. lib. 5. fol. 103. Caryophyllata palustris major seu purpu-
rea, Thal. pag. 28. Caryophyllata palustris, Cam. hort. pag.
36. Wasser-Benedicten Würgel/ Wald-Benedicten Würg
mit hangender Blüth. In locis uliginosis bey Königsb. passim.

XCVIII.* *Caryophyllata prolifera flosculis elegantis-*
simis Joh. Lœf. Fruchtbar Benedicten Würg mit herrlicher
Blüth. Planta est cubitalis ferè, quandoq; minor caule sub-
hirsuto foliis circa radicem majusculis, Caryophyllatæ mon-
tanæ æmulis: flosculos fert sedecim, quandoq; pauciores,
qui è tenui origine sensim producti dilatantur & in summita-
te crenatâ conspiciuntur. Flores hi caulem ambiunt susten-
tati à foliolis octo vel duodecim. Caulis è medio flosculo-
rum ulterius progrediens iterum flosculis ornatur, foliolis
proximè subvectis. Radice nititur longiusculâ foris subrusâ
ac filamentis suis instructâ. Zu Birkenfeld. Item in Schacken.
Caryophyllata hæc καλλιπύργος benè dici potest, h. e.

pulchrē turrita, cūm florem turris instar extrudat. Vocanda est ex agro in urbem ob florum elegantiam, veluti puellæ illæ rusticanæ καλλιπυγοί dictæ, ob natium pulchritudinem in urbem accersebantur, de quibus hæc memoriæ proditur historia: Rustici viri formosæ duæ filiæ in publicam viam, egressæ, ambitiosius inter se decertabant, utri pulchriores nates essent. Prætereunti juveni, cujus pater senior erat, inspicendas se ambæ obtulerunt. Utramq; ille conspiciatus, natu majoris pulchriores esse judicavit, & ejus amore captus est. Reversus in urbem, cum æger decubisset, juniori fratri exposuit, quod acciderat. Rus ille profectus, & puellas contuitus, alteram amavit. Juvenum pater cum instaret, ut splendidius matrimonium sibi quærent, idq; persuadere non posset, puellarum non invito parente, illas evocat ex agro, & cum filiis collocat. Eas cives καλλιπύγες, natibus & clunibus pulchras vocârunt, & eo nomine templum Veneri, quam & Callipygon nominârunt, exstruxerunt. Cæterum inter laudes mulierum etiam fuere olim καλλιπλόκαμοι καὶ καλλίσφυροι: inter vitia, compernis, vulgò, valga extritus talus, crura exiliora. Quibus erant extriti tali, λαοποδίας vocabant, tenuiora crura crotila quasi κατῖλα.

XCIX. Caryophyllus arvensis glaber flore majore, C. B. Pin. pag. 210. Euphrasia gramen, Trag. Kyber. in Trag. 329. Gramen Fuchf. fol. 136. Gramen Leucanthemum, Dod. Iat. teinisch p. 365. Gramen λευκάνθεμον Dodonæi, Cam. in Matth. fol. 345. Thal. 49. Gramen alterū Bauh. in Matth. fol. 708. Holosteuum Diosc. floribus albis, vel ὀλόσεων Æginetæ, Adv. Lob. 17. Holostium Ruellii, Lob. ic. p. 48. Euphrasia major, Lon. deutsch fol. 133. Gramen floridum Tab. 1. 1. f. 667. Gramē floridū majus Tab. ic. 232. Unkrauthe Acker Naglein mit grosser Blüth/ Augen-

Augentrost: Gras / Teuffelsblumen / Brustkraut. Sitna
Trawa, Pol. In sylvis passim.

C. Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore C. B.
Pin. 210. Caryophyllus holostius, Lob. ic. pag. 446. Holo-
stium Caryophyllæum Tab. lib. i. fol. 668. **Rauge Acker-
Näglein mit grosser Blüth / Weiß Näglein: Gras / Herz-
Köflein: Gras.** Am Rneiphöfischen Wall passim.

CI. Caryophyllus arvensis hirsutus flore minore,
Joh. Læf. Holostium caryophyllæum arvense, Tab. lib. i. fol.
668. **Rauges weiß Acker-Näglein: Gras mit kleiner Blüth.**
NB. Hirsuties apud Tab. desideratur.

CII. Caryophyllus barbatus sylvestris, C. B. Pin. 209.
Armeria sylvestris altera, Lob. ic. pag. 448. Caryophyllæa
sylvestris prima, Thal. pag. 25. Flos Gariofilus sylvestris mi-
nimi floris saturatæ purpuræ, Cæf. lib. 6. c. 45. pag. 253 & 254.
Wilde rothe barrige Näglein / Thiernäglein Nostratibus.
Calyculi ejus cincti sunt foliis fastigiatis. Flosculi rubei. **Ben-
der Balga am Hase.** Item bey dem alten Hammer.

CIII. *Caryophyllus arvensis calyculo florum nu-
meroso. Joh. Læf. Radice est subnigrâ, aliquantulum fi-
bratâ, cauliculis subasperis, ad genicula foliis duobus tenuis-
simis, quorum summo insident calyculi florum plures pur-
purascentes. Convenit ferè cum Caryophyllo barbato syl-
vestri C. B. nisi quod hic obtineat folia tenuiora, & calices
florum minus foliis stipatis. **Bey Holland in arvis copiosè.**

CIV. Caryophyllus minimus muralis, C. B. Pin. p.
211. Tunica minima, Lugdun. **Kleine Maur: oder Weg-
näglein.** In sylvis propè vias sæpiusculè observatur.

CV. Caryophyllus plumarius albus, Tab. ic. pag. 286.
Caryophyllus flore tenuissimè dissecto. C. B. Pin. 209. Su-
perba,

perba. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 459. Lon. deutsch, fol. 218 Superba, Tragi. Thal. pag. 105. Cam. hort. 165. Betonica sylvestris altera, Fuchf. icon. p. 201. Caryophyllus minor Dod. lateinisch 174. Superba recentiorum, Adv. Lob. 198. Superba alba, medio corollâ purpureo-violaceâ obsoletâ cincta Lob. ic. 450. Caryophyllei sylvestris qvinti species tertia, Clus. hist. lib. 3. fol. 284. Caryophyllus sylvestris flore albo picto Eystett. superba alba corollâ purpureo-rubrà. Swert. florileg. part. 2. fol. 18. Weiß Pflaum-näglein Tab. Hochmuth und Meuthwillen / Lon. Feder Nägeln Bo-russis. Svavissimi est odoris. In der Brandenburgischen Heyde copiose.

CVI. Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius, C. B. Pin. 209. Caryophyllus montanus albus, Tab. ic. pag. 288. Flore est candido, purpurascente, in medio variegato engblätterige Waldnägelein / dessen Blüht bald weiß / bald purpurfarb / bald sprenglicht. Weiße wilde Steinnägelein / Tab. Heydnägelchen Nostratibus. In der Brandenburgischen Heyde passim.

CVII. Caryophyllus montanus minor, C. B. Pin. 211. Pseudomoly Dodonæi, Gesn. hort. fol. 268. Gramen polyanthemum minus, Dod. lateinisch, 564. Dod. Niederländisch 896. Gramen marinum minus Clus. Pann. pag. 327. Tab. lib. 1. fol. 664. Caryophyllus marinus omnium minimus. Lob. 452. Adv. Lob. 139: Amerius montanus tenuifolius minor. Clus. hist. lib. 3. fol. 287. Klein Meer-Gras / Tab. See-Gras / Meernägelein / Meer-oder See-Gras-Blumen vulgò. Auf der Curischen Nährung zwischen Lattenwald und Runken im Gebirge. Floret mense Augusto.

CVIII. Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici, feu

feu flosculi C. B. Pin. 210. Flos cuculi pratensis, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 319. Flos cuculi, Lon. deutsch. fol. 207. Tab. lib. 2. fol. 13. Odontitis Plinii, Gesn. hort. fol. 269. Odontis quorundam. Cam. pag. 169. Odontitis Plinii simplici flore, Clus. hist. lib. 3. fol. 292. Armerius sylvestris, Dod. lateinisch fol. 177. Armoraria pratensis sylvestris. Flos cuculi, Lob. ic. 451. Armoraria sylvestris pratensis, Adv. Lob. fol. 189. Ἰξοκλῦς altera, Thal. pag. 59. Gauchblum. Tab. Lon. Sebitz. in Trag. Guckgucksblumme Nostratibus. Est & flore albo. In pratis passim bey Königsberg.

CIX. Centaurium minus, C. B. Pin. 278. Centaurea, Brunf. lateinisch. Tom. 3. fol. 125. Cæs. lib. 6. c. 63. pag. 264. Centaurium minus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 140. Bauh. in Matth. fol. 488. Matth. deutsch, fol. 255. Fuchf. fol. 387. Dod. lateinisch 336. Dod. Niederländisch / 541. Cord. in Diosc. fol. 50. Cam. hort. pag. 37. Thal. pag. 26. Centaurium minus flore rubro. Eystett. Centaurium parvum, Lob. Obs. fol. 218. Centaureum minus, Lon. deutsch 117. Klein Tausendgülden / Fuchf. Seb. in Trag. Lon. Gemein Tausendgülden und Erdgall / Matth. deutsch. Fieberkraut / Bieberkraut / Tausendgüldenkraut. Aurin vulgò. Laurin Nostratibus.

Calefacit & siccatur, abstergit, attenuat, aperit. Bilem & crassos humores per alvum exigit, menses movet, & alvi tinea pellit. Recens tusa illitu vulnera conglutinat, ulcera purgat, & cicatrice obducit, Diosc.

Ex plantulâ recente lege artis spiritus maximè igneus elicetur sine additamento. Beym Penartischen Walde. It. bey Mühlhausen und Holland copiosissimè in agris incultis, præsertim editioribus.

CX. Centaurium minus floribus albis. Joh. Loesel.

Fieberkraut mit weissen Blumen. Rarius occurrit, hortis digna planta.

CXI. *Cerasus avium racemosa*, Lob. ic. 174. o. *Cerasus racemosa*, Adv. Lob. fol. 436. *Pseudoligustrum*, Dod. lateinisch fol. 777. *Cerasia racemosa rubra & nigra*, Tab. lib. 3. fol. 695 & 696. *Cerasus avium*, Clus. hist. lib. 1. fol. 65. *Cerasus racemosa sylvestris*, Eystett. An *Cerasus sylvestris*? Cæs. lib. 2. cap. 20. pag. 51. *Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli*, C. B. Pin. 451. *Arbuscula sylvestris Cerasi foliis, fructu virgæ sanguineæ ferè*, Gesn. hort. fol. 248. Schwarze und rothe Vogel-Kirschen Tab. Arbor Borussiae Faulbaum / baccæ Ahlkirschen dicuntur. Nuclei, qui in officulis continentur, cerasi nucleos sapore referunt. Temperatè sunt calidi, & urinam movent, Dod. Fructus in racemis nigricans etiamsi sit dulcis, facile tamen nauseam parit. Astringens est & alvum cohibens. Estur à pueris innoxie. In der Dollen Grund passim.

CXII. *Chamaecerasus dumetorum fructu gemino rubrô*, C. B. Pin. 451. *Halimus Trag.* Seb. in Trag. deutsch fol. 780. Lon. deutsch fol. 63. *Periclymeno cognatus sylvestris fructus*, Gesn. hort. fol. 271. *Xylosteum*, Dod. lateinisch fol. 412. Cam. hort. pag. 183. *Xylosteon*, Dodonæi, Thal. pag. 133. *Periclymenum alterum Allobrogum, cornus fœminæ effigie*, Adv. Lob. 280. *Periclymenon Allobrogum, sive Periclymenum rectum*, Lob. ic. 633. *Periclymenum rectum fructu rubro*, Clus. Pann. 87. *Periclymenum rectum primum*, Clus. hist. lib. 1. fol. 57. *Periclymenum rectum*, Tab. ic. 899. *Xylostium floribus albis vulgarius*, Eystett. Aufrechte Baldrinde / oder Zäunling / Tab. Weinhölzen Helvetiis, Gesn. hort. Hundskirschen / Teuffelskirschen vulgò. Bey Brandenburg

denburg auff dem Lenzberge. It. im Neuhausischen Schloß
graben.

CXIII.**Chamæcistus vulgaris flore luteo*. C.B.Pin. 465.
Hyssopus campestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 177. *Panax chironium*, sive *flos Solis*. Bauh. in Matth. 546. *Gratia Dei*. Gefn. hort. 261. *Helianthemum Plinii*. Clus. Hisp. 153.
Chamæcistus primus. Clus. hist. lib. 1. fol. 73. *Flos solis*. Dod. lateinisch 193. *Flos solis* Matth. Cam. hort. pag. 61. *Helianthemum secundum Germanicum* Tab. lib. 3. fol. 767. *Helianthemum*; Cord. hist. fol. 89. Lob. ic. pag. 117. o. *Helianthemum flore luteo*, Eyfett. *Consolida aurea Chirurgis quibusdam*, Cord. hist. 89. *Hyssopus montanus sive sylvestris*, Lon. deutsch 150. *Chironica*, Cæs. lib. 10. cap. 46 pag. 397. *Gulden Heilkrant. Heiden/ oder Berg/ Hypp/ Lon. Sonnen Blum oder Sonnengümel/ Tab. Heiden/ Hypp oder Elisabeth Kraut vulgò.* Bey dem Penartschen Walde in locis incultis.

Plantula est cubitalis, succulosa, radiculis lignosis, contortulis sæpè, foris atrorubentibus, intus candidis, fibris plusculis: Cauliculis rotundis, virentibus; ætatis tractu rufescentibus, hirsutis ac nodosis: foliis ad genicula binis majusculis, oblongis, viridibus, hispidis, alia minora sub se habentibus: flosculis croceis, quinq; foliolis, in ambitu leviter crispatis constantibus, ac in meditullio luteolæ stamina, petiolum ambientia, foventibus. Vanescentibus floribus succedit semen minutum ac rufulum, pericarpis oblongis, triangulis, ternis glumis striatis circumdatis, inclusum.

CXIV. *Chamædris spuria major altera s. frutescens* C.B. Pin. 248. *Teucrium quartum*, Clus. hist. lib. fol. 349. *Teucrium i. vel teucrium majus Pannonicum latifolium*, Clus.

Pann. 612. *Susankenkraut / Mutterkraut / Borussis*. Aperit, incidit, abstergit, lotium mensesq; citat, jecur & lienem infractu expedit. In ascensu valli Palæopolitani passim. Decoctum ejus frequentissimi & saluberrimi usus est rusticis fœmellis, in præfocatione uteri.

CXV. *Chamæmelum vulgare, Leucanthemum Diosc.* C. B. Pin. 135. *Chamæmelon Leucanthemum Fuchf.* fol. 25. *Chamæmelum Leucanthemum, Gef. hort.* 252. *Anthemis vulgator, sive Chamæmilla, Adv. Lob.* 342. *Chamomilla 3, & sylv. Trag. Sebitz, in Trag. deutsch* 118. *Anthemis Cord, in Diosc.* fol. 59. *Anthemis, sive Chamæmelon, Bauh. in Matth.* 649. *Chamillen / Brunf. deutsch* fol. 136. *Chamæmelon Thal. p.* 33. *Chamæmelon, Tab. lib. 1. fol. 71. Chamillen Blum Tab. Camillen, Fuchf. Chamillen / Seb. in Trag. Magdt Blum / Haugen Blum / vulgò. Romeny Nostratibus. Ad sepes hortorum.*

CXVI. *Chamæmelon Fœtidum, C. B. Pin.* 135. *Cotula fœtida, Gefn. hort.* fol. 271. *Lon. deutsch.* fol. 121. *Cam. hort. pag.* 49. *Eustett. Chamomilla secunda & Sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch* 118. *Cotula alba, Dod. lateinisch* 258. *Parthenium Fuchf.* fol. 583. *Adv. Lob. fol.* 344. *Parthenium Dioscoridis Tab. lib. 1. fol. 84. Cotula fœtida Parthenii 4, species. Brunf. lateinisch tom. 1. fol. 255. Buphthalmū minus, Cord. in Diosc.* fol. 60. *Cotula fœtida officinarum est Parthenium vel Virginea, Lob ic.* 773. *Chamæmelum album, seu fœtidum Thal.* 33. *Cota vulgò, Buphthalmon Diosc. Gall. & Plinij. Cæf. l. 12. c. 23. p.* 492. *Krottendill / Tab. Lon. Seb. in Trag. Fuchf. Hundsdill und Hundsb Blumen Cord. Diosc. Hundromen Borussis. Calefacit, incidit, aperit, sangvinis grumos dissolvit, tineas expellit, ac fœminas præfocatas, ab utero juvat. Jumentis*

tis ac ovibus porrigitur asthma correptis. Cæterum apibus infensa est, fugatq; pulices in loca pulicosa coniecta. Inter segetes passim.

CXVII. Chamæmelon inodorum C. B. Pin. 135. Cotula alba non foetida. an Melandrium Plinii? Dod. lateinisch. fol. 258. 259. Buphthalmum Fuchf. fol. 144. Buphthalmum majus. Cord. in Diosc. 60. Chamomilla fatua & 4. Trag. Seb. in Trag. deutsch/ 119. Cotula inodora. Adv. Lob. 345. Cotula, Tab. lib. 1. fol. 86. Hundsangen oder wilde Chamillen/ und Streich Blum/ Tab. Ruhdill/ Hundsang/ Ruhang Dod. in locis arenosis & sabulosis bey Königsberg.

CXVIII. Chelidonium majus vulgare C. B. Pin. 144. Chelidonium majus Trag. Seb. in Trag. deutsch 82. Matth. deutsch. 246. Dod. lateinisch. fol. 48. Gefn. hort. fol. 252. Fuchf. fol. 365. Cord. in Diosc. 49. Lob. ic. pag. 760. Tab. lib. 1. fol. 122. Cæs. lib. 6. cap. 73. pag. 269. Thal. p. 33. Chelidonium majus. Hirundinaria major. Adv. Lob. 399. Chelidonia (quam hirundo *ἐλαυνὴ ζεφύρου πρωταγγελθεῖς*, eruptionem nunciat) Brunf. lateinisch/ tom. 1. fol. 236. Schelmurg oder der Schwalbenkraut. Tab. Groß Schwalbenkraut. Matth. Goldwurz. Dod. Schin-Kraut. Boruffis.

Ejus usus insignis est in pluribus morbis, de quibus apud Practicos. Sucus verrucas sanat illitus. Difficulter abluitur partes corporis commaculans. Ut Chelidonium manus croceo inficit colore, difficulter abluendo, sic pulvisculus est, argentum absq; hydrargiro verè ac constanter inaurans. Res hæc cum scitu sit digna, eam lectori detegere hic stat sententia. Modus talis est: Auri obryzi, antimonii ope perpurgati, drachmis duab⁹ affunde, vel spirit⁹ salis, pauxillo Spiritus nitri fortificati, vel aquæ Regis. s. q. soluto auro adde salis nitri candi-

diffimi scrupulos quatuor. Eliqvatonitro, linteum purissimum auro soluto immitte, quò omnem imbibat tincturam. Imprægnatum mox linteum in tigillum defer, structo carbonum igne circulari, & exure sensim omnia, ut candescant vi ignis, nō liquefcant. Pulveri in fundo relicto in vase vitreo limpidam infunde aquam, & plenè dulcatum & siccatum serva auraturæ. Usus: pauxillum pulveris humectati alutâ, excipiat ac deaurando inducatur argento. *Ben Königsberg passim. It. an den Säunen in Gärten.* Chelidoniæ majoris vis excellens sub elevatione Poli 45. 46. 47. 48. Radix eluenda, ☉ in primo ♀ gradu versante: folia colligenda 20. ♀, sole occupante, semen in ultimo ♀ gradu constituto sole.

CXIX. Chelidonia rotundi folia minor. C.B.Pin. 309. Chelidonium minus Trag. Sebitz, in Trag. deutsch 89. Matth. deutsch. 248. Cord. in Diosc. fol. 49. Cord. hist. fol. 121. Lon. deutsch fol. 291. Dod. lateinisch fol. 49. Fuchsl. fol. 867. Gesl. hort. fol. 252. Tab. lib. 2. fol. 427. Thal. p. 33. Lob. ic. p. 539. Chelidonium minus, sive hirundinaria minor. Adv. Lob. 257. Favagello. Cæs. lib. 14. cap. 7. pag. 546. Feigwarthen-Kraut / Klein Schöl-Kraut / Matth. Feigblätter-Eppig Seb. in Trag. Kleine Schelmwurk. Lon. Schörbocks-Kraut / Biber-Nödlein / Pfaffen-Nödlein / Blatern-Kraut und Meyen-Kraut vulgò Geselblum Nostratibus.

Causticum non est, nec calefacit excessu, ut quidam existimant, cū inter acetaria sæpiusculè in usum veniat, & omnis acrimoniæ prorsus sit expers. Diversum itaq; est nostrum Chelidonium minus à Chelidonio Veterum, cui Galenus 8. simpl. causticam assignat vim, idq; calidius chelidonio majore pronunciat. Erumpit primo vere, sæpius Martio Mense, quò tempore Rhodiis olim illud medicandi genus

nus erat usitatum, χελιδονίζειν h. e. hirundinare, vel hirundinis nomine stipem rogare, nominabant, ubi aclamabatur:

Venit tandem, venit hirundo, quæ pulchra

Tempora, 5 annos adducit pulchros

Albo candida, tergo nigra.

Tempus hoc etiam illi Leporum generi quos Chelidonios appellabant veteres, nomen dedit. Existimo lepores esse Martio Mense natos, vel captos, quorum sanguis dysentericis perutilis. Circa Regiomontum passim. Item in der Hollen-Grund.

CXX. *Chrysanthemum foliis tanacetii. Joh. Læsel. Goldblum mit Reinfahr-Blättern.

Radix lignosa & fibrosa cauliculos edit rotundos subhirsutos, ramosos: folia multifida tanacetii instar levi hirsutie incana propè terram numerosa, post alternatim cauliculis adhaerentia: flores fert aureos in caulium summitatibus velut Chrysanthemum Matth. Bey Lanchheim circa viam am Berge It. Bey Wiefdehlen am Berge.

CXXI. Cichorium Sylvestre sive officinarum C. B. Pin. 125. Cichorium agreste. Lon. deutsch. fol. 125. Cichorium sylvestre, Picris, Dod. lateinisch. fol. 635. Cichorium, Cord. hist. 141. Tab. lib. 1. fol. 577. Cæf. lib. 13. c. 2. fol. 506. Solsequium Brunf. tom. 3. fol. 94. Intybum agreste Gesn. hort. fol. 262. Intubum sylvestre Fuchf. fol. 1679. Seris Sylvestris Picris, Cichorium, Adv. Lob. 82. Seris Picris Sylvestre Cichorium. Lob. ic. 228. Cichorea sylvestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 216. Intybus erraticus, sive cichorium sylvestre, Matth. deutsch 176. Feldwegwart/ Matth. Wegwart. Tab. Brunf. wilde Wegwart. Sebitz. in Trag. Sonnenwirbel und Hundläufft/ Lon. Sonnenwend/ Sonnenkraut

nen-Kraut/ und Sonnen-Braut vulgò. verfluchte Jungfrau Borussis. Hinter dem Kneiphöfischen Wall. Item zwischen Pinnau und Brandenburg circa vias copiosè.

Caulis cichorii, scrobiculo prius terrâ erutâ factò, proximè radicem exscindatur, post ictericus radicem lotio perpluat, abscissum caulem in locum natalem componat, ac terrâ iterum obruat, liberandus ab aurugine, remedio si sit fidens.

CXXII. Cichorium sylvestre flore albo. Joh. Lœsel. wilder Wegwart mit weißen Blumen. Hinter Morungen circa vias. It. Beym Ritter-Krüge im Balgischen.

CXXIII. Cicutaria palustris latifolia alba. C. B. Pin. 161. Cicutaria palustris, flore candido. Cam. pag. 41. Breitblättriger Wasser-Schirling / Witscherling / Gerstkraut / quia pecora ab ejus usu intumescunt. Groß Wehdenduncß Nostratibus. In locis palustribus bey Königsberg passim.

Pœna legis Corneliæ tenebantur pigmentarii, si cui temerè cicutam, aconitum & mandragoram dedissent. l. ejusd. ff. ad legem Corneliā de sicariis, & veneficiis. Apud Athenienses publica pœna frequens cicuta, aut venenum erat. Plin. lib. XXV. c. 13. Laërtius in Socrate, &c. Antocles & Epicles, postquam magnas Niciæ & Pergaei divitias dilapidassent, ad paupertatem redacti, vitæ tedium epotâ cicutâ finierunt. Attalus Philomator pro oblectamento habuit, cicutam, helleborum & aconitum, venenosasq; herbas plantare, ut fructum inde legeret. Plutarchus in vitâ Demetrii & Justin. lib. 36.

CXXIV. Cicutaria palustris tenuifolia, C. B. Pin. 161. Phellandrium, Dod. lateinisch fol. 591. Cicutaria palustris Lob. ic. 735. Tab. lib. 2. fol. 460. Cicuta aquatica Gefn. hort. fol. 253. Cicutaria palustris alia, sive Phellandrium. Cam. 41.

Ligusticum & Phaniculum sylvestre, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 336. Silaus Plinii, Cæs. lib. 67. c. 26. p. 291. Schmalblättriger Wasserschieferling / Tab. Bartschraut Saxonibus. Gesn. hort. Wilder Liebstock / Sebitz. in Trag. Klein Wendunck samellis. In paludum marginibus passim bey Rönigsberg.

Vetulae utuntur herba in discutiendis tumoribus, axungiae porcinae veteri mista.

CXXV. Cistus Ledon foliis rosmarini ferrugineis C. B. Pin. 467. Rosmarinum sylvestre. Dod. niederländisch fol. 437. Matth. Bauh. in Matth. fol. 576. Tab. lib. 3. fol. 772. Ledum Silesiacum, Clus. Pann. pag. 68. Clus. hist. lib. 1. fol. 83. Chamæpeuce, Cord. in Diosc. fol. 71. Cord. hist. fol. 111. Ledum foliis Rosmarini alterum. Lob. ic. pag. 124. o. Wilder Rosmarin. Dod. Niederländisch. Porsch Boruffis.

Multibibis foemellis Ledum potandum saepe offertur temulentiae accelerandae causâ. His svavia danda esse vult Cato. Plin. lib. 14. c. 13. causam addit: Cato idè propinquis foemellis osculum dare iussit, ut scirent, an temetum olerent. Rustici Ledum in porcile seu haram congerunt, porcis phthyriali infestatis. Im Gebruch bey Schwanis copiosè. Item bey Judenkirch in ericetis uliginosis.

CXXVI. Clinopodium origano simile. C. B. Pin. 224. Clinopodium vulgare, Matth. Bauh. in Matth. 595. Clinopodium majus Matthioli, Cam. hort. 44. Clinopodium 1. Matth. deutsch fol. 337. Clus. Pann. pag. 624. Origanum minus Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / 29. Origanum verticillatum Thal. pag. 81. Pulegium montanum Lon. deutsch 146. Clinopodium. Cord. in Diosc. fol. 57. Clinopodium 1. Tab. lib. 2. fol. 69. Clinopodium vel Polycmenum, Gesn. hort.

254. Acinos, Lob. ic. 504. Acynus, sive sterilis, Adv. Lob.
 215. Wirbeldost/Matth. Tab. Klein Wolgemuth/Seb. in Trag.
 Wald-Poley/oder Berg-Poley Lon. In der Hollen-Grund.

CXXVII. Cnicus sylvestris spinosior, C. B. Pin. 378.
 Heracantha, Tab. lib. 2. fol. 372. Atractylis, sive Carthamus
 sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch 676. Cartamus sylv. Lon.
 deutsch fol. 100. Carduus vulg. Matth. Bauh. in Matth. fol.
 497. Atractylis sylvestris, seu Cnici sylvestris species, Thal.
 6. Atractylis media, Gefn. hort. fol. 249. Atractylis mitior
 Fuchf. fol. 121. Cirsium luteum Sequanorum, Lob. ic. 14. o.
 Carlina sylvestris, Dod. lateinisch 728. Carlina sylv. vulga-
 ris, Clus. hist. lib. 5. fol. 156. Colus rustica, Cord. in Diosc. fol.
 57. Wilder stachlichter Feld-Saffran / Dreyndistel / und
 Schönhärlein / Tab. Dreyndistel. Sebitz. in Trag. Wilder Feld-
 Saffran / Fuchf. Wilde Stichwurz famellis.

Lixivio decocta pilos nitescere, ac lendes marcescere fa-
 cit. In locis montanis & aridioribus bey Duednau.

CXXVIII. Consolida media pratensis cœrulea, C. B.
 Pin. 260. Bugula, Dod. lateinisch fol. 135. Clus. Pann. p. 609.
 Guldengünzel / Brunf. deutsch fol. 90. Consolida media Matth.
 deutsch fol. 402. Fuchf. fol. 391. Eystett. Symphytum medium
 Lon. deutsch 179. Bugula, quibusdam Prunella Obs. Lob.
 252. Prunella cœrulea prior Trag. Kyber. in Trag. 309. Con-
 solida media prima, Tab. lib. 2. fol. 257. Consolida media
 major Thal. pag. 28. Chamæcisi alterum genus, Cæs. lib.
 11. c. 36. p. 453. Blau Guldengünzel / Tab. Matth. Bey
 dem Penartischen Walde. It. bey Haberstroh.

CXXIX. Consolida media pratensis purpurea, C. B.
 Pin. 260. Roth Guldengünzel. Rubris floribus reperta. Bey
 Haberstroh. Item im Penartischen Walde / ubi flos ex ru-
 bro cœruleus fuit,

CXXX.

CXXX. *Consolida regalis arvensis.* C. B. Pin. 142. Tab. ic. p. 67. *Consolida regalis*, Brunf. tom. 1. fol. 84. Gesn. hort. fol. 255. & 256. *Consolida regalis flore cœruleo minore* Cam. 46. *Consolida regia*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 453. Fuchf. ic. pag. 15. Lon. deutsch fol. 217. *Flos regius* 2. vel *sylvestris*, Dod. lateinisch 252. *Chamæmelum eranthemon*, Fuchf. fol. 27. *Segetum consolida regia strigosior tota*, Lob. ic. 739. *Delphinium vulgare*, Clus. hist. lib. 6. fol. 207. *Cuminum sylvestre alterum Dioscoridis*, Gesn. hort. 256. *Wild Rittersporen* / Tab. *Rittersporen* / Lon. Sebitz. in Trag. *S. Drillen Kraut oder Blum* / *Ritterblum und Lerchen-Klaw* / vulgò.

Temperata est, sicans cum adstrictione. Vulnura sanat, ardores quorumcunq; partium mitigat, visum acuit, venenis obsistit, calculos atterit, & interaneorum expellit vermes. Semen viribus haud cedit plantaginis semini, unde foriolos juvat & sanguinem reddentes. Eligitur hanc in rem flore cæruleo, & sativa. *Am Aneiphösischen Ball.* It. bey'm Lämpel-Krug inter segetes copiose.

CXXXI. *Convolvulus major albus.* C. B. Pin. 294. *Convolvulus major flore albo*, Eystett. *Convolvulus major* Gesn. hort. fol. 255. *Smilax laevis vel lenis major*, Lob. ic. 619. *Volubilis major*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 634. Lon. deutsch. fol. 236. Tab. lib. 2. fol. 550. Thal. pag. 131. *Campanula alba sylvestris*, Swert. florileg. part. 2. fol. 14. *Helxine cislampelos*, Cord. in Diosc. fol. 64. *Smilax laevis*, Matth. Bauh. in Matth. 839. Fuchf. fol. 720. *Smilax laevis major*, Dod. lateinisch 392. *Große Winde* Tab. *Groß weiß Windglocken* / Seb. in Trag. *Groß glatt Winden* / *weiß Winden*. *Zaunglocken* / und *Dvackenkraut* / Lon. In der Hollen-Grund.

CXXXII. *Convolvulus minor arvensis*. C. B. Pin. 294. Volubilis arvensis flore roseo, Tab. lib. 2. fol. 551. *Smilax laevis minor*, Dod. lateinisch fol. 393. Volubilis minor, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 635. Lon. deutsch fol. 136. Thal. pag. 131. *Helxine in segetibus nascens*, Cord. in Diosc. fol. 64. *Convolvulus minor*, Gesn. hort. fol. 255. Cæs. lib. 9. c. 24. p. 383. Clus. hist. lib. 4. fol. 50. *Helxine Cissampelos*, Matth. Bauh. in Matth. 715. Fuchs. fol. 258. *Convolvulus minor purpureus*, Lob. ic. 619. kleine winde Tab. kleine weiße Ackerwinde / oder Glocken / Sebitz. in Trag. Weidenwinden / Wein Gart winden / Jaun winden und kleine Blattwinde Lon. Mittelwinde / Fuchs. Inter segetes passim.

CXXXIII. *Convolvulus minor semine triangulo*. C. B. Pin. 295. kleine Winde mit dreykantigem Saamen. *Convolvulo similis herba*, Gesn. hort. fol. 255. Volubilis media, seu nigra Thal. 131. *Orobanche seu Cuscuta alter Serapionis*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 527. Volubilis nigra Tab. lib. 2. fol. 552. *Helxine Cissampelos altera Atriplicis effigie*, Lob. ic. 624. *Elatine*, Cord. in Diosc. fol. 64. *Convolvulum nigrum*, Dod. lateinisch 396. *Formentone alterum genus* Cæs. lib. 4. cap. 31. pag. 166. Schwarze Winde / Seb. in Trag. Buchwinde. Tab. In der Hollen-Grund.

CXXXIV. *Conyza coerulea acris*. C. B. Pin. pag. 265. *Dentelaria* Gesn. hort. fol. 256. *Conyza carulea* Tab. ic. pag. 861. ubi hirsuties omissa. *Erigerum quartum*, Dod. lateinisch, 641. *Conyza genus tenuifolium*, Thal. 21. *Tinctorius flos alter*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 123. Scharffe blawe dürrwurß, Tab.

Cubitalis & procerior quandoq; est planta surcitatem versus brachiata, thyrsulis tenellis striatis, ex nigro rufculis, hirsutis

tie insigni, quorum singulis exortibus subservit folium oblongum, angustum, hirtum, gustu acre: flosculis tenuissimarum exilitatum in caulium fastigiis apud nos albis, meditullium ex staminulis luteis constitutum festivè ac copiosè circumdantibus, ocissimè, ac sæpe intra horæ spatium vanescentibus, succedente mox papposâ lanugine. Radix ex nigro flavescens, capillamentis instructa suis, ubi manditur acritate linguam ferit. Floret Mense Julio. In locis arenosis & petrosis passim bey Königsberg.

CXXXV. *Conyza aquatica* laciniata, C. B. Pin. p. 266. *Conyza Helenitis* foliis laciniatis, Lob. ic. 347. *Conyza* mediæ species altera, Dod. lateinisch 52. Wasser-Dürwurz mit zerschnittenen Blättern. In locis aquosis bey dem Brandenburgischen Schloß. Item bey Nordenburg in Stadt-Graben copiosè.

CXXXVI. *Conyza major* flore globoso. C. B. Pin. p. 266. Dürwurz mit Kugelrunder Blüth. *Conyza minor* Trag. Kyber. in Trag. 166. Matth. deutsch fol. 365. Tab. ic. p. 860. *Conyza minima* Lob. ic. 345. Dod. lateinisch, fol. 52. Thal. pag. 21. *Conyza minor* seu *fœmina*, Lon. deutsch 160. Pfyllum, Cord. hist. fol. 154. Kleine Dürwurz Matth. Tab. Flöhkraut und Hunds-Augen aliàs. Vetulis Kerstindenkraut aut Kröstincken Kraut. Major est & minor. Icteris sufficientibus & suspiriosis salutaris. In locis irriguis bey Königsberg.

CXXXVII. **Conyza palustris* foliis tripartitò divisis, Joh. Lœf. *Bidens* foliis tripartitò divisis, Cæsalp. lib. 12. cap. 17. p. 488. *Hepatorium aquatile*, Dod. lateinisch fol. 595. Verbenâ supina vel tertia, Trag. Sebitz, in Trag. deutsch. 168. *Verbenaca recta* Cord. in Diosc. 66. *Forbesina Benoniensis*

Gesl. hort. fol. 259. Pseudohepatorium alterum Dodonæi seu foemina, Thal. 85. Cannabina aqvatica folio tripartitò diviso C. B. Pin. p. 321. **Wasser-Dürnwurz mit tieff zerschnittenē Blättern / Hanenkamp** Germanis. Cord. in Diosc. Stuppars Moravis & Silesiis, Gesl. in hort. Radix ex multis filamentis sub albidis constituta, caules promit rotundos, ramosos, rectos rufescentes, quibus folia in tres, quinque; vel sex profundas lacinias, in circuitu serratas, digitorum instar, dirempta adnascuntur. Cacumina caulium excipiunt florum capitula globosa, ex numerosissimis calyculis luteis, in summitate parum incis, ac in meditullio lingulam bifidam, exilem nigricantem foventibus exstructa, quorum ambitum luteoli exornant flores. His succedunt oblonga ac pulla semina, in apice ternis hispidulis aculeis, quorum intermedius brevior, horrida. Horum ope vestibus, & contrectantium digitis facile adhærescunt. Passim in locis udis bey Königsberg.

CXXXVIII. *Conyza palustris foliis serratis. Joh. Lœsel. Eupatorium cannabinum chrysanthemum, Tab. Lib. 1. fol. 418. Bidens folio non dissecto, Casalp. l. c. Eupatorium cannabinum foemina Septentrionalium, stellato & odore flore, Lob. ic. 529. Foemina cannabinum septentrionalium, stellato & odore flore, Advers. fol. 227. **Wasser-Dürnwurz mit schlecht zerschnittenen Blättern.** Priori assimilis est demptisfoliis. Caules alit ramosos, pallide virentes & exigue hirsutos quibus folia oblonga, in ambitu duntaxat crenata serviunt. Conyza palustris, Hort. Eyst. Cannabina aqvatica folio non diviso, C. B. Pin. 321. **Wasser-Bundkraut / Wassersternkraut / Geel-Sieberkraut und Rinnigundkraut** Weible. Tab. Bey der Laute. Auch unter dem Getreidigt an feuchten Orten.

CXXXIX. Cornus foemina C. B. Pin. p. 447. Hart-riegel.

riegel. Trag. Kyber. in Trag. 1004. Virga Sangvinea, Matth. Bauh. in Matth. 214. Gesn. hort. fol. 286. Dod. lateinisch. 782. Sangven vulgò, Cæs. lib. 3. cap. 26. p. 110. Olsea, Lon. deutsch fol. 65. Cornus foemina. Gesn. hort. f. 255. Lob. ic. p. 169. o. Thal: p. 33. Tab. lib. 3. fol. 752. Pseudocrania, Cord. hist. fol. 187. Hartriegel Matth. Cornelbaum Tab. Rürbeeren alias. Bey Fischen im Rosen-Pusch.

CXL. *Corylus sylvestris*, C. B. Pin. 418. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 868. Lob. ic. p. 192. o. Clus. hist. lib. I. fol. II. Lon. deutsch fol. 46. *Avellana nux sylvestris* Fuchs. fol. 398. *Avellana*, *Corylus sylvestris*, Gesn. hort. fol. 249. *Nux avellana agrestis*, Brunf. lateinisch tom. 3. fol. 225. *Nux avellana sylvestris* Matth. Bauh. in Matth. fol. 229. *Nux avellana*, sive *Corylus* Dod. lateinisch fol. 816. *Pontica nux* in *corylo vulgari*, Cord. in Diosc. fol. 25. Wilde Haselnuß Sebitz. in Trag. Haselbaum / Haselnußbaum / oder Haselstrauch Lon. Haselnuß / Fuchs.

Adeo fructifera saepe est *Corylus* apud nos, ut modò septendecim, modò viginti unam, imò simul viginti duas nuces, uno pediculo fultas, & glomeramen quasi quoddam constituentes, hic observârim. Ejusmodi nucum glomeramina ex concursu multorum florum exorta credo. Cæterum 4 numero differentias saepe notavi: 1. nux est calyculo clauso. 2. Calyculo aperto. 3. Calyculo semiaperto. 4. Calyculo curto. Oblongiores citius, rotundæ tardius in nucleum maturescunt, omnium verò primò, quæ Flugstnuß salutantur.

Corylus ipsa ligno est vel fragili vel obsequioso. Hoc ob lentitiam finditur & ex eo textiles sellarum sedes, & circuli vasis ligneis firmandis deservientes, parantur.

Falluntur, qui coryli flores credunt esse julos, quippe
flo-

flosculos edit, in gemellarum summo constitutos, staminum
 instar, rufculos, laccam Florentinam colore æmulantes, &
 quidem apud nos inclinante Aprili, aut Majo Mense incho-
 ante. Juli ejus, dum Corylus floret, concussi, pulvisculum
 reddunt luteum, pictoribus Schüttgels / Blengels voca-
 tum. Deservit hic pulvis pictoribus elegantissimo co-
 lore, tonsoribus vi consolidante, siccante, refrigerante &
 adstringente, vulneribus inspersus. Notandum: Corylus
 quò magis julis abundat, eò copiosiores alit flores, destituta
 iisdem paucissimos ostendit. Arbor hæc materies est vir-
 gulæ metallorum indagatricis, Wünschelrut dictæ, quam
 Nicolaus Niger Hapelius (ita se transnominavit Raphaël Egli-
 nus Iconius, Theol. D. & Prof. olim Marburgicus) in Disquis.
 Helianâ ita vult cædi & tractari: *Cadatur virga bifurcata bor-
 na, i. e. unius anni, ex corylo vel quercu, cujus cornua sint
 æqualia, & sine vitio, (quidam eandem putant ante solis exor-
 tum, maxime crescente lunâ, & quidem potissimum circa diem
 Annunciationis Mariæ cadendam) hoc facto sumantur duæ
 furculæ in utramq; obversam manum, cælum versus digitis
 compressis, utring; videlicet extremitatibus flagellorum furcæ
 ad utrumq; compressum pollicem extra manum prominentibus:
 ipse autem furcæ caudex extrinsecus intra duas manus vergat.
 Quodsi quis argenteos globulos thoraci præfixos gestet, etiamsi
 omni nixu comprimat virgam utraq; manu, tamen gyrum mo-
 vendo per se faciet, & versus thoracem sese introrsum usq; ad
 globos cæsa illa caudicis pars vertet: sin verò omni metallo ex-
 utus, argentum aurumve ponas in terram, tunc etiam renitente
 & invito te, qui tenes virgam, pars caudicis cæsa extrorsum
 verget, donec validissimo indicio & motu metallum percutiat.
 Quæ de re passim Autores Chymici & Physici consulantur.*

Nucibus ludunt pueri. Catullus in epithalamio Julii & Mallii:

Da nucem pueris, iners

Concubina, satis diu

Lusisti nucibus.

Ovidius lib. de nuce, sigillatim multos declarat ludos, qui nucibus fiunt:

Has puer aut certo rectas diverberat ictu,

Aut pronas digito bisve semelve petit.

Augustus laxandi animi causâ cum pueris facie liberali ocellatis nucibus lusisse dicitur à Tranquillo. Hic per nuces ocellatas exaudiunt nonnulli carystias seu avellanas, alii amygdalas. Alexander ab Alexandro lib. 3. genial. dier. c. 21. nucleos esse affirmat, qui in Persicis pomis inveniuntur, dictasq; ocellatas nuces existimat propter ocellos, & foramina, quibus mununtur undiq; Corylus eò fructuosior, quò pejus tractatur. Veterum adagium est: Corylus nucleis dives, nuptiarum præfaga est: Existimo exaudiendum hoc esse de furtivis, quibus se commaculant saepe, coryleta inter aqualiculantes nucum collegæ. Aliàs memini priscos, nuptiarum solemnibus, nuces sparsisse, vel sponsum pueritiæ jam renunciâsse indicantes, vel jactu tripudium excitantes, vel deniq; gemino nucum operimento, totidem involucris fœtus novæ nuptæ circumdatum iri, significantes.

Melancholici & qui tristitiæ dissolvenda dederunt pectora, *παραπλον* hoc confici curant in multis expertum. In nucem avellanam, castro excavatam & enucleatam *κατόπλον* seu speculum pavonis deferatur, superstructo hydrargyro: mox foramine cerâ virgineâ obturatô nux syndone involvatur, ac collo appendatur.

Nux ludicræ rei materies: Notabilem hîc in memoriam.

H.

mihi

mihî revocant historiam nuces, quæ in Regio apud nos monte quondam acciderat. Ex sartorum genere quidam epulum Magistrale Meister = Rost tribulibus suis apparatus, alia inter edulia tenebatur vigore statutorum & consuetudinis inveteratæ carnes crocò tinctas, amygdalis conspersas, apponere. Quid sit? nuces hic elegit amygdalarum loco. Renano integro elapso divulgatâ, nuces pro amygdalis appositæ fuisse stomachari incipit tota opificum tribus, hominem de integro ad dapes magistrales apparandas durâ verborum gravitate cogens. Ab insolenti hoc postulato junior ille Magistellus ad Senatum urbicum se recipit, sententiam hæc super re tristiculo expectans animo. Senatus rem pensiculatius trutinans decernit., cum in epulo Magistrali nil præter amygdalas desideratum sit amplius, æquum esse, ut sartorum tribules adjiciales seu adipales parent cœnas, easque crocatas, ipse verò addat amygdalas. Ita litigium optuma sententiâ sublatum. De carnibus crocatis Vulgare est dicterium;

Ruhfleisch in gelber Brüh/

Ein Ritter ohne Müß /

In diesen beyden ist verlohren

Der Safran und die gülden Sporen.

Taubmannus ita:

Caro crocata Vacca,

Expers eques labore,

Fraudique sunt probroque

Calcaribus crocoque.

Nux miraculum præbuit. De Sebastiano Vogelsbergo hæc memoria prodidit Melissus:

Fortis erat bello vir & acribus inclytus armis,

Cui volucris nomen monsque perenne dabat.

Jusse-

*Iusserat huic Quintus caput à cervice recidi,
Cade fora Augusta nunc quoque tincta rubent.
Ille sibi cernens ensēque necemque paratam
Carnifici intrepidā talia voce refert:
En morior, moriarq;, jubet quia Caesaris ira:
Quod precor, hoc votis parce negare meis,
Truncus ubi gelidā fuero tellure sepultus
In tumulo factum consere ritè nūcis.
Nux ea, si merui pœnas, arescet; at insons
Se plector, crescet; grandis & arbor erit.
Vota valent, arbor succrevit, & alta sub auras
Explicuit patulis brachia densa comis.*

CXLI. *Cuscuta major*. C. B. Pin. pag. 219. *Casslytha* Plinii vel Theophrasti, Gesn. hort. fol. 251. *Casslytha* Plinii, *Cuscuta officinarum*, Lob. ic. 427. *Cassutha*. Fuchf. fol. 384. Tab. lib. 2. fol. 592. Dod. lateinisch fol. 554. Thal. pag. 28. *Androsaces*, vulgò *Cuscuta* Trag. Kyber. in Trag. 810. *Cuscuta* Matth. Bauh. in Matth. fol. 879. Lon. deutsch. fol. 236. Cæs. lib. 8. c. 41. fol. 343. *Seiden Kraut* / Tab. Fils. *Kraut Flachs*, *Seiden / Flachs*, *Dottern* Lonic. *Nesfel*, *Rancken* Borussis. Bey Königsberg passim. *Urticæ* præsertim majori adhæret.

CXLII. *Cyanus segetum* C. B. Pin. 273. *Cyanus cœruleus*, Gesn. hort. fol. 256. *Cyanus*, Lon. deutsch fol. 216. Cæs. lib. 13. cap. 52. f. 538. *Cyanus flos* Dod. lateinisch fol. 251. *Baptifecula*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 450. *Cyanus vulgaris* Lob. ic. pag. 546. Adv. Lob. fol. 236. Obs. Lob. 296. *Cyanus major* Matth. Bauh. in Matth. fol. 389. Cam. hort. pag. 51. *Cyanus cœruleus arvensis*, Tab. lib. 1. fol. 531. *Cyanus arvensis cœruleus* Thal. pag. 29. Eystett.

NB. Incisuræ apud Lon. Matth. & Sebitz. in Trag. omittæ. Blau Kornblum/ Tab. Große Korn-Blum Matth. Rosen-Blum und Zacharias Blum/ aliàs. Inter segetes passim. Flores cyani cœruleum pictoribus suppeditant colorem. In mortario lapideo, flores pistillo contunduntur ligneo, adjecto aluminis pauxillo: contusorum pars linteo terso & extenso inducitur, ac involvitur: mox alia portio eidem linteo superinducitur, ac rursus involvitur, & sic ulterius cum florum minutali agitur, strato super strato constituto. Portiones ita linteo inductæ ac involutæ, præsto lævi manu committuntur, quò succus omnes lintei partes æqvabiliter imprægnat. Post crassamentum abjicitur, ac linteum siccatur. Usus Tempore lintei particula aquæ, in quâ gumi Arabicum dissolutum immergitur, & colorem reddit antœnuk cœruleum, quem pictores *Lichlein-blau* nominant. NB. Cyanus in quibusdam infantum morbis remedium expertissimum est.

CXLIII. Cynoglossum majus vulgare, C. B. Pin. p. 257. Cynoglossus vulgaris, Gefn. hort. fol. 256. Cynoglossum cum flore Dod. lateinisch. fol. 54. Cynoglossum, Adv. Lob. fol. 250. Cynoglossum cum flore. Tab. lib. 2. fol. 408. Cynoglossum vulgare, Matth. deutsch fol. 570. Cynoglossum vulgare cum flore, Lob. ic. 580. Cynoglossum vulgare, Clus. hist. lib. 5. fol. 161. Eystett. Große Hunds-Zunge/ Brunf. deutsch fol. 169. Gemeine Hunds-Zung Matth. Hunds-Zung mit Blumen/ Tab. am Rneiphöfischen Wall passim.

CXLIV. Cynoglossum minus. C. B. Pin. pag. 257. Elatine Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 156. Lon. deutsch fol. 166. Klettentraut / Seb. in Trag. Lon.

Apud nos cubitalis sæpè est planta, secus ac in Angliâ, ubi vix semipalmaris reperitur. In Neuendorf am Tham copiose

piosè. It. am Rneiphöfischen Wall/nach dem Schießhause zu.
Siccāt, adstringit & solidat. Decocta dysentericos & fo-
riolos juvat, & dolores compescit. Gargarismis additur.

CXLV. Dens leonis latiore folio C. B. Pin. 126. Dens leonis. Brunf
lateinisch tom. 3. fol. 70. Matth. Bauh. in. Matth. fol. 388.
Dod. lateinisch. fol. 636. Dens leonis 1. Tab. lib. 1. fol. 595.
Taraxacon minus Lon. deutsch 123. Hieracium majus, Trag.
Sebitz. in Trag. deutsch. 209. Hieracium parvum Cord. in.
Diosc. fol. 55. Hieracium minus, Gesn. hort. fol. 262. Ca-
put Monachi, Matth. deutsch fol. 178. Hedypnois, dens leo-
nis, Fuchf. ic. pag. 387. Aphaco Cæs. lib. 13. cap. 3. pag. 508.
Pfaffenblatt / oder Röhrlein Kraut / Tab. Pfaffenröhrlein/
Klein Habichtskraut / Lon. Pfaffenkraut / Löwen Zahn /
Saurüssel / Sauschnabel / Saublum / Pfaffenstiel / Hunds-
blum / Eyerblum / Münchsblatt / Weglattich / Wiesenlat-
tich / Hundslattich / und Merzenblum vulgò. Sommerdorn
Haffis. Bey Königsberg/ in locis sabulosis passim. Radix
Taraxaci collo suspensa in oculorum caligine efficax creditur.

CXLVI. Dentaria heptaphyllos baccifera, C. B. Pin.
322. Dentaria bulbifera, Lob. ic. 687. Dentaria baccifera,
Clus. Pann. Clus. Hist. Dentaria septifolia, Tab. Siebenblätte-
riger Schuppenwurz mit schwarzen Beeren. In der Sarkau
in fruticetis ac locis umbrosis.

CXLVII. Digitalis lutea magno flore, C. B. Pin. 244.
Digitalis lutea, Fuchf. f. 894. Tab. lib. 1. fol. 270. Cam. hort. p.
55. Lon. deutsch. fol. 105. Thal. 38. Digitalis flore luteo. Eyttett.
Digitalis 3. Dod. lateinisch f. 169. Campanula sylvestris, seu Di-
gitalis flore luteo, Trag. Kyber. in Trag. 889. Geelfingerhut/
Tab. Fuchf. Geeler Fingerhut oder Wald Glöcklein / Lon.

Hinter Duednau auff dem Berge in locis umbrosis. Item in der Osterodischen Heyde copiose.

CXLVIII. *Dipsacus* sylv. aut *virga pastoris* major, C. B. Pin. 385. *Dipsacus* Lon. deutsch fol. 99. *Dipsacus purpureus* Fuchf. fol. 225. *Dipsacus primus* Tab. lib. 2. fol. 366. *Carduus fullonum*, Brunf. lateinisch / tom. 3. fol. 32. *Labrum Veneris*, Cord. in Diosc. fol. 50. Lob. ic. p. 18. o. Lob. Obs. fol. 487. *Carduus fullonius erraticus*, Trag. Seb. in Trag. deutsch 667. *Labrum Veneris flore purpurascente*, Cæs. lib. 13. c. 27. p. 519. *Labrum Veneris alterum*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 493. Groß Gartendistel / oder Weberkarten / Bubenstreckel und Wolffstreckel / Lon. Braun Kartendistel Fuchf. In elegantem nonnunquam excrefcit magnitudinem, ita ut 4 ulnas sæpe apud nos exæqvæt. Bey der Neuhausfischen Mühl. Item im Werder hinter Elbing in agrorum limitibus copiose.

CXLIX. *Dracunculus palustris* sive radice arundinacea Plinii C. B. Pin. 195. *Aron palustre*, Gef. hort. fol. 248. *Dracunculus aquaticus*, Matth. deutsch fol. 228. *Dracunculus aquaticus* Plinii, Cam. hort. p. 56. *Dracunculus aquatilis*, Dod. lateinisch 331. *Dracunculus palustris minor*, Lon. deutsch fol. 232. *Angvina aquatica*, sive *Dracunculus*, Lob. ic. p. 600. *Dracontium palustre* Tab. lib. 2. fol. 417. Wasser Schlangenkraut Matth. Klein Schlangenkraut Lon. Wasser Aron und Drachenwurz vulgò. Schweinkraut Nostratibus. Folia quippe concisa porculatores aquâ macerant, furfures addunt & miscelâ hâc porcos saginant. Calefacit, siccât & subtilium est partium, hinc suspiriosis utilis est radix, quæ degustata, fucum quasi lingvæ divendit, mox eandem insigniter suâ acrimoniâ ferit. Aro persimile quiddam obtinet, auctore Gal. 6. simpl. Viscera expurgat, lenta ac viscida incidit, opti-

optimumq; remedium est contumacium ulcerum. Baccæ ex vino sumptæ ἐχιοδῆκτοις profunt. Hinter Judenfirch in locis uliginosis.

CL. Dracunculus pratensis serrato folio, C. B. Pin. 98. Wiesen Bertram mit zerkerbten Blättern. Ptarmica 1. Matth. Bauh. in Matth. fol. 441. Ptarmice, Lon. deutsch fol. 263. Ptarmica, sive Ptarmica folio Taraconis, vel sternutamentoria Lob. ic. pag. 455. Ptarmica Fuchsi Cam. hort. p. 132. Tanacetum album, seu acutum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / 379. Tanacetum album acutum Tab. lib. 2. fol. 454. Tarchon aquaticum, Gefn. hort. fol. 274. Draco sylv. sive Ptarmice, Dod. lateinisch 710. Ptarmica sylvestris germanica, Thal. pag. 86. Ptarmica vulgaris, Eystett. Weiß Reinfarn Tab. Wild Bertram / Lon. Matth. Bey der Altstättchen Ziegelscheine in pratis siccioribus. Item bey dem Penartschen Walde. Item in der Langkaase (pratium est) zwischen Lattemwalde und Rungen.

CLI. Echium scorpioides arvense C. B. Pin. 254. Auricula muris cœrulea Tab. lib. 1. f. 630. Auricula muris minor tertia Trag. Seb. in Trag. deutsch 221. Scorpioides tertium minus Dod. Eystett. Scorpioides aquaticum Gef. hort. f. 280. Scorpioides tertium, Dod. lateinisch fol. 72. Heliotropium min⁹ alterum Cæs. lib. 11. p. 439. Echii palustris alia species, Thal. p. 40. Alsine Myosotis, sive auricula muris, Lob. ic. 461. Myosotis hirsuta reptans, Adv. Lob. 193. Observ. Lobel. 245. Blaue Mäus-Dhrlein / Tab. Vergiß mein nicht / Gef. hort. Circa Regiomontum passim. Variat magnitudine, aliquando vulgatâ quadruplo major est & hispidior.

CLII. Echium scorpioides arvense flosculis niveis, Joh. Læf. Weiße Ackermauß-Dhrlein. Am Thiergarten bey Neuhausen in locis umbrosis.

CLIII.

CLIII. *Echium Scorpioides palustre* C. B. Pin. 254. *Euphrasia cœrulea* Trag. Seb. in Trag. deutsch 260. *Euphrasia cœrulea* Tab. lib. 1. fol. 630. *Echium palustre* Cordi, Thal. pag. 40. *Cynoglossa minor*, Brunf. lateinisch tom. 1. fol. 176. *Myosotis scorpioides partim repens, partim erecta*, Lob. ic. 462. *Scorpioides tertium majus Dodonæi*, Eystett. An auricula muris; Matth. deutsch fol. 249? Blaue Wassermäus / Dyrlein / blauer Flugentrost / Tab. Kleine Hundszung / Brunf. das rechte Mäus / Dyrlein *Dioscoridis*. Matth. Bey Königsberg passim.

CLIV. *Echium vulgare* C. B. Pin. 254. *Echium* Matth. deutsch / 420. Dod. lateinisch 631. Gesn. hort. fol. 257. *Echiū sive Buglossum sylvestre*, Lob. ic. 579. *Echium vulgare*, Clus. hist. lib. 5. fol. 163. *Anchusa sylvestris* Thal. p. 9. *Buglossum sylvestre*, Lon. deutsch 175. *Echium, buglossum agreste*, Adv. Lob. fol. 249. *Echium floribus purpurantibus rubellis*, Obs. Lob. 312. *Lycopsis*, Cord. in Diosc. fol. 63. Wilde Dyrsenzung / Matth. Lon. Bey Lautemühl / Item bey dem Heyden / im Brandenburgischen in locis aridis & salebrosis copiosè.

CLV. *Elichrysum seu Stœchas citrina angustifolia*, C. B. Pin. 264. *Stœchas citrina*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 736. Dod. lateinisch fol. 268. Gesn. hort. fol. 283. Tab. lib. 2. fol. 103. *Coma aurea*, Lob. ic. pag. 485. *Chrysocome aureave coma*, Adv. Lob. fol. 203. *Amarantus luteus* Fuchs. fol. 99. *Amaranthus luteus*, Lon. deutsch fol. 134. *Chrysocome prima vulgaris*, Clus. hist. lib. 3. fol. 326. *Helichryson, & Amaranthus Galeni*, Cæs. lib. 12. c. 13. pag. 484 & 485. Schmalblättrige gelbe Rheinblumen. Rheinblume / Tab. Matth. Rheinblumen oder Mottenblumen / Lon. Mottenblumen / Winter.

Winterblumen / vulgò Winterblümchen. Rattenpoten No-
stratibus.

Amariusculo & aromatico est sapore. Excalfacit, siccit,
aperit, & abstergit. Flores decocti cachecticos, & aurugio-
sos juvant: furfures capitis abstergunt, & pediculos enecant.
Vestimentis associati tineas pellunt. In locis aridioribus &
siccioribus bey *Altstädtschen Gericht*. Flores cum pane
Butyraceo vitulis dati certissimum diarrhœæ remedium esse
rusticis creduntur.

CLVI. Equisetum palustre tenuissimis & longissimis
setis: 3. in Prodr. C. B. pag. 24. Wasser: Roß: Schwanz
mit sehr dünnen langen Blättern. In palustribus bey *Rö-
nigsberg* passim.

CLVII. Equisetum sylvaticum tenuissimis setis C. B.
p. 16. Equisetum sylvaticum, Tab. lib. I. fol. 699. Hipparis
minor altera, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 550. Klein
Schaffthow / oder Ragenschwanz / Trag. Wald: Schaffen-
thow / Wald: Roß: Schwanz / in locis umbrosis passim.

CLVIII. Equisetum palustre brevioribus foliis poly-
spermon: *πολύσπερον ὄζυλον* C. B. Pin. pag. 15. Polygonum fœ-
mina Matth. Bauh. in Matth. fol. 676. Polygonus fœminea
Gefn. hort. fol. 273. Dod. lateinisch III, Tab. I, 2, fol. 505. Equiset-
um tertium, Cas. lib. 16. c. 15. p. 599. Polygonon fœmina semine
vidua Lob. ic. p. 792. Adv. Lob. fol. 354. Sangvinalis fœmina
Cord. in Diosc. fol. 61. Limnopeuce Cord. hist. fol. 150. Po-
lygonon fœmineum, Thal. p. 87. Vielsaamiger Wasser: Roß:
schwanz mit kleinen Blättern. Thannenwädel / Tab. Matth.
Klein Ragenwädel / nonnullis. In locis uliginosis bey der
Altstädtschen Klapperriesen. *ὡς ἔστι τὸ πολὺ* sine semine re-
peritur, quandoq; polyspermon est.

CLIX. *Equisetum foliis tractu ætatis nudum*, Job. Lœf. *Equisetum foliis nudum non ramosum sive junceum* *ἵππου ἄφυλλο* C. B. Pin. pag. 16. *Hippuris major*, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 548. *Hippuris nuda*, *Equisetum nudum* Tab. ic. pag. 251. *Hippuris major altera*, Lon. deutsch fol. 212. *Polygonon fœmineum* *ἀφύλλο καυλόν*, Thal. p. 87. *Dynblätteriger Rosschwanz nach Länge der Zeit*. Schaffthien ohne Blätter / Tab. ic. *Groß Schaffthien / oder Ross Schwanz* / Lon.

Equisetum hoc foliosum est primâ ætate. Senescens verò & quidem mense Julio, foliis prorsus exuitur, & nudum conspicitur. Id sæpiusculè *αὐτόπτης* notavi. Reliquias foliorum icon apud Tragum monstrat. In locis palustribus in Königsberg passim.

CLX. *Equisetum foliis nudum, ramosum* C. B. Pin. 16. *Equisetum tertium*, Matth. Germ. fol. 441. *Hippuris minor*, Lob. ic. pag. 794. *Bielästiger Razenzagel oder Schaffthien ohne Blätter*. Im Ambt Hollandt wird das Kraut genandt Heermosß. Hinc adagium: *Der Pferde Brodt / der Ruhe Todt*. *Equis* gratissimum & salutare est pabulum, contrâ ovibus & vaccis noxium. *Vaccæ* eo saturatæ denticidio urgentur, foriolæ fiunt, & fordæ ab ejus esu abortiunt ac persæpe moriuntur. Hinc fœnum sumentes vaccæ, particulam fœni (cui immistum esse sentiunt *equisetum* hoc) rursus ore projiciunt, ut noxia herba, hoc modo excutiat. Oves ab esu hujus herbæ prorsus abhorrent, ac oris lingvæq; dexteritate illum ab utili pabulo separare sciunt.

CLXI. *Equisetum foetidum sub aquâ repens*. s. in Prodr. C. B. 25. *Stinkend Schaffthien so unter dem Wasser freucht*. *Equisetum pini foliis simile* apud Plinium & *Hippuris minima* à Diosc. non descripta, Dalech. in Plinio fol. 547.

& 548. Cauliculis provenit tenuissimis, rotundis, per obliquum, ut saccharum penidium, striatis. Odoris est lutosi ac sulphurei. Siccata planta friabilis est, ac digitis faciliè in pollem redigitur. Bey Osterrode in fundo lacus Schilling, ad pagum Werlitten.

CLXII. *Equisetum sub aquâ repens foliis bifurcis. Joh. Lœf. Riechend Wasser Schafftheu mit vielen zwey zändichten kleinen Blättern.

Cauliculis est rotundis geniculatis non striatis; foliis tenuissimis, summum versùs bifurcis ad genicula concurrentibus. Friabilis est exsiccata, ac digitis faciliè atteritur. In piscinis passim, ex quibus sagenâ sapius evellitur.

CLXIII. Erica vulgaris glabra. C. B. Pin. 485. Erica vulgaris Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 747. Thal. p. 40. Erica folio Myricæ, Clus. Pann. p. 35. Clus. hist. lib. 1. p. 41. Erica vulgatio folio Myricæ, Adv. Lob. fol. 447. Erice Fuchf. fol. 255. Erica Tab. lib. 3. fol. 809. Cord. in Diosc. fol. 18. Lon. deutsch fol. 53. Erica prima Matth. Bauh. in Matth. fol. 141. Erica prior Dod. lateinisch fol. 767. Heyd, Tab. Matth. Heiden. Sebitz. in Trag. Lon. Fuchf. In locis arenosis passim.

CLXIV. Erica baccifera tenuifolia baccis nigris. Joh. Lœf. Foliis assimilis est ericæ bacciferæ tenuifoliæ, Tab. lib. 3. fol. 810. Schmallblätterichte Heide mit schwarzen Beeren. Auf der Eurischen Nahrung hinter Runzen copiose. Kräenbeeren Noltratibus. Item hinter Schreittlacken.

CLXV. Eruca lutea latifolia, sive Barbarea, C. B. Pin. 98. Barbarea fœmina Tab. lib. 2. fol. 165. Barbarea seu Pseudobunias Lob. icon. pag. 207. Barbarea Dod. lateinisch fol. 712. Herba S. Barbaræ. Trag. Kyber. in Trag. pag. 101. Lon. deutsch fol. 201. Bunium adulterinum Cam. hort.

p. 31. *Nasturtium palustre* Gessn. hort. fol. 268. *Nasturtium hybernium* Thal. pag. 80. *S. Barbara herba* Fuchsl. fol. 746. Gelb breitblättricht Senffkraut oder *S. Barbellkraut* Weiblein. Tab. *S. Barbara Kraut*. Fuchsl. Lon. Senffkraut oder Barbellkraut Sebitz. in Trag. Napungel nostratibus. Winterkress nonnullis. Propè pratorum fossas bey Königsberg.

CLXVI. *Eruca sylv. minor luteo* parvoq; flore C. B. Pin. 98. *Eruca palustris minor*, Tab. lib. 2. fol. 159. *Eruca sylvestris* Fuchsl. fol. 263. *Sinapi primum genus* Fuchsl. ic. p. 304. Kleiner wilder Senff mit gelber und kleiner Blüth. Klein Wasserrauken Tab. Wild weiß Senff. Fuchsl. In locis uliginosis passim.

CLXVII. *Eruca maritima Italica* siliquâ hastæ cuspidi simili. C. B. Pin. 99. *Erucae genus in maritimis*. Cæs. lib. 8. c. 63. fol. 360. *Cakile Serapionis Erucae folio*, Napi flore; vulgò *eruca marina*. Lob. ic. p. 223. *Cakile Serapionis*. Cam. hort. p. 32. Meerkrasse vulgò. Ad littus maris passim.

CLXVIII. *Eruca sylv. minor foliis subasperis in orbem sparsis*. Joh. Læf. In der Fischhausischen Heide. Item bey Runzen in montosis. Kleiner wilder Senff mit scharfsen Blättern / so an der Erde in die Runde herum liegen.

Radice nititur exili, subflavescente, villis instructa suis: cui succedunt folia laciniata, subaspera, humi circumcircastrata, quorum infima majora sunt ac viridiuscula, his incumbentia, & in meditullio constituta incana ac minora. Cauliculos edit hirsutos & brachiatos, quorum summo insident flosculi nivei: Hos deciduos sequuntur siliquæ teretes, exile ac subruffum semen gustu acre continentes.

CLXIX. * *Eruca sylvestris major foliis subasperis in orbem sparsis*. Joh. Læf. Großer wilder Senff mit scharfsen

fen Blättern / so an der Erde in die Runde herumh liegen.

Cum erucâ sylv. minore convenit quidem, foliis tamen “ hæc vehementissimè luxuriat, ita, ut vel sexaginta obser- “ vârim semel in unicâ plantâ, humi in orbem sparsa, incisâ “ & subaspera. In der Bange an den Seebergen copiosè.

CLXX. *Eryngium maritimum* C. B. Pin. p. 386. *Eryngium marinum* Matth. deutsch fol. 273. Lob. ic. pag. 21. o. Lob. obs. fol. 490. Dod. lateinisch 730. Clus. hist. lib. 5. fol. 159. Eystett. Cam. hort. p. 58. Cæs. lib. 13. cap. 29. pag. 521. Meermans Treue / Matth. Seemans Treue und Meerwurz-
zel vulgö. Circa portum Pillaviensem copiosè.

CLXXI. *Erysimum*. Irio, 1. Tab. ic. p. 448. *Erysimum vulgare* C. B. Pin. pag. 100. Irio, 1. Matth. Bauh. in Matth. fol. 431. Cæs. lib. 8. c. 64. pag. 360. Irio Cord. in Diosc. fol. 46. Lon. deutsch fol. 201. Verbena fœmina & sinapi 7. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 79. Verbenaca recta, sive mas. Fuchf. fol. 592. Irio, sive *Erysimum Dioscoridis*, Lob. ic. 206. Adv. Lob. 69. Irio, sive *Erysimum* Dod. lateinisch fol. 714. *Erysimum Nostræ*. Thal. p. 40. Wegsenff / Nederich 1. Tab. Ic. Eysenkraut Weiblein Lon. Schnödsenff / Schürsenff und Stein-
senff / Cord. in Diosc. Eysenkraut Männle / Fuchf. Bey Königsberg in locis præsertim salebrosis passim.

CLXXII. **Erysimumhirsutum* siliqvis *Erucæ*, Joh. Lœf. härchter Wegsenff.

Radix subflavescens, ac fibris instructa caulem effert rotundum, viridem, hirsutie asperum, cui folia profundè “ incisâ & hispida annata, quæ propius terram longis pediculis innituntur. In caulium summo flosculi parvi, conglomerati “ ac luteoli visuntur, siliqvas minuscultas in apice clypeatas, “ longis ac hirsutis petiolis insistentes, post se relinquentes.

„Facie prorsus assimili est Erysimi 2. Tab. lib. 2. p. 162.
 „descripto, hirsutie demptâ. Reperi id mense Junio zu
 Danzig am Wall.

CLXXIII. Evonymus vulgaris granis rubentibus. C. B. Pin. 428. Evonymus. Matth. deutsch. fol. 83. Dod. lateinisch. fol. 783. Tab. lib. 3. fol. 754. Gesn. hort. fol. 258. Evonymus Theophrasti Lob. ic. pag. 168. o. Adv. Lob. fol. 435. Obs. Lob. 591. Carpinus Theophrasti. Trag. Kyber. in Trag. pag. 983. Lon. deutsch fol. 60. Siler Plinii Cæs. lib. 3. c. 50. p. 128. Anonymus, aliis Evonymus. Cord. hist. fol. 176. Spindelbaum Matth. Tab. Spindelbaum Hanhöllein Kyber. in Trag. Pinnholz nonnullis. Zwischholz Nostratibus.

Carbones Evonymi usurpant pictores in rebus delineandis, vel in horum defectu carbones Coryli. In der Holen Grund.

CLXXIV. Eupatorium Cannabinum flore purpureo Joh. Lœf. Eupatorium cannabinum C. B. Pin. pag. 320. Eupatorium Avicennæ. Gesn. hort. fol. 258. Lon. deutsch 246. Cam. hor. 58. Eupatorium adulterinum, Fuchs. fol. 265. Herba S. Kunigundis, Trag. Seb. in Trag. deutsch 390. Herba Kunigundis prima, Tab. lib. 1. fol. 417. Eupatorium Avicennæ seu vulgare Matth. deutsch 432. Hepatorium vulgare, Dod. lateinisch fol. 28. Cannabina aquatica, sive Eupatorium mas, Lob. ic. 528. Pseudohepatorium mas, Herba Cunegundis, seu Hepatorium Avicennæ quorundam. Thal. fol. 85. Wasser-Dost mit Purpurfarben Blumen / Kunigundkraut / Tab. Matth. Hirsflee / oder Wasserdost / Lon. Sebitz. in Trag. Hirsgunstel und S. Kunigundskraut / Doseakraut / Altkraut / und Hirs-Bundkraut vulgo.

Cervis faucis sacrum. Amarum est, abstergit, incidit, aperit, expurgat, lotiumq; movet. Hepaticis, lienosis, ictericis, foedâ scabie, ac productis tertianis divexatis perutilis. Chirurgis vulneraria est planta, qui radices pulvisculum cum *evposia* offerunt, unde & *Bruchwurz* quibusdam dicitur. In uliginosis in der Hollen-Grund.

Colligenda Ole 15. m occupante sub elevatione Poli 46, 47, 48, 49.

CLXXV. Eupatorium cannabinum flore candido. Johann. Læfel. Weiß Wasserdost.

Priori affimile est structurâ, foliorum cauliumq; colore nonnihil dissimile. Quippe prius foliis gaudet ex fusco viridibus, thyrsulis rubicundis: hoc foliis & caulibus pallidè virentibus. In der Hollen-Grund.

CLXXVI. Eupatorium Veterum sive Agrimonia, C. B. Pin. 321. Agrimonia, Brunf. lateinisch Tom. 3. fol. 68. Lon. deutsch fol. 245. Cæs. lib. 8. c. 4. p. 319. Agrimonia, sive Eupatorium. Dod. lateinisch fol. 28. Eupatorium Dioscoridis & aliorum Græcorum. Gesn. hort. 258. Eupatorium Græcorum, Agrimonia officinarum Lob. ic. 692. Adv. Lob. 308. Eupatorium vulgare Trag. Kyber. in Trag. pag. 513. Eupatorium Matth. Bauh. in Matth. fol. 717. Cord. in Diosc. fol. 64. Tab. lib. 1. fol. 409. Fuchf. 244. Odermennig / Tab. Fuchf. Odermennig / Lon. Aldermennig / Agrimonien / Bruchwurz / Leberkletten und Königskraut. In der Hollen-Grund.

CLXXVII. Euphrasia officinarum C. B. Pin. 233. Euphrasia, Fuchf. fol. 246. Eufrosia, Tab. lib. 2. fol. 533. Dod. lateinisch 54. Euphrasia sive Euphrosine. Ocularis. Lob. ic. 496. Eufragia Matth. deutsch fol. 438. Cæs. lib. 8. c. 34. pag. 339. Euphrasia altera major Thal. pag. 40. Euphrasia Argentinensium

sum vel 2. & 6. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 259. Augentrost / Tab. Seb. in Trag. Matth. In pratis bey Königsberg passim. Item bey der Altstadtischen Kalkscheie auf der Mauer semel hanc plantam inveni.

CLXXVIII. *Euphrasia pratensis rubra* C. B. Pin. 234. *Odontites prima*. Tab. lib. 1. fol. 681. *Euphrasia altera* Dod. lateinisch 55. *Euphrasia* 2. *Dodonæi* Lob. ic. p. 496. *Ericoides rubrum* Thal. pag. 40. Brauner Augentrost. Tab.

In locis uliginosis sæpe & aridis. Spithamas duas nonnunquam alta est. Flos communiter rubicundus. Semel pumilam inveni flore albo, bey Wartenick in locis incultis. Phthiriasin jumentis accersit crebrius esitata.

CLXXIX. *Fagus*, Brunf. tom. 3. fol. 235. Bauh. in Matth. 180. Cam. in Matth. 66. Matth. deutsch 72. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 876. Dod. lateinisch 832. Lob. Obs. fol. 587. Adv. Lob. fol. 433. Lon. deutsch 49. Tab. lib. 3. fol. 683. Rothe Büche oder Buchsbaum / Tab.

Folia refrigerant, siccant, & parùm adstringunt. Glans fagea dulci nucleo diuretica est, suemq; facit hilarem. Lar-
gius esitata dementat ac inebriat rusticos. Cinis deservit pan-
nis tingendis, ac vitris conflandis. Hinter Brandenburg copiosè. Et alibi. Circa diem Omnium Sanctorum assula ex fago arbore excisa, sicca existens, modestiam hyemis, hu-
mida ferociam ejus signat vulgo. *Fagus* olim etiam serviebat simulacris faciendis. Anthologia Græcor. Epigrammat. lib. 1. cap. 68. meminit faginei Colossi Herculis. *Faginus guttus gutturnium* est ex fago, quo olim sacrificabant. Plinius lib. VI. cap. 38.

CLXXX. *Festuca avenacea sterilis elatior*, C. B. Pin. pag. 9. *Ægylops* 1. & *avena fatua*, Tab. ic. p. 234. Lolii pri-
muri

rum genus. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 530. Ægylops. 1. Matth. deutsch fol. 119. Ægylops vera Gesn. hort. fol. 245. Bromos herba, Dod. lateinisch 540. Bromos sterilis, Lob. ic. p. 32. Avena græca, Cæs. lib. 4. c. 48. p. 178. Festuca & avena græca, Lon. deutsch 285. Avena sterilis, Adv. Lob. 9. Thal. p. 14. Gerstenthwalsch / Gauchhaber / und Habergras / Tab. ic. Gauchhaber und Maushaber / Trag. Seb. in Trag. Gauchhaber und Taubhaber / Lon. Inter segetes passim. Vitium plerumq; hordei est.

CLXXXI. Filipendia, Trag. Seb. in Trag. deutsch 695. Matth. deutsch fol. 364. Dod. lateinisch 56. Lon. deutsch fol. 248. Gesn. hort. 259. Cord. hist. 94. Thal. p. 42. Filipendula prima & saxifraga rubra, Tab. lib. 1. fol. 521. Filipendula vulgaris, Eystett. Oenanthe, Fuchf. fol. 562. Cord. in Diosc. 58. Oenanthe filipendula Lob. ic. 729 Oenanthe vulgaris, Adv. Lob. 325. Rother Steinbrech. Tab. Matth. Roth Steinbrech / oder Erdeichel und Erdeiche / Lon. Bey Lautenmühl im Geybüsch. Item hinter Fischhausen nacher Lochstätt zu / in montosis.

Calefacit radix, siccatur, aperit, discutit, & parum adstringit. Lotium movet, calculos atterit, tormina ventris sedat, & epilepticos mirè juvat.

CLXXXII. Filix non ramosa dentata, C. B. Pin. p. 358. Filix mas, Matth. deutsch fol. 539. Dod. lateinisch fol. 462. Fuchf. fol. 595. Adv. Lob. fol. 362. Tab. lib. 2. fol. 471. Lon. deutsch fol. 250. Baldsar / Brunsf. deutsch fol. 305. Filix vulgaris Trag. Kyber. in Trag. fol. 546. Filix mas secunda, Thal. p. 43. Filix foemina, Gesn. hort. fol. 259. Cæs. lib. 16. c. 3. pag. 592. Filix mascula, Cord. in Diosc. fol. 76. Cord. hist. fol. 162. Dhnästiges gezähntes Farnkraut. Farnkraut-Mänlein / Matth. Tab. Lon. Baldsarn-Mänlein /

Fuchf. Waldfarn Kyber. in Trag. In der Hollen Grund in umbrosis.

CLXXXIII. Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis. C. B. pin. 357. Filix foemina. Matth. Deutsch fol. 539. Lob. ic. p. 812. Adv. Lob. fol. 362. Fuchf. fol. 569. Tab. lib. 2. fol. 471. Dod. Lateinisch fol. 462. Filix sylv. Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 127. Filix mas major sive foemina credita vulgò, Clus. Parn. 705. Filicis majoris primum genus, Trag. Kyber. in Trag. 542. Filix. Cæs. lib. 16. c. 2. p. 591. Thilypteris filix foemina, Cord. in Diosc. fol. 76. Filix mas, Ges. hort. fol. 259. Großästiges ohngezähntes Farnkraut. Farnkraut weiblein/ Tab. Matth. Waldfarn weiblein/ Fuchf. in der hollen Grund. it. in agris incultis passim.

CLXXXIV. Filix ramosa pinnulis dentatis. C. B. Pin. 358. Filicula petraea foemina 4. Tab. ic. p. 794. Pteridium masculum, Cord. hist. fol. 169. Filix foemina altera tenuifolia, Thal. p. 43. Kleinästiges gezähntes Farnkraut. Klein Steinfarn weiblein. Tab. Im Neuhauschen Schloß Graben in saxi muscò obsitis.

CLXXXV. Filix palustris maxima. Joh. Lœf. Radix rotunda, quæ dissecta genuinae aquilæ figuram exhibet. Herba in pollinem acta, & vulneribus inspersa, vulnera solidat. Hinc pecori & armentis perutilis est herba, in mictu sanguineo, certissimo rusticis remedio. Wenn es frisch/ ist es grün/ wenn es trocken/ wird es braun. Wächst im Löbnichtschen Walde im Elenbruch. Filix palustris maxima dentata, C. B. in Prodomo. Radix dissecta, formam semihominis & literas C. I. exhibet. Gezähntes Wasser-Farnkraut/ so hoch wächst.

CLXXXVI. Filum marinum. Joh. Lœf. Meerfaden oder

oder Meerstrang. Ejectamentum hoc maris chordis seu filis sonantibus assimile est formâ. Constat autem ex longissimis filis, crassis, rotundis, concavis, multifariè inter se complicatis, ac viscoso quôdam humore inunctis: quæ exsiccata partim subflavescent, partim nigricant, visciditate prorsus exutâ. In littore maris bey der Wange.

CLXXXVII. Folliculus marinus. Joh. Lœf. Wasser-Gall. Lacus Curonicus hujusmodi ejicit folliculos, rotundos, membraneos, aqvâ turgidos, qui siccati planissimi sunt & viridantis coloris.

CLXXXVIII. Fragaria vulgaris C.B. Pin. 326. Fragaria. Trag. Seb. in Trag. deutsch 398. Matth. Bauh. in Matth. fol. 721. Fuchsl. icon. pag. 487. Lon. deutsch fol. 242. Erdbeer-Raут, Brunf. deutsch fol. 200. Fragaria & Fraga. Lob. ic. pag. 697. Lob. obs. fol. 396. Dod. Lateinisch fol. 672. Fragum 1. & Trifolium frugiferum. Tab. ic. p. 118. Fraga fructu rubro Ey-stett. Fragula Cord. hist. fol. 173. Fragaria major, Thal. pag. 43. Erdbeer-Raут/ Matth. Erdbeer. Tab. Lon. Gemeine Erdbeer Thal. Fraga circa festum Pentecostes jam maturrima, vindemiam pollicentur uberem. In sylvis & locis apricis passim.

CLXXXIX. Fragaria cauliculis maximè reptantibus. Joh. Lœf. Weitkriechend Erdbeer-Raут.

Radix multô capillitiô fibrata, & ex atro ruffa, cauliculos spargit horsum vorsum teretes subrubicundos hirsutos quatuor & plurium ulnarum longitudine, humi jacentes, & ex intervallo radicationem filamentis suis multoties iterantes, ac nova subinde folia excludentes, hirsuta, per ambitum incisa, supinâ parte incana, pronâ viridia, atatis tractu rufescentia. Anff der Eurischen Nahrung/ in pago Lattenwalde.

CXCI. Fraxinus, Brunf. Lateinisch Tom. 3. fol. 237. Lon. deutsch Trag. Sebitz. in Trag fol. 888. Dodon. latin. fol. 833. fol. 66. Lob. ic. pag. 107. o. Adv. Lob. fol. 415. Matth. deutsch fol. 39. Gesn. hort. fol. 259. Tab. lib. 3. fol. 722. Fraxinus excellior. C. B. Pin. 416. Eschbaum. Tab. Deschen-Baum. Brunf. Eschern-Holz. Seb. in Trag. Esch-Baum. Eschern/ oder Steinäschern/ Lon. Eschern-Baum/ Matth. auff den Huben. Ejus fructus vel semen officinis lingua avis & lingua passerina nominatur. Calefacit & siccatur, lotium citat, ac Venerem stimulat. Cortex & folia cum moderato calore efficaciter siccant. *Τυρνέματα τῷ ξύλῳ*, ligniamenta potu exitiosa credi tradit Dioscorides. Sunt tamen, qui decocto ejus vice ligni Gvajaci felicissimo utuntur successu, autore Cæsalpino. Vulnere quoq; consolidat, Lignum certò tempore ab arbore resectum, vulnere cruentatum, ac debite post tractatum, cæditur circa Festum Divo Johanni sacrum, 3. vel 4. à novilunio die. Alii rescant tempore Solstitii æstivalis in ipsò meridie. Sunt, qui id faciunt ante exortum Solis ipsò Baptistæ die veteris styli. Modus facilis est: Lignum fraxini, orientem versùs ab arbore pendens, ante Solis exortum, die Johannis Baptistæ, cædatur unicò ac fervidò ictu. Catamitus vel venercus haut sit, qui cædit. Decorticans ita lignum servet, ne vel humectetur, vel à muliere, menstrua solvente, contrectetur. Usus: Ensiculus seu ferrum, quò quis vulneratus, acie suà singulis diebus per lignum sæpius traducatur, lignum locò blanditer calidò ac tersò servetur, vulneratæ parti curationem brevè spondens. Stupendum quid est, lignum ferrò oblidenti semel inductum, improvisò vulnere hamorrhagiam ac dolores sistere. Hiantia vulnera fraxinei ligni interiore cortice deligata, ita angustantur, ut futurà opus haud sit.

CXCI. *Fucus marinus πολυχιδης. Joh. Loesel.
 Rundblättriges / und in der Spitz zweyspaltiges Meer-
 Gras.

Fucus hic littore maris ejectus subviridis est, mox siccatu-
 horridum nigrorem induit. Ex rotundiusculis filamentis
 constituitur, quæ in progressu multifariam dirempta, tan-
 dem in extremitate ut plurimum bifida redduntur. Radix
 capillamentis tenuissimis & numerosis constructa est, quæ
 implicatione variâ invicem firmissimè cohærent. Circa lit-
 tus maris passim.

CXCII. Fumaria, Trag. Sebiz in Trag. deutsch fol.
 86. Cord. in Diosc. fol. 70. Fuchf. fol. 338. Lon. deutsch fol.
 202. Dod. Lateinisch fol. 59. Gefn. hort. fol. 259. Capnos
 fumaria. Adv. Lob. fol. 338. Fumaria fumus terræ, Matth.
 deutsch 507. Fumus terræ, Brunf. Lateinisch / tom. 1. fol. 99.
 Thal. p. 43. Cam. hort. 62. Fumaria officinarum & Diosco-
 ridis. C. B. Pin. 143. Erdrauch / Fuchf. Seb. in Trag. Erd-
 rauch / Tauben-Kropff Matth. Erdrauch / Tauben-Kropff /
 Ragenkörbel / Kraut / und Feld-Kraut / vulgò inter segetes
 nach Lauten-Mühl zu.

Fumaria sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. efficac.
 Colligenda Ole i. II in habitante, ac recens usurpanda.

CXCIII. Fumaria bulbosa radice cavâ major, C. B.
 Pin. 143. Aristolochia rotunda, Brunf. Lateinisch tom. 1.
 fol. 49. Aristolochia rotunda vulgaris, Trag. Seb. in Trag.
 608. Gefn. hort. fol. 248. Aristolochia rotunda vulga-
 ris, Fuchf. Cam. hort. 21. Pistolochia Fuchf. fol. 91. Ra-
 dix cava major, Dod. Lateinisch 327. Clus. hist. libr. 2. fol.
 271. Radix cava Herbariorum, Lob. ic. pag. 759. Adv. Lob.
 fol. 338. Radix cava. Clus. Pann. pag. 242. Fumaria altera

Matth. Bauh. in Matth. fol. 807. Aristolochia vulgaris flore purpureo, Eystett. Capnos, sive capnium phragmites majus & Pes Gallinaceus Cord. in Diosc. fol. 70. Chelidonia phragmitis altera, Cord. hist. fol. 122. Radix cava herbariorum, sive Aristolochia flore purpureo, Floril. Swert. part. 2. fol. 7. Capnos chelidonia, Lon. deutsch. 162. Leontopetalon alterum, Cæs. lib. 6. c. 75. pag. 270. & 271. **Runde Hollwurz das Weiblein.** Brunf. deutsch/ 147. **Groß Erdrach mit runder holer Wurzel.** **Rund Hollwurz/** Seb. in Trag. Fuchf. **Gemein Hollwurz/** Lon. **Hollwurz/** Biberwurz/ und **Hirsch-Kraut/** Brunf. Radix insigni est amaro. Calefacit, abstergit, mundat & adstringit, sudores lotiumq; movet, ac ulcera sanat sinuosa, durities quoq; & tumores inveteratos faucium ac tonsillarum discutit. Officina radice utuntur loco Aristolochiæ rotundæ veræ, quæ foliis crescit hederæ, aut brassicæ marinæ in Montanis Montis Pessulani. **Hinter Neuendorff im Walde.**

CXCIV. Fumaria bulbosa, radice non cavâ. C. B. Pin. 144. Aristolochia rotunda vulgaris radice majore solidâ Trag. Kyber. in Trag. 766. Chelidonia capnitis radice nigrâ, Thal. pag. 33. Aristolochiæ rotundæ fabæ altera species solida, Gesn. hort. 248. Aristolochia rotunda flore albô, Eystett. Capnos sive capnium phragmites minus, Cord. in Diosc. fol. 70. **Erdrach mit runder dichter Wurzel.** **Runde feste Hollwurz.** Solidâ quæ est radice, nunquam reperitur illis in illis, ubi fumaria radice cavâ pullulat. Diversum namq; amat solum. Semen potum herniosis pueris commendatur. **Hinter Brandenburg auff dem Lengken-Berge.** Item in der **Hollen-Grund.** Erumpit primò vere, ubi

suum tively tiritirlire tractim

Candida per vernum ludit alauda solum.

CXCV. Fungus vescus I. Joh. Lœf. Fungi favaginosi, sive fungi rugosi favis mellis similes, Lob. ic. 274. o. Morcheln. Fungus est vernalis, rugosus, cute membrancea, in cellulas fari instar distincta, capitello & petiolo, quo sustinetur, concavis. In frusta concisus, lotus, ebullitus, expressus, & in sartagine cum butyro frixus, delicatulum est ferculum, & ex fungino genere optimum. Im Morungshen. it. im Drtelsburgschen.

Hunc & alios fungos, tanquam *ωγαλείσματα* seu lauta edulia fumentes vulgus indoctum apud Borussos vinum bibere jubet, legem Zaleuci flocci habens, *ne quis injussu Medici vino utatur sub pœnâ capitis*, quæ Locris Epizephyriis duntaxat posita. Idem Medici svadent, sed *ἀκρατέστερον* vel meracius vinum eligunt, jubentq; *τραπέζοποις* mensarum structores, fungos apponant ante alios cibos. Crescunt in agris mense Aprili & Majô. zu Nobitten.

CXCVI. Fungus vescus II. Fungi 4. genus. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 736. Capreolini Tab. lib. 3. fol. 814. Reiskfen. Duplex est, in pinetis alius, alius sub abietibus. Uterq; totus est flavus, capitello inferius striato, succum fundens croceum & acrem. Ille crassior est, & oras habet sæpiusculè rursus reflexas, hic tenuior: utriusq; capitulum sæpè nonnihil æruginosi suprâ in meditullio obtinet, sæpè etiam albicat. Repperi eundem quoq; inter juniperi fruteta. Puteo dum anima intertrahitur, pauxillo ejus abluuntur, elixantur, mox abjectô jure de integro cum cepis coqvuntur, tandem coctione absumptâ aqvâ, cum butyro & pîpere friguntur. Itali abjectis petiolis, eorum cavo oleum affundunt,

dunt, additō sale & pipere, & in craticulis vel prunis integros assant. Sæpius ebulliti, Sale conditi, ac ligneis inclusi vasculis, venundantur in forō. Minusculi autem delicatissimi sunt, grandiores, quorum diameter secuncialis sæpè, viliores.

CXCVII. Fungus vescus III. Joh. Lœf. Stein-Reiz:
fen. Capitellum hujus suprà flavescit, & sæpè contortulum est, infrà albescit, sulcis veris destitutum, sed nonnihil inæqvale. Substantiâ est crassiore, & solidiore, pediculô crassiore, flavo. Frequentissimè aliquot connascuntur, figurâ prorsus inæquali. Succum reddunt copiosum croceum & acrem. Unum ex his prorsus degenerem vidi, *ἀκαλον*, sex uncias longum, cymbii formâ, substantiâ crassitudine unciali, & solidâ, quæ diffracta æruginosi quid contraxerat. Inter abietes. Minutal horum in sartagine frixum, sapore & melius est, nec ita viscosum, ac Capreolinorum. Calculosos juvant ex vetularum arbitratu.

CXCVIII. Fungus vescus IV. Joh. Lœf. Eich-Reiz:
fen. Duorum generum. 1. superiore parte ex rubro lateritio fuscum, inferiore flavum & sulcatum, pediculô crassô. 2. Capitellum summâ parte croceum est, imâ ex albo flavescens & sulcata, sed ex meris tenellulis & profundis plicis constitutum, quod diffractum lacteum, sæpè etiam croceum fundit succum. Pediculus ochræ, vel curcumenæ est colore, propius radicem crassus. Coctus hic fungus, recens acrimoniæ est alicujus, palato ingratus. Lentitiemq; seu lentorem obtinet. *Werden roh gegessen von den Weibern.*

CXCIX. Fungus vescus V. Joh. Lœf. Bruch-Reiz:
fen. Triplex est: Unus supernè ex rubedine & fuscedine flavescit, infernè subalbicat, pediculô flavulô & longulô, geese
 Bruch:

Bruchreiske. Alter supernè cœruleus est ex albo cum pediculo, infernè albidus, **blau Bruchreiske.** Prior crudus ingeritur à vulgo, & quidem cum sale, uterq; lactescit digitis pressus, & acris est saporis, lingvam vellicantis. Tertius totus est lateritius colore, etiam diffractus, thyrsulo unciali, tenui. **Rothe Bruch-Reiske.** Gustu fatuus. Et hic nonnihil lactescit.

CC. Fungus vescus VI. Joh. Lœf. Geelôhrchen/ totus flavescit, strias habet in pediculum radiatim desinentes, nec putrescit, sed ætatis tractu arefcit. In senio ubi constituitur, oræ incurvantur, & crispantur, sursum totæ cum reliquâ parte abeuntes. Grati est odoris, & subacris saporis. Muscosa eligit loca betulas inter & abietes.

CCI. Fungus vescus VII. Joh. Lœf. Süßling/ multigenus est. 1. supernè balauftii instar rubescit cum petiolo, infernè albicat. 2. suprâ ex rubedine fuscus est, infrâ albus. 3. superiori parte flavus, inferiore albus cum pediculo. 4. suprâ ex viridi totus cœruleus, infrâ cum Pediculo candidulus. 5. in meditullio supernè ex viridi cœruleus, circumcirca albus. Priores duo tardius, posteriores citiùs vermiculantur. Omnes dulcis saporis. In locis udis: quale solum omnes ferè exoptant fungi. Hinc Aristæus proverbio dixit: *Fungos concupiscit lapidosus ager.* Convenit illis, qui ambiunt & optant, ad quod non sunt apti. Fungi enim nascuntur in molli & humidâ terrâ, non inter saxa. Simile adagium est, *Optat ephippia bos piger.*

CCII. Fungus vescus VIII. Joh. Lœf. Stöbling. Fungus est orbicularis & planus, striis parte inferiore ad petiolum longum radiatim excurrentibus, supernè pallidè fuscus, oras versùs tenuiter striatus, infernè subalbus.

L. Tenel

Tenellus adhuc pileolo ex fusco flavescente, & punctato est suprâ. Succulentus & gustu subacriusculus. Cædvis lignis copiosè innascitur.

CCIII. Fungus vescus IX. Joh. Lœf. fungus albus acris. C. B. fungus piperitis, quia instar piperis lingvam vellit, Porta. *Pfefferling oder Bitterling*.

De fungis notandum, quod pro incolarum diversitate & regionum diversis quoq; nominibus insigniantur. Nos itaq; & nomina & descriptiones fungorum, prout in nostris terris figurantur & nominantur, hic tantum apposuimus.

Totus est candidus, lacteum succum fundens, ferventissimi saporis. Carpinis & quercubus se associat. Lac ejus cum Syropo de Altheâ sumptum, experimento certo calculum frangit, & urinam citat. Verrucas aufert illitu.

CCIV. Fungus vescus X. Joh. Lœf. *Herbstling*. Candidus est totus effigie fungi piperitidis. Subacris saporis. Ostryas amat, & quercus.

CCV. Fungus vescus XI. Joh. Lœf. *Birdling*, Trium est generum 1. supernè ex albo & fusco rufescit, & lanuginem ostendit circa oras incurvas maximè conspicuam: infernè strias alit subalbidas, & pediculum dilutè rufescentem. Concisus succum fundit lacteum, acredine suâ lingvâ maximè vellicantem. 2. Parte supernâ albicat viscoso nonnunquam humore inunctus, oris externis deorsum incurvatis in lanuginem fermè abeuntibus: infernâ parte sulcatur & albicat, pediculò albô fultus. Acredine cedit priori, & degustantium naribus odorem ireos ferè ingerit. Succus ejus initio albicat, mox luteolus est, ac sulphuris colore. 3. Dilutè capitellò suo parte supernâ flavescit, oris ut in cæteris incurvatis, pediculum versùs crassus, infernâ albescit, & totus succum reddit sulphureum concisus, gustu acrem. *gelbe Birdling*.

CCVI. Fungus vescus XII. Joh. Lœf. *Glattling*. Suprà fusci est coloris, infra subalbidus, pediculo candido. Acris saporis. Aquâ coctus cum pauxillo piperis, salis & butyri, additis cepis non contemnendum est ferculum. In ericetis & locis muscosis.

CCVII. Fungus vescus XIII. Joh. Lœf. *Lahke* / jure suo *Weisserling*. Incurvus est capitello pediculum versùs crassum & brevem, supernè ex fusco subalbus, striis infernè albicantibus. Dentibus diutulè comminutus, acris & piperi proximus prorsus igneæ est naturæ, ceteros acumine vincens. Pulpa intus satis firma albicat.

CCVIII. Fungus vescus XIV. Joh. Lœf. *Stein-Pülste*. Supernè infusci est coloris, infernè candidi, crassiore pediculo. Senescens colorem mutat, & infernè ex viridi flavescit. Substantia ejus solidior est, ac in cæteris fungis. Inveteratus etiam nomen mutat, & vocatur *Rühe-Pülste*. Fungum hunc *κρυνοχίμβηξ* ἢ *κρυνοπρίστης* autumnii tempore in schidia dissecat, siccatur, usui servatur, post ablutum, ebullitum, & in minutum redactum, cum vino, additis butyro, pipere & cepis de integro coquit, ut ferculum existat helluantium, vel potiùs ex heluco malè habentium. Succus ejus putridus cimices interficit, parietum & lectulorum rimis inmissus. Siccatus fungus, aquâ emollitus & impositus tumorem discutit.

CCIX. Fungus vescus XV. Joh. Lœf. *Heide-Stein-Pülste*. Croceus est parte superiore, & nonnihil maculosus, inferiore itid. flavus & porosus, pediculo longiore flavescente. In musæo meo diem unum servatus totus abiit in succum quendam glutinosum, horridum, atramento prorsus similem, cui myrias vermiculorum jungebatur. Vulgus proinde temperet gulæ in hoc ancipiti cibo.

CCX.

CCX. Fungus vescus XVI. Joh. Lœf. *Kofzelarfe*. Duplex: unus suprà & infrà albicat, puritate suâ haud cedens priori, *weiß Rozelarfe*. Alter parte summâ infusci est coloris, imâ candidi, pediculo candido, maculis quibusdam nigris asperso, ei vocamen: *Schwarze Rozelarfe*. Locis oblectatur muscolis & iudis.

CCXI. Fungus vescus XVII. Joh. Lœf. *Rothköpffchen*. Pediculo modò crasso, modò longiore, & maculis nigris velut à muscis conspurcato, pileolus insistit ex fusco lateritius, sæpè nonnihil miniatus, infernâ parte candidus, substantiâ durâ, & in senescentibus quasi spongiosâ. Est & aliud genus superiore parte flavescens, aliquantillum *Cureminæ* coloris particeps. Pressus re quâpiam ærugineum quasi quendam contrahit colorem. Graminosum eligit solum.

CCXII. Fungus vescus XIX. Joh. Lœf. *Ziegen-Pülste*. Duplex & hic est. 1. totus flavescit, pileolo maculis fuscis variato, petiolo longiore, qui interdum aliquid rubedinis contrahit. Tener & uncialis, ubi est adhuc capitello, subtus amœnulè croceus est. 2. supernè lateritio est colore, infernè flavo pediculo fultus & subflavescente, & nigris punctis notato. Ericeta & muscosa amat.

CCXIII. Fungus vescus XIX. Joh. Lœf. *Astiger Ziegenbart*. Ramosa est planta, musci ferè Ceratoidis formâ, caudice suo albicans, reliquâ sui parte flavescens: Ætatis tractu mutat colorem, & rufulus seu pallidè incarnatus existit. Im *Eichen Walde* in locis incultis.

CCXIV. Fungus vescus XX. Joh. Lœf. *Bock*. Duplex est, alius *Eich Bock* / alius *Hasel Bock* / quercinus radice alba ex multis latiusculis agglutinentis, circa oras partim

con-

contortulis, partim laceris, imbricatim quasi cohærentibus, constituitur, supernâ parte infuscis, internâ candidis & spongiosis. Autumno exit, & in tantam sæpè excrefcit molem, ut voratus aliquot satiet homines. Aqueus, & gustu subacris. In coryleto natus æstivis diebus, longè minor est, coloris marini, radice candidâ.

CCXV. Fungus vescus XXI. Joh. Lœf. viel köpffigter grauer Bock. Est radice latâ, sessili & albicante, ramuli oriuntur numerosissimi, brachiati, quorum summitatibus capitula parva, unciam lata, & minora, insident, convexâ parte fuscâ, imâ sine striis alba, pediculis candidis fulta. Servatus in conclavi aliquot dies, ramusculos inter, & ad radicem teneram quandam acquirit lanam, eamq; albicantem, quæ post horridum induit nigrorem. Gustu acris est.

CCXVI. Fungus vescus XXII. Joh. Lœf. Borusken. Tenuis est. & internè coloris infusci, supernè subflavi. Exilis & subdulcis est ligni παραφύας in locis udis, qui omnium citissimè pullulat.

CCXVII. Fungus vescus XXIII. Joh. Lœf. Ruhmil-den. Novellus adhuc terræ ita affigitur, ut faciem mentiatur crepitus lupi, integer namq; est, & internè clausus, pediculo brevi. Mox hincit parte internâ, & pediculo fimbriam relinquit. Strias inferius habet infuscas ad pediculum excurrentes, alutamento quasi quodam crasso, & albicante superius vestitus, quò abstracto pulpam ostendit albicantem saporis subacris. Fungus hic, & alter piperinus, ubi è terrâ erumpunt, reliqui vanescunt. In locis sæpè stercorosis equorum culpâ.

De hoc vesco fungo idem affirmare nobis licet, quod Dorrioni tibicini olim de pisce Rajâ. Qvippe dicenti cuidam,

svavem in cibo Rajam esse, respondit ille: perinde ac detricto pallio si quis elixo vescatur.

CCXVIII. Fungus vescus XXIV. Schweinichen. Parte superiore ex albo fuscus existit, inferiore candidus, sulcis ad pediculum excurrentibus, qui longior est ac colore cerussatus. Gustu ferè fatuo est. Cuticula capitellum cingens abraditur, antequam in usum trahitur.

CCXIX. Fungus vescus XXV. Joh. Lœf. Pömpchen. Tenellus ac recens adhuc, fastigiatus leviter est parte supernâ rufula splendente, ac madidâ pingvi ungvine, tunicâ cinctus parte infernâ hymene seu membranulâ albicante clausus, quâ ruptâ flavescens ac porosa visui ingeritur pulpa. Fractus, aut tunicâ suâ, quæ levi brachio abstrahitur, spoliatus, candidâ intus est substantiâ, ac sapore mucilaginosus. Pediculus in novello longior, & albidus coloris, in senescente subflavus, & maculosus.

CCXX. Fungus vescus XXVI. Joh. Lœf. Größling. Totus albicat cum pediculo, parte inferiore striatus, & oris incurvis. Acris est, & linguam vellicans. Plebi totus in craticulâ commendabilis. Querceta amat.

CCXXI. Fungus vescus XXVII. Joh. Lœf. Gänssichen/Pol. Prozonke geele Schweinichen/ quod & Polonicum nomen indicat. Capitellum ex fusco-viridi flavescens est supra, sulcatum infra & dilutè flavum, cum pediculo longiore. Colorem illum pictores Schüttgelb nominant. Condiuntur ut capreolini, & gustu sunt aqvei.

CCXXII. Fungus vescus XXIX. Abreitzchen. Joh. Lœf. Fungus vetustis lignis assidens est, capitellò nunc majore, nunc minore, supernâ parte circumcirca pallidi, quandoque atrorubicantis, in meditullio subalbidus, & ad flavedinem tendens.

dentis coloris. Ambitus hujus, successu temporis crispari affolet. Inferna capitis pars terram versùs foliosa est; foliis ac sulcis profundis super pediculo ad extimam circumferentiam excurrentibus, fusci coloris. Pediculo nititur rotundo, striato, partim albi, fastigium versùs, partim ex ruffo fusci, radicem versùs coloris. Aqvosi & ad acredinem quandam tendentis est saporis. Edulium sapius à me esitatum nec contemnendum, si elixatus abjecto jure iterum coqvatur, cepis priùs quoq; coctis, pipere & butyrò adjectis. Crescit mense Junio.

Caterùm omnes fungi vesci parcè ingerendi, cum terræ sint ulcera, & succi pravi. Aristonicus olim legem tulit, de piscatoribus, 1.) si plus licerent pisces, in carcerem deducerentur, relictis in foro piscibus, ut marcescant, nec venundari possint. 2.) ne sedentes vendant pisces, sed recti stent perpetuò. 3.) ut appensis tabulis pretium scribant, quò citius mercaturi reverterentur domum. Fungivendis vetulis lex imponenda, ut non nisi prægustatos à se venditent fungos ingenti pretiò, tabulasq; in forum adducant hortatrices:
Ab ancipiti cibo abstinendum omninò!

CCXXIII. Fungus non vescus I. *Schwarzer reh-haar-richter Fliegen-Schwam.* Pileus, cujus diameter septem unciam, parte superiore fuscus & scaber est: inferius cinereus pilosus, pilis suis capreoli animantis prorsus similes, pediculo bianciali crasso, & cinereo nitri capite. Hunc & subsequentes qui degulant fungos, fungi sunt, h. e. stulti & stolidi, quibus remedio est illud, de quo Bubikir Zachariæ Errasis filius in volumine, Elhavi seu continens in scripto, lib. 21. c. I. num. 25. *Stercus humanum, inquit, sumptum per os curat nocumentum eveniens ex usu fungorum lethalium.*

Volu-

Volumen hoc Brixia impressum est per Jacobum Britannicum Brixianum anno 1486, nec citatum planè (quod miror) in Bibliothecâ universali à magno Gesnero.

CCXXIV. Fungus non vescus II. *Nothor Fliegen-Schwam*. Capitulum est summâ parte miniatuli, vel balaustrini coloris, numerosis maculis, iisq; albis insignito; infimâ parte candido, & striato, pediculo crasso, rubente & sæpè fimbriato. Maculae nil nisi partes membranulae sunt senescente fungo laceratione factae. Credo fungum tenellum adhuc totum membranulâ albâ vestiri, quæ paulò post in plusculas disrumpitur partes, fungo augmentum intumescendo sumente. Subtus interdum ex albo flavescit cum pediculo. Loca amat fungorum *der Stein-Pilzchen*. Siccatus & aceto rursum mollitus, utiliter peste laborantium imponitur tuberculis. Fungo hoc non ita pridem sex Lithvani in Districtu Insterburgensi suffocati. Fortè, & Evripides poëta in Icarum profectus, hujus fungi esu uxorem cum duobus filiis adultis, & unâ puellâ olim amisit. Quo de spolio sequens epigramma composuisse fertur ab Eparchide:

O Sol, qui sempiternum cœli verticem peragras,

Adeone indignum facinus oculis tuis antehac conspexisti?

Matrem, virginem filiam, & fratres duos consanguineos,

Eodem die fato ereptos.

Hinc Junius adagio: *tanquam fungus suffocat.*

CCXXV. Fungus non vescus III. *Geeler Fliegen-Schwam/ Eichen-Fliegen-Schwam*. Totus est croceus, maculis purpurascentibus in pileoli parte superiori intercurrentibus, pediculo crassiore. Inter abietes & quercûs.

CCXXVI. Fungus non vescus IV. *Nasel-Fliegen-Schwam/ Grau-Fliegen-Schwam*. Capitellum parte supernâ

pernâ murini ferè coloris, infernâ subalbum, & fulcatum, pediculo crasso. Diffractus pulpam intùs ostendit niveam. Capitellum est ex fusco murinum suprà, frustulis membranaceis, & punctulis quibusdam constans. Oræ ejus sæpe sursum ita abeunt, ut tubulum quasi quandam exhibeant.

CCXXVII. Fungus non vescus V. *Weisser Fliegen-Schwam*. Albicat suprà ex dilutâ flavedine, infrà prorsus nivei coloris, & pediculo nititur longiore, albicante & fimbriato.

CCXXVIII. Fungus non vescus VI. *Heide Fliegen-Schwam*. Triplex est: supernè ex albo flavus, infernè fuscus, strias habens, pediculo crassiore & subalbo, in summo velut fimbriato. 2. Suprà ex viridi albicans, infernè candidus, pediculo ad capitellum fimbriato. 3. Supernâ parte flavus, infernâ albus, pediculo flavescente. Muscæ hos & antè recensitos amant fungos, sed cum exitio.

CCXXIX. Fungus non vescus VII. *Weisser Kolben-ächtiger Fliegen-Schwam*. Typhæ palustris ferè est capitello, rotundato, oblongo, unciarum quatuor longitudine, duarum crassitudine, foris tunicâ pallente primùm cinctus, quâ disruptâ incrementis augescente fungo, pluscula frustilla, tunicæ pileolo albido adhærentia advertuntur: intùs initio albulus est, mox horridè nigrescit sulcis suis, oris laceris, ac fimbriam pediculo relinquentibus, sursum actis, ac latum capitulum efformantibus. Petiolo nititur longiore, semunciam crasso, albicante, Graveolentiâ totus est molestus.

CCXXX. Fungus non vescus VIII. *Schwolstpülsen*. Totus candidus, pediculo imâ parte crasso. Digitis pressus extemplò colorem acquirit cyaneum, visu elegantissimum. Italis *azzurro oltramarino* dictum. Diutulè du-

rat, nec faciliè corrumpitur. In sylvis abiegnis. Siccatus, aceto maceratus, & carbunculis pestilentibus affirmatus, venenum certo experimento evocat.

CCXXXI. Fungus non vescus IX. *Blutpilsken*. Crassus est, hepatis ferè effigie, initio foris albicans, post manibus contrectatus rufescens ac tenuissimis maculis sanguineis insignitus. Dissectus pulpâ est rubicundâ, quæ digitis pressa, succum reddit sangvinolentum, loturæ carniū assimilē.

CCXXXII. Fungus non vescus X. *Holzschwämme*. Capitulum summâ parte luridum est, cum pediculo propè terram crasso, infimâ subalbum. Lignis assistit, in cædis sylvis.

CCXXXIII. Fungus non vescus XI. *Holz Geelörchen*. Arborum trunculis adnatus, nunc ex flavo albicat, nunc totus flavescit, & capitulo superius est molli velut alutâ investito, inferius copiosis villis instructo, thyrsulo longiore.

CCXXXIV. Fungus non vescus XII. Fungus ovatus, & crepitis lupi, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 737. Fungus glomeratæ rotunditatis, Lob. ic. p. 275. o. *Weiberst / Pawenst* / terrâ primū erumpens eximii candoris est, post pallescit, & fuligine quasi obducitur. Tener adhuc pulpam intus habet caseosam ferè, quæ tractu ætatis in fumanthem abit pulverem. In cædis sylvis & siccioribus pratis. Am *Aneiphöfischen Ball* aufm *Haberberg*. Fungum hunc repperi insolitæ magnitudinis, cujus perimeter cubitum, ac duos quadrantes superabat. Sanctè mihi est contestatus chirurgus quidam, fungum hunc se repperisse aliquando, tricubitali in ambitu crassitudine. Fungus hic,

hic, ubi putret, ac in furno siccationem sustinere cogitur, foetorem initio naribus injicit, qualem asellantis *πυρρὴ τρεῦλον ἰαῖσα μέλθω*. Ab eo fortè vocamen *Posist* / vel *Pawensist*. Pulverulenta ejus substantia cum pauxillo vitrioli albi, beneficio calami scriptorii, jumentorum oculis immittitur, lippitudine discruciat. Hæmorrhoides, & sanguinem undecunq; fluentem sistit, partesq; sanat ulceratas. Vitulis ac jumentis communiter porrigitur, diarrhæa infestis.

CCXXXV. Fungus non vescus XIII. Fungus virilis penis arrecti facie, Lob. ic. 275. o. Fungus foetidus penis imaginem referens, C. B. Pin. 374. Fungi perniciosi 23 generis, species 5. Clus. CCLXXXVII. *Pintchen* / *Erdschmeer*. Tuberis facie primum emergit, post ruptâ extimâ tunicâ colles exilit albus, glande instructus suo, ex atro virescente. Muscæ eô gustato intereunt, cujus causâ honoratur hic phallus à vetulis. Olim alteri phallo alius habebatur honos. Figuram membri virilis priscis temporibus, mense Augusto, matronæ divinis colebant honoribus, eam extrâ portam Collinam, ad ædem Veneris, cum pompâ sacrorum deferentes: mox à castissimâ & spectatæ pudicitæ matronâ, præter matronale decus, in sinum Veneris dabatur. Vide Christoph. Landinum in Georg. Virgilii fol. 47. p. 21. Divum Augustin. de civitate Dei lib. 7. c. 21. Gyraldum item de Diis Gentilium, Arnobium, Tertullianum, Lucanum, & Lactantium. Bacchi etiam festa dum celebrabantur, virile membrum plastro per forum vehebatur, cui matronæ spectatæ pudicitæ, velut sancto numini coronam imponebant.

CCXXXVI. Fungus non vescus XIV. Fungus membranaceus auriculam referens, sive sambucinus, C. B. Pin.

372. Fungus ad sambucum. Trag. Kyber. in Trag. 941. Fungorum perniciosorum 1. genus, Clus. hist. CCLXXVI. Auricula Judæ vulgò. *Hollunderschwām / Glöderörchen*. Membranaceus est, ac sinuosus, coloris ex cinereo nigricantis. Arboris caudici innascitur, dùm folia erumpunt. Siccatur, adstringit, & in tumoribus, ac inflammationibus faucium, oculorum & aliarum partium perutilis, mollescit, aquâ maceratus ac intumescit.

CCXXXVII. Fungus non vescus XV. *Straßling*. Exilis est fungus capitulo unciali, totus subalbus, lentâ & alutaceâ substantiâ, infra sulcatus, pediculo rotundo & oblongo. Unus alteri sæpe & capitello & radice connascitur.

CCXXXVIII. Fungus non vescus XVI. *Gefrauster Ziegenbart*. Ramosus non est, velut alter edulis, sed ramulorum loco membranulas obtinet anfractibus multis, tortuosas & sinuosas, visu elegantissimas, agninas lactes apertus jam & in globum convolutas effigie suâ imitantes. Foris subflavus est, intus candidus, radice crassâ: Inter corylos.

CCXXXIX. Fungus non vescus XVII. *Mäusörchen*. Suprà & infra ruber est ac lævis, pediculo tenuissimo fili instar, lignis vetustis annatus, in locis graminosis.

CCXL. Fungus non vescus XVIII. *Hasenörchen*. Fungus est, externis folliculis circa extrema & connatis & hiantibus sursum prorrectis constitutus, foris exfuscus, intus albus, thyrsulo unciali, sæpe & productiore, ex fusco albicante. Tota planta concava est pediculo, ferè tiaram referens. Octobri mense collecta, quæ vernò tempore inter abietes provenit.

CCXLI. Fungus non vescus XIX. *Schlangenkops*
den.

fen. Orbiculare est capitellum suprà ex fusco glaucum, versùs oras nonnunquam striatum, infrà cretaceum & sulcatum, petiolo longiore albo non cavo.

CCXLII. Fungus non vescus XX. Großer Protetstuel. Variat. 1.) latitudine secunciali est, caput orbiculare, suprà ex fusco variegato flavescens, infrà ex aquilo fuscum, plicaturis latiunculis, ad pediculum longum ex fusco-flavo rufescentem abeuntibus. 2.) Pileus, cujus diameter sexuncialis, suprà ex flavo albicat, & alutamento quasi quodam vestitur, oris deorsum inæqualiter & sinuosè flexis: infrà striis ad pediculum brevem excurrentibus, colore ex fusco flavo. 3.) Capitulo, cujus diameter quatuor unciarum summâ parte est ex fusco lateritio, oris in tenello pediculum versùs magis inflexis, in adultiore minus: imâ sulcato, & ex fusco viridi: petiolo in juniore albicante, in seniore ex fusco rufescente & splendente. 4.) Biunciale ejus capitulum suprà ex fusco album, infra pallidè striatum, & pallidè fuscum cum pediculo.

CCXLIII. Fungus non vescus XXI. Klein Protetstuel. Fungus est unciali capitello, & minore pediculo longiore. Ejus aliquot species. 1.) totus ex albo violaceo fuscus, infrà striatus, caule non cavò. 2.) superiori parte ex violaceo albicans, inferiore violaceus, petiolo non cavo. 3.) capitello rotundiusculo, subalbo, infernè rufulus seu ex albo incarnatus. 4.) Supra ex albo flavus, & velut alutamento quodam investitus, infrà ex cinereo fuscus. Senescens parte inferiore prorsus infusci est coloris. 5.) totus ex croceo rufus, pediculo longiore contortò. 6.) Croceus ex toto, pediculo longiore recto. 7.) capitello suprà candidus, oris sursum reflexis subalbidis, infrà striatus & albus. 8.) Su-

pra subalbus ac lævis, infra sulcatus & candidus, thyrsulo nonnihil incurvo. Sui generis adfites habet sæpiusculè sibi annatos. Omnes in locis incultis beyrn Penartschen Walde.

CCXLIV. Fungus non vescus XXII. Groß Poggensstuel. Capite est supra albido, infra horridè nigro, petiolo longiore candido. In fimetis & agris. In agro enatus orbes sæpe nostros majores magnitudine exæquat.

CCXLV. Fungus non vescus XXIII. Klein Poggensstuel. Exilis est fungus & varius. 1.) totus ex flavo fuscus, internè sulcatus, pediculo longiore non cavo. Cum vitriolo coctus in elephantiasi & scabie foedâ a vetulis extollitur. Sæpe ex butyro frixus illinitur in achoribus & malignâ capitis scabie. 2.) Ex fusco cinereus supra, infra ex atro fuscus, petiolo longiore tenui & concavo. 3.) in primâ ætate totus subalbus, post ex cinereo fuscus, pediculo longiore, tenuissimo & concavo. 4.) Capitello est supra ex fusco flavescente, infra striato, consimilis coloris, thyrsulo longiore subcroceo. Omnium capitella nonnihil fastigiantur.

CCXLVI. Fungus non vescus XXIV. Fungus πολυκέφαλος caulibus ad radicem connatis. Vielsköpfiger Poggensstuel. Ex numerosis constituitur fungis (viginti sex semel, semel quadraginta tres connatos notavi magnitudine differentes) concursu pediculorum unam radicem exstruentibus: Petioli longitudine septem unciarum, crassitudine semunciali, candiduli & contortuli sunt, rotundi partim, partim lati: capitella, quorum diameter sæpe quatuor unciarum, vel longior, cretata veluti supra existunt, infra sulcata & albida, quæ altitudo ætatis tractu superiore, capitum parte in fuscedinem abit. Radici succus quandoq; adhæ-

adhærescit, qui insiccatus nitet & pellucidus est. *Bey dem Zöllhause am Rneiphöfischen Wall.*

CCXLVII. Fungus non vescus XXV. Fungus bi-orchis anthracinus, *Schwartling*. Ater est in quercu natus, gravis, biuncialis magnitudine, ex duobus quasi fungis orbiculatis constitutus, radice brevissimâ. Sauciatus & confossus succum reddit horridè nigrum, gustu modicè adstringentem. Ad lancem recens positus drachmas quinq; pondere exhibuit.

CCXLVIII. Fungus non vescus XXVI. Fungus turundæ effigie *langlächtiger Rößchen-Schwam*. Biuncialis est altitudine, oblongus, subrotundus, digiti minimi crassitudine, totus infuscus, radicem versus curtam attenuatus. Pennato musco annatus. *Hinter Lattenwalde im Gebirge.*

CCXLIX. Fungus non vescus XXVII. *Reißkenblut*. Capitellum ejus orbiculatum, ligneolæ ferè est indolis, parte superiore circinationes quasdam exhibens, ex albo fusco flavescentes. Inferius tenuiter porosum est, ex fusco subalbum, pediculo unciali, biunciali & longius producto, ex fusco flavescente fultum. Morbidus aliquando fungus, & ad interitum vergens, supra viridiusculus est maximam partem, infra infuscus.

CCL. Fungus non vescus XXVIII. *Boletus cervinus communis officinarum*. *Gemeine Hirschbrunst / Steinpulzfen / Blüht* *Fœmellis*. Fungus est *σφαγεσίδης*, maculosus & subalbus, biunciali magnitudine, sæpe & major, petiolo carens. Interior pulpa nigricat, & compactior est primitus, post in fuliginem abit. Repperi ex his unum candidâ prorsus intus substantiâ, cujus frusta chartâ involuta, post croceo tingeantur colore unâ cum segestri. Existimo immaturum

maturum illum fuisse. Terræ affigitur crepitûs lupi instar. Libram unam horum fungorum à Belgis quatuor florenis redimunt nostrates, à fungivendis vetulis hic locorum quatuor grossis impetrandam. *Αφροδίσιον* quid est, sistitq; sanguinem pulpâ vulneri immissâ. Bey Selnicken in locis muscosis.

CCLI. Fungus non vescus XXIX. *Wäßerichter Galretschwam*. Pediculo crasso, anguloso, plura insunt capitula crassa, semicircularia, sinuata, supernè ad fuscenedinem abeuntia, infernè veluti pilis albicantibus oblita. Totus pellucidus est carniû instar galredæ lentus, viscidus, aqvosus. Putrido ligno abiegno adnatus Octobri Mense, Im Lœbenichtschén Walde.

CCLII. Fungus non vescus XXX. Flos arborum, fungo affinis, *Zauber Butter* Vetulis. Cremore est initio fluidus ex putrilagine abietis natus, curcumæ colore siccatus amœnissimè flavescit, & spongiosus nonnihil est. Colorem pictoribus suppeditabit. In Sylvâ Lœbnicensi mense Octobri.

CCLIII. Fungus non vescus XXXI. Fungus racemosus vetustis lignis adnatus *Poggenaug*. Fungulus, est minutus globosus, sociennos multos racematim sibi cohærentes habens, colore ex atrò fuscus, punulis minutissimis insignitus, pediculo nullo. Fractus pulvisculum, tunicâ inclusum suâ, visu elegantissimum offert, pallidè purpureum, qui cum oleo subactus hepaticus fit colore.

CCLIV. Fungus non vescus XXXII. Fungus granulofus corallinus. *Rörnichter Corallenschwam*. Fungus omnium tenerrimus est, rotundulo capitulo, thyrsulum, versis longescente, papaverini seminis magnitudine, Coral-

lii quidem colore, sed multò amœniore, incarnato, pediculo curto & tenui, fili instar. Sociennos numerosos arctè sibi adjunctos habet, in natali ligno putrido. Succo intus turgidulus est, pictoribus commendabili.

CCLV. Fungus non vescus XXXIII. Fungus granulatus incarnatus. *Rörnichter Fleischfarber Schwam.* Priore grandior nonnihil est, pileolo rotundo, incarnato, minuti seminis magnitudine, intus cavo & subalbo, pediculo pertenui candido. Numerosæ annascitur terræ muscum inter pyxidatum.

CCLVI. Fungus pyxioides coccineus XXXIV. *Scharlach rother Büchenschwam.* Coryli, aliarumq; arborum ramulis cædvis putrilaginem minitantibus insidet, effigie pyxidulæ minutæ, intus coccinei, foris subalbidi coloris, pediculo exili. Repertus mense Febr. 1648. in der Hollen Grund/hyeme aurâ maximè blandiente, quæ flores asaro, erygero, taraxaco & consimilibus plantis, hoc tempore indulserat, præcoquam maturitatem & aëris ferventias omnibus cum stupore admirantibus.

CCLVII. Fungus non vescus XXXV. Fungus cucullatus. *Rappenschwam.* Cæduo & putrido ligno adnascitur serie quâdam, cuculli alicujus aut pallii muliebris formâ, foris candidus, lanuginosus, intus ex albo flavescens, & rugosus. Totus lentus ac gustu fatuus.

CCLVIII. Fungus non vescus XXXVI. Fungus farreus. *Mehlschwam.* Ex multis frustis latis, scabratis ac camuris, imbricatim sibi adjunctis, coassatur, annosis assistens arboribus, foris subflavus, intus candidus, qui levi manu in pollinē farinæ prorsus similem atteritur, solidandis ulceribus, additis aliis, mirificè utilem, vetularum experimento. Im Löbenichtschent Walde in den hollen Eichen.

CCLIX. Fungus non vescus XXXVII. Fungus lignosus pediculo longiore. *Holzächtiger Schwam mit einem langen Stiel.* Vetustis & aridis insistit lignis, capitulo supra scabro, fusco, at in medietate saepe fossulum, cavum illud umbilici, quod γαγγαμὸν dicitur græcis, representantem, oris sursum reflexis fimbriam facientibus: infra striis ad pediculum excurrentibus, spithamum longum & productiorem saepe, qui infimâ parte crassior, & tactu holosericus. Duos foris alveario adnatos domi servo.

CCLX. Fungus non vescus XXXVIII. *Scheibenbüchsen Schwam.* Truncis adhaeret semicirculi formâ, summâ parte circinnatâ, & saepe tuberosâ, imâ venustè foraminulentâ, tortuosâ, plicatili, flexibus labyrinthicis, quos inter minuscule hinc inde granula. Fagorum, quercuum aliarumque arborum ὡς φυὰς. Cum nitro & sulphure diutule coquendus est, ut mollescat. Wird zu den Scheibenbüchsen gebraucht.

CCLXI. Fungus non vescus XXXIX. Fungus τυρρῆος ῥάσιχτης Holzschwam. Fungum hunc, qui domi compluitur, saepe advertit tignis & asseribus suis annatum, rotundum saepe, aut alterius figuræ, solidum foris, lactescens. De homine illo proverbium est: τὸν ἑκὼθεν ἐρεχθήσαντα ἑδὲ θεὸς οἰκτείρει.

CCLXII. Fungus non vescus XL. Fungus arborum lignosus. *Harter Holzschwam.* Tuber est ligneum semicirculi figurâ, cui novus quandoq; allabens succus incrementum largitur. Foris partim nigricat, partim ex albo flavescit, subtus candidum prorsus est tuber, & tenuissimè fungosum.

CCLXIII. Fungus non vescus XLI. * Fungus pyxioides

des feminifer. *Kleiner saattragender Büchschenschwam.* Fungus est exilis, asseri vetusto, è pino facto, plerumque (eâ sæpè serie, quâ spectantur apium locutamenta, quæis ingeritur mel) annatus, quandoq; etiam terræ assidens, radicatione fibrillis quibusdam tenellulis impetratâ. Ubi primum erumpit, capitello est ochræ colore, reliquo corpore incano ac villosa: dissectus pulpâ intus est albicante, ostenditq; seminum rudimenta pulpæ ceu matrici suæ inhærentia, quâ medullaceâ temporis tractu absumptâ materie, hiare incipit fungus, & abjecto operculo seu velamine pyxidem formâ refert elegantem, in quâ copiosum & aspectu jucundum siltitur seminium.

CCLXIV. Fungus non vefcus XLII. * Fungus digitatus alveariorum, das Händchen / das Mütterchen / Pol. Ręnka, Materka Podpora. In apiario, ubi favi, cellæ, seu locutamenta apium, quandoq; reperitur fungus, ligno annatus, quem apiarii sacratissimum habent, ac veluti thesaurum pretiosissimum curatè asservant. Figurâ sæpius variat: ὡς παρὰ τὸ πολὺ, digitatus est, rarius aliâ visitur formâ. Apud Nobilem quendam ab Aulak inventum eum effigie humanâ, rettulit mihi Vir fide dignus. Wulffsdorfio, prædio nobilissimo Illustris Comitæ & Burggrabii à Dönnhoff, fungum obtineo grandiusculum, mirè digitatum & cornutum, cui in unâ extremitate elongatæ, & contortulæ subserviunt portiones, fungos referentes capitatos, pediculis innitentes suis. Birckenfeldiæ duos vidi, ex alveariis primum desumptos, quorum major κερατοειδής, minor χερσιδής. Major ex admistâ fuscedine albus, intus candidissimus, bicornis erat, uno in latere undecim, in altero novem alia cornicula gestans. Minor fuscus totus, ac eleganti manûs effigie, tuberoso erat pollice,

lice, digitis reliquis parùm incurvatis. Utriusq; substantia mansu lenta, ac gustu fatua, odore iridis Florentinæ, ex mellario primùm petiti. Reperitur plerumq; in alveariis juniorum apum. Usus. 1. pollen ejus haustus steriles fœcundat mulieres. 2. pueris epilepticis exhibitus fert opem. 3. Potui immixtus anginâ laborantes juvat. 4. colicâ passione discruciatissimis præsentissimo est remedio. Ita sentiunt, mellatione qui fruuntur ubere. Adhæc mella & examina copiosa promittit apiariis: Injuriam apum, scilicet exustionem, & florum vitiationem avertere nesciens. De exustione lex est: si, cum apes meæ ad tuas advolâssent, tu eas exusseris, legis Aquiliæ actionem competere, Celsus ait: I. si servus ff. ad legem aquiliam. De florum vitiatione id memoriæ proditum est: Pauper & dives in agro vicino erant junctis hortulis. Habebat dives in horto flores, pauper apes: qvestus est dives, flores suos decerpi ab apibus pauperis; denunciavit, ut transferret: illô non tranferente, flores suos veneno sparsit; apes pauperis omnes perierunt. Reus erat dives damni injuriâ dati. Sed hæc obiter.

CCLXV. Gallium luteum, C.B. Pin. 335. Adv. Lob. fol. 358. Gallion luteum, Thal. p. 54. Gallium primum Tab. lib. 1. fol. 536. Galion, Matth. Bauh. in Matth. fol. 793. Gallion luteum: Cord. in Diosc. 69. Gallium luteum Lob. ic. p. 804. Gallium flore luteo. Cam. hort. p. 63. Galli primum genus Trag. Seb. in Trag. deutsch p. 391. Gallium Fuchf. fol. 196. Lon. deutsch. p. 270. Dod. niederländisch 575. Meyer, Kraut. Tab. Lon. Unser Frauen Wegstroh Fuchf. Wallstroh/ Unser Frauen Bett, oder Wegstroh Matth. Lobkraut und Rahmnygen Saxonibus, Gliedkraut vulgò.

Subacris & siccantis est facultatis. Flos in cancro & malignis

lignis ulceribus perutilis: tulus & impositus sacris ignibus medetur; & sanguinis profluvia sistit. Lac coagulat in eodem maceratus. Fotu articulos juvat luxatos. Odore suavissimo cœlum pluvium & tempestuosum pronunciat. Suvius etiam olet Iride apparente. Ad viarum crepidines saepe.

CCLXVI. Genista tinctoria Germanica C. B. Pin. 395. Ferula Trag. Seb. in Trag. deutsch / 480. Genista tinctoria, vulgaris Clus. hist. lib. 1. fol. 101. Genista tinctoria, Dod. lateinisch fol. 763. Genistella infectoria vulgi, Lob. ic. pag. 89. o. Genistella tinctoria Tab. lib. 3. p. 803. Tinctorius flos, Fuchf. fol. 808. Flos tinctorius Lon. deutsch fol. 138. Coroneola, Cæs. lib. 6. cap. 39. p. 251. Geel: Färbkraut / Lon. Klein Fербсfrimmen. Tab. Geel: Ferberblumen und Heydenschnuck / Seb. in Trag. Gilblum Fuchf. Galeise opilionibus. Genst oder Genster vulgò. Calfacit & siccatur ordine secundo, maximè semen, quod gustu est amaricante. Lineas & laneas vestes tingit flos, hinc & tinctorius nominatur. Bey No: rungen copiosè.

CCLXVII. Gentiana minor sive Cruciata, Lob. ic. p. 188. Madelgeer / Brunf. deutsch fol. 139. Cruciata. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 203. Fuchf. 420. Lon. deutsch fol. 183. Eystett. Gesn. hort. fol. 255. Cruciata, sive Gentiana minor Dod. lateinisch 343. Gentiana cruciata, C. B. Pin. p. 188. Gentiana minor Matth. Bauh. in Matth. fol. 481. Tab. lib. 2. fol. 399. Gentiana minor, cruciata recentiorum Adv. Lob 130. Gentiana III. cruciata, Clus. hist. lib. 3. fol. 313. Gentiana III. Clus. Pann. p. 283. Gentiana media, Cam. hort. p. 65. Cruciata gentianella, Thal. p. 28. Madelgeer Tab. Lon. Madelgeer/und Creuzwurz / Matth. Klein Gentian/ Speerenstich

und Heyl aller Schaden vulgò. Zu Gördenburg hinter dem Schloß / it. in Bießdehlen in locis incultis.

CCLXVIII. *Gentiana palustris angustifolia*. C. B. Pin. 188. *Gentiana minima*, Matth. deutsch fol. 258. *Gentiana* 4. species, Clus. hist. lib. 3. fol. 313. *Gentiana angustifolia* vel quarta, Clus. Pann. 284. *Pneumonanthe* Tab. lib. 2. fol. 466. *Pneumonanthe* Lob. ic. p. 309. *Pneumonanthe Cordi* Lob. Obs. fol. 166. *Calathiana viola autumnalis*, Gesn. hort. 251. *Lungenblumen* Tab. blauer Tarant Nostratibus. Amarore suo siccatur, calfacit & abstergit. Vulneraria est planta, tussientibus & suspiriosis utilis. Cunis imponitur à credulo vulgo contra fascina. In districtu Gerdaviensi bey Bießdehlen in pratis editioribus. It. bey Creutzburg. Herba hæc, ubi florere incipit, fœniscium parant rustici.

CCLXIX. *Geranium batrachioides folio Aconiti* C. B. Pin. 317. *Geranium sive batrachium caruleum*, Tab. ic. pag. 58. *Geranii species tertia*, Gesn. hort. fol. 260. *Geranium Batrachioides caruleum* & *Geranium batrachioides flore albo*, Eyfett. Blaue Storchenschnabel mit Eysenhuts Blättern. Ad margines pratorum bey Robbelbude.

CCLXX. *Geranium batrachioides folio Aconiti*, flore ex caruleo albicante. Joh. Lœf. In Birckensfeld ad fossas. It. bey Holland am Mühlfluß.

CCLXXI. *Geranium columbinum*, *Pes Columbinus* Tab. ic. p. 56. *Geranium folio Malvæ rotundo*, C. B. Pin. 318. *Geranii vulgaris species*, Gesn. hort. fol. 260. *Geranium alterum*, Trag. Seb. in Trag. deutsch 276. Matth. Bauh. in Matth. fol. 621. Fuchf. fol. 205. *Geranium secundum Thal.* p. 44. *Pes columbinus*. Dod. lateinisch fol. 61. *Pes columbinus*, seu alterum *Geranium Dioscoridis*. Lob. ic. 658. Adv. Lob.

Lob. 296. *Geranium Malvaceum* sive *Balsaminum* Cam. hort. p. 66. *Taubensfuß* / *Storckenschnabel* Tab. ic. *Taubensfuß* / *Fuchf.* *Sonnenwirbel* / *Rusticis*, qui armentis sangvinem mingentibus, herbam in lacte ebutyrato coctam, præsentissimo remedio offerunt. Moderatè calefacit & siccatur, cum adstrictione quâdam. Hinc vulneraria est planta, herniosis perutilis, foris & intus usurpata. Bey Königsberg passim in arenosis.

CCLXXII. **Geranium columbinum* erectum tenuius laciniatum flore magno Joh. Lœf. Tieff zerschnittener *Taubensfuß* mit großer Blüth. Radix ruffula, contortula, " longius sub terrâ incedens, nova subinde germina excludens, ac gustu validè adstringens, cauliculos rectâ in altum " mittit cubitales sæpius minores, teretes, egregiè hirsutos, " brachiatos, ac geniculatos; ad singula genicula, tribus glumis rufescentibus firmata, folia visuntur viridia, petiolo " longo nitentia, hirsutie aspera, rotunda, in septem profundas lacinias secta, quæ in summitate plerumq; tripartita: flos nienſe Junio & Julio est purpurascens, siccatus " verò violaceus, ex quinque; foliis sinuatis majusculis constructus, quibus subserviunt alia quina foliola viridia, exili in " apice filamentis prædita: flori succedit acus, in quinque; exilitates tenuissimas exiens, cujus semen oblongum nigricans, " ætatis tractu sursum apicem versus tendit, ac inflectitur, ceu " videre est in geranio Columbino procumbente. Tota " planta insignis est adstrictionis, tormentillæ viribus haud cedens. Hinter Nuednau aufm Berge copiosissimè. Zwischen der Lîep und Sandkrug nach dem Pregel zu copiosè. Herba hæc ubi legebatur, jaculus è serpentum genere sese obtulit trucidandus, in cujus ventriculo delituere pulli quinque; degu-

deglutati avium, quorum unus ferè consumptus. Ipsa avium mater mortua ibidem loci spectabatur, ex gulâ mordicùs à serpente prius fracta.

CCLXXIII. *Geranium columbinum procumbens tenuius, laciniatum flore parvo J. L. Geranium columbinum tenuius laciniatum C. B. Pin. 318. quod in prodr. 2. p. 138. **Tieff zerschnittener Taubenfuß mit kleiner Blüt.** Radix oblonga, „ filamentis instructa luteis, cauliculos edit copiosos, pal- „ mares, virides, hirsutos, ac in terram pronos, queis fo- „ lia rotunda, in quinq; profundas lacinias primum & mox „ in alias dissecta, serviunt, pediculis longis fulta: flores ad „ latera, thyrsulorum fert nanos, cæculos, quadrifolios, quos „ vanescentes rostellæ, seu utriculi rostrati parvi, turgidi ex- „ cipiunt, quorum semen maturitate lasciviens, rotundum, „ fuscum, ac glumâ vestitum, sursum ad rostri apicem refle- „ ctitur, capreolò quasi insidens.

CCLXXIV. Geranium cicutæ folio moschatum & inodorum C. B. Pin. 319. Myrrhida Plinii, Rostrum ciconiæ Lob. ic. 658. Geranium primum Matth. deutsch fol. 621. Lon. deutsch fol. 188. Fuchf. fol. 204. Geranium Trag. Kyber. in Trag. p. 347. Geranium supinum Dod. lateinisch 63. Geranium supinum majus Cord. hist. fol. 108. Geranium myrrhinum, Rostrum ciconiæ Tab. ic. 58. Geranium muscatum, Cam. hort. p. 66. Eystett. Geranium *σκανδικόφυλλον*, Thal. pag. 44. **Storchen Schnabel mit Schierlings Blät- ter.** Bey Lautenmühl passim.

CCLXXV. Geranium cicutæ folio minus & supinum C. B. Pin. 319. Geranium minus & primum. Trag. Seb. in Trag. deutsch 276. Geranium minus, Geranium arvense Tab. p. 57. Myrrhida Plinii, & rostrum ciconiæ inodorum-
vulga-

vulgatum; Lob. ic. 659. Geranium septimum, sive Geranium gruinum, Dod. Lateinisch 64. Geranium Moschatum inodorum, Eystet. Kleiner liegender Storchenschnabel mit Schirlings Blättern/ Acker-Schnabel-Kraut/ Tab. ic. Storch- oder Kranich-Schnabel. Seb. in Trag. Klein Schnabel-Kraut/ und Acker-Schnabel-Kraut vulgò. Bey Königsb. in locis arenosis passim.

CCLXXVI. Geranium Robertianum, Lob. ic. 657. Dod. Lateinisch 62. Cam. hort. p. 66. Geranium Rupertianum Tab. ic. p. 56. Geranium tertium Matth. Bauh. in Matth. 622. Fuchf. 206. Robertiana, & herba Roberti. Lon. Deutsch. 188. Geranium tertium, seu Robertianum Thal. pag. 44. Geranium Robertianum primum C. B. Pin. 319. Gratia Dei, vel Geranion quibusd. Trag. Kyber. in Trag. 108. Rubertiana vulgò, Cæs. lib. 14. c. 28. p. 559. Ruprechtskraut Fuchf. Lon. Gottes Gnad/ Seb. in Trag. S. Ruprechts-Kraut/ Bicht-Kraut/ Rothlauffen Kraut/ und kleine Schöllwurk/ oder klein Schwalben-Kraut vulgò. Bey Königsberg passim.

CCLXXVII. Gladiolus floribus uno versu dispositis major, C. B. Pin. 41. Victoralis rotunda & gladiolus verus, Gesn. hort. fol. 286. & 260. Xiphion-Spatha, seu segetalis gladius. Ruell. fol. 589. Victoralis rotunda, Eystett. Victoralis herba Lon. Germ. Victoralis foemina, seu gladiolus sylvestris, Cord. hist. fol. 97. Gladiolus Germanicus. Tab. lib. 2. fol. 323. Gladiolus nostras, Cam. hort. p. 67. Gladiolus Narbonensis, Lob. ic p. 98. Gladiolus, Dod. Lateinisch fol. 41. Xyphion minus, Clus. hist. lib. 2. fol. 190. Clus. Pann. p. 226. Große Braunschwertel Thal. Runde Siegwurk/ und Allermann Darnisch vulgò. Ad sylvarum declivi

declivi loco sitarum margines bey Königsb. Vivum exemplar inspiciendum.

CCLXXVIII. **Glaux aquatica* folio sub-rotundo. Joh. Lœf. *Glaux maritima* C. B. Pin. 215. *Glaux exigua maritima*. An *Glaux Dioscoridis*. Lob. obs. 227. *Glaux exigua maritima*. Adv. Lob. 178. *Glaux marina minor* Tab. lib. 2. fol. 507. „*Milch Kraut mit rundlechten Blättern*. Radice falcitur „tenerâ, albicante, thyrsulos ramosos, subrectos partim, partim humi jacentes, ac horum prorsum serpentes, excludente, qui inter reptandum villis radicantur exiguis: hos bina „oblonga, ac rotundata subinde & ex adversum excipiunt „folia, capsis rotundis, fimbriatis, ad eorum exortum succedentibus, in quibus minutissimum semen. Calida & humida est, ad revocandum extincti lactis ubertatem nutritibus „salutaris, auctore Diosc. & Aeginetâ. In lacunis hæsit, ac rufescit aquis destituta. Hinter dem Tragheimschen Wall.

CCLXXIX. *Glyzyrrhiza siliquosa*, vel Germanica. C. B. Pin. 352. *Glyzyrrhiza altera*, Matth. Bauh. in Matth. 486. *Glyzyrrhiza vulgaris*, Dod. Lateinisch. f. 341. *Liquiricia*, Brunf. Lateinisch. tom. 3. fol. 123. *Glyzyrrhiza siliquosa*, Lob. ic. p. 86. o. Adv. Lob. fol. 405. Observ. Lob. 529. *Glyzyrrhiza* Fuchf. 192. Cord. hist. fol. 164. Gesn. hort. fol. 260. *Dulcis radix*, Trag. Seb. in Trag. deutsch. 733. *Dulcis radix communis*, Gesn. hort. fol. 257. Süßholz Brunf. Fuchf. Laksariße vulgò. In der hollen Grund.

CCLXXX. *Gnaphalium montanum* flore rotundiore C. B. Pin. 263. *Gnaphalium montanum purpureum* & album Adv. Lob. 202. *Gnaphalium montanum album* & purpureum Tab. lib. 2. fol. 106. 107. *Lagopus secundus*, Trag. Seb. in Trag. deutsch. 263. *Gnaphalium montanum*

num fvaue rubens, Eystett. Pilosella minor Fuchf. fol. 606. Pilosella minor Dodonæi. Thal. p. 83. Berg Rühr-Kraut mit runder Blüth. Nasen-Pfötlein/ Seb. in Trag. Weiß und braun Engelblümlein Tab. Neuß-Dehrlein Fuchf. Rühr-Kraut vulgò. In collibus herbosis & salebrosis ubertim provenit bey Königsb.

CCLXXXI. Gnaphalium vulgare majus C. B. Pin. 263. Impia Plinii Gefn. hort. fol. 262. Gnaphalium vulgare, Matth. Bauh. in Matth. fol. 625. Gnaphalium vulgare, Filago, centunculus, Adv. Lob. 201. Lob. ic. p. 480. Gnaphalium vulgare minus, Thal. p. 55. Gnaphalium II. vulgare Tab. lib. 2. fol. 105. Filago, sive impia, Dod. Lateinisch 66. Gnaphalium. Fuchf. fol. 222. Heliochrysos sylvestris, Trag. Seb. in Trag. 262. Herba impia Cæf. lib. 12. c. 15. p. 485. Tomentum Lon. Deutsch f. 210. Tomentum seu centunculus, Cord. Diosc. f. 58. Groß gemein Rühr-Kraut/ Matth. Tab. Fuchf. In locis apricis & arenosis passim bey Königsb.

CCLXXXII. Gnaphalium majus angusto oblongo folio alterum. C. B. Pin. 263. Gnaphalium Anglicum, vel Belgicum folio longiore Lob. ic. fol. 482. Gnaphalium Anglicum folio longiore, perperam Leontopodium alterum Matth. Adv. Lob. 202. Leontopodium alterum vulgare, Cam. hort. p. 86. Filago major quibusdam Groß Rühr-Kraut mit schmalen länglichten Blättern. In salebrosis passim bey Königsb.

CCLXXXIII. Gnaphalium medium. C. B. Pin. 263. Tab. ic. p. 390. Filago minor, Lob. ic. p. 481. Dod. Lateinisch fol. 66. Klein Rühr-Kraut Tab. ic. In agris incultis præsertim editioribus copiosè.

CCLXXXIV. Gramen Parnassi albo simplici flore, C. B. Pin. 309. Hepatica alba, Cord. hist. fol. 152. Gramen

Parnassum Dod. Lateinisch. 564. Gramen Parnassi, Lob. ic. p. 803. Eystett. Gramen hederaceum, Flos hepaticus, Tab. ic. p. 214. Gramen Parnassi, hederaceum recentiorum. Adv. Lob. 263. Obs. Lob. 330. Hepatica flos Tab. 1. **Weiß einfach Parnasser Gras.** Gramen Parnassi, & Enneadynamis Polonorum, Gesn. hort. 261. **Parnasser Gras oder Leber-Blumlein** Tab. **Weisse Leber-Blum** Nostratibus. In riguis & humidis pratis hinter Fischhausen nach Lochstädt zu copiosè.

CCLXXXV. * Gramen mannæ esculentum Prutenicum. Joh. Lœsel. Schwaden Nostratibus. Diversum, longè est à gramine mannæ esculento. Lob. p. 24. In iconibus, quod Germanis quoq; Schwaden nuncupatur, & inter gramina ischæma numeratur. Nostrum verò gramen est paniculatum pratense, hoc, ubi rorescit, pingviusculum reddit liqvore eumq; dulcissimum mannæ instar; dulcorum hunc facillè advertit is, qui roratum pitissando attingit semen. Manna hæc esculenta ut fiat, ita laboratur: 1. Escalæ semen in pratis incerniculo ex fetis eqvinis, horsum vorsum ducto, colligitur sub lucano tempore, & quidem mense Julio. 2. apricatione sub dio siccatur. 3. siccatum infustitundinâ, supposito stramine, bacillo ligneo modestè tunditur, & à glumis extimis laboriosè admodum liberatur. 4. Furfur & crassius purgamentum flatu dejicitur, seu ventillando tollitur. 5. De integro in eodem fustuario accuratius tunditur, subjectis vel calendulæ floribus siccis, vel pomi vel coryli foliis, quibus nitor & color tunso accedit semini. 6. toties ac toties in mortario fustigatum semen iterum atque iterum ab apludâ, & minutissimâ paleâ, nec non foliorum reliquiis, ventilatur, purgatur, ac synceritate esui aptum redditur. In pratis & locis udis copiosè. Item auff
den

den Wiesen bey dem Nasen Garten bey Königsb. Semen, quod deglubitum est, nostrates à Polonis plerumq; parvo emunt. Ustilagine petitur nonnunquam. Furfures ejus equos juvant vermibus infestatos. Aurigæ horum loco secalis furfures porrigunt, certissimo adversus vermes præsidio, & horis demum aliquot elapsis equos potum agunt.

CCLXXXVI. Gramen officinarum. Joh. Lœfel. Gramen caninum arvense, sive gramen Dioscoridis. C. B. Pin. p. 1. Gramen canarium, Medicatum officinarum. Adv. Lob. fol. 2. Gramen caninum I. Tab. lib. 1. fol. 637. Gramen Ruell. fol. 593. Dod. Lateinisch. fol. 558. Cord. in Diosc. f. 63. Graminis primi Dioscoridis species major, Thal. p. 50. Gramen Dioscoridis Gesn. hort. f. 260. Hundsgras Tab. Dvecken/ Dveck Gras/ und Gras/ Cord. in Diosc. Inter segetes passim: Spica variat: nonnunquam densior & compactior est, aliquando sparsa, aristis, petiolis longis innitentibus, velut in avenâ. Floret elegantissime secalis instar.

Moderatè refrigerat, siccatur & abstergit. Jecoris & renum obstructions aperit, prodestq; regio morbo correptis, & nephriticis. Potissima vis in radice.

CCLXXXVII. Gramen caninum supinum minus. C. B. Pin. 1. Gramen caninum supinum secundum, Tab. lib. 2. fol. 637. Gramen caninum supinum Lob. ic. p. 21. Klein liegend Hundsgras Tab. Passim bey Königsb.

CCLXXXVIII. Gramen geniculatum caninum maritimum Lob. ic. p. 21. Gramen caninum maritimum spicatum. C. B. Pin. 1. Gramen caninum tertium, Tab. lib. 1. fol. 637. Geährtes Hund- und See-Gras. Am Curischen Hause in locis arenosis.

CCLXXXIX. Gramen dactylon folio latiore, C. B. Pin.

Pin. p. 8. Ischæmon Plinii. Clus. hist. lib. 6. fol. 217. Ischæmon I. Tab. lib. 1. fol. 658. Sangvinaria. Comitibus de Nevenare, seu crus Galli. Trag. Kyb. in Trag. p. 714. Ischæmon vulgare Lob. ic. p. 24. Adv. Lob. fol. 4. Fünff Finger-Gras mit breiten Blättern. Eine Gras-Art kräftig Blut zu stillen/ Gesn. Cat. p. 46. Hahnen-Bein/ Kyber. in Trag. Blut-Gras Tab. Subdulce est: siccantis & adstringentis naturæ. Semen sangvinem sistit & foriolos juvat. Hinter dem fordersten Krüge in der Sackau. it. am Wege form am Krüge. it. Zwischen Marscheinen und Forcken Krüge am Wege.

CCXC. *Gramen montanum odoratum spicatum. Joh. Lœf. Wohlriechend spitziges Kornähriges Berg-Gras. „ Radix longissimis capillamentis albicans, & in cespites abi- „ens, proximè terram numerosa & exilia alit folia, spargit- „que culmos paucis geniculis, erectos, foliorum volvis, ex „cæsis-virescentibus, conclusos, in summitate spicam ex pan- iculis curtis habentes. Hinter Frauenburg.

CCXCI. Gramen arvense odoratum spicatum. Joh. Lœf. Wohlriechend Kornähricht Acker-Gras. Radice nititur, tenuissimis & albicantibus filamentis, quæ in altum protrudit culmos geniculatos, in utriculis foliorum viridium & angustorum, maximam partem delitescens, in fastigio secalis instar spicatos, læves: Odoratissimum est gramen, bonâ fragrantia vernali tempore, gramini Mariæ haud cedens. In incultis passim bey Königsberg.

CCXCII. *Gramen arvense spicâ compactâ divulsâ. Joh. Lœf. Acker-Gras mit dichten von einander gezogenen Aehren/ bey Königsberg.

CCXCIII. *Gramen cristatum radiculis nigricantibus.

bus. Joh. Lœf. Sadem-blättriges subtiles Berg-Gras mit sehr kleinen schwarzen Wurzelchen/ hinter Frauenburg.

CCXCIV. Gramen montanum paniculâ spadiceâ delicatiore 12. in Prodr. C. B. p. 6. lieblich Castanien-bräunes Gras. Radix alba, brevis, cirris numerosis, veluti è cespite culmos exiles, teretes, geniculatos, uno alteroq; folio vestitos, exire patitur, in fastigio paniculam amœnulè formatam spadicei coloris efferentes. Foliis adhæc proximè terram curtis est, ac pusillis. In arenosis.

CCXCV. Gramen pratense paniculatum medium. C. B. Pin. p. 2. Mittel-Strauß-tragendes Wiesen-Gras. Gramen minus, Tab. ic. p. 201. Lob. ic. p. 1. Gramen pratense secundum, Dod. Lateinisch. fol. 560. Klein gemein Gras. Tab. ic. passim in pratis & udis.

CCXCVI. *Gramen paniculatum molle paniculâ dilutè cæruleâ. Joh. Lœf. Weiches Gras mit einem licht-blauen Strauß. Bey Königsberg.

CCXCVII. *Gramen Mariæ Borussorum. Joh. Lœf. Gramen paniculatum odoratum 13. in Prodr. p. 6. C. B. Marien-Gras/ Margen-Gras Nostratibus.

Radiculis provenit candidis, geniculatis: foliis angustis, "longioribus, acuminatis, odoratis: paniculam in culmi sum-
mitate gestat exiguam, leviter sparsam, tortuosis pedicellis "
insistentem, ex virore subflavescentem, ac splendentem: "
Gramen hoc in fasciculos manuales colligitur sæpè â pueris, "
& ante templi fores diebus festis distrahitur. Auf den Wie-
sen hinter dem Bretter-Krüge.

CCXCVIII. Gramen segetum altissimâ paniculâ sparsâ. C. B. Pin. 3. Gramen segetale paniculatum Tab. lib.

1. 638. Gramen segetum paniculâ speciosâ latiore, Lob. ic. p. 2. Ackerstrauch-Gras Tab. unter dem Getreidig.

CCXCIX. Gramen segetum paniculâ arundinaceâ. C. B. Pin. p. 3. Gramen pratense tertium Dod. Lateinisch. 561. Gramen harundinaceum arvense Tab. lib. 1. fol. 648. Gramen loliaceum octavum. Trag. Seb. in Trag. deutsch 531. Agrorum venti spica, & gramen agrorum, latiore, arundinaceâ, comosâ paniculâ, Lob. ic. Ackerwind-Gras. Tab. Ackerwindhalm/ der Hirsen nicht ungleich/ Rohr-Gras vulgò. In pratis passim, non rarò & inter segetes.

CCC. Gramen leporinum. Gramen tremulum Tab. ic. 231. Gramen tremulum majus C. B. Pin. p. 2. Graminis loliacei decimum genus. Thal. p. 52. Phalaris pratensis minor Lob. ic. p. 44. Adv. Lob. fol. 16. Lolium decimum, & Ægilops Plinii Trag. Seb. in Trag. deutsch. 532. Ægilops, Lon. deutsch fol. 287. Gesn. hort. 245. Amourettes tremblantes. Clus. hist. lib. 6. fol. 218. Zitterndes Haasen-Gras/ Tab. Haasen-Brödt und Hasen-Dehrlein Lon. Zitter-Gras und unser lieben Frauen Flachs vulgò. In monte Apollinis, in Duednau. Item im Penartschen Walde.

CCCI. *Gramen Caryophyllum polycarpon fructu triangulo. Joh. Lœf. An gramen caryophyllum montanum spicâ variâ? 23. in Prodr. C. B. p. 9. Fruchtreiches Nâglein Gras mit dreykantichem Saamen.

„ Radix multis filamentis nigricantibus, folia excludit angusta, spithamam sæpè longa, viridia, graminis caryophyllæ foliis Tab. lib. 1. fol. 641. assimilia, quæ inter culmi aliquot „tenuēs, virescentes, foliis destituti assurgunt, geminam in „summitate spicam ex ruffulâ volvâ exeuntem, ostentantes, „quarum una divulsa & polycarpus est, fructu triangulo, gluma-

glumâ subrubenti cincto, altera compacta, & longitudine in acutiem abiens. Bey Domnau in incultis.

CCCII. Gramen hirsutum nemorosum Lob. ic. pag. 16. Gramen sylvaticum pilosum, Tab. ic. p. 227. Gramen hirsutum latifolium majus C. B. Pin. p. 7. Breit Wald-Gras mit härchten Blättern/ haarechtig Wald- oder Busch-Gras/ Tab. Wald-Stachel-Gras quibusdam. Hirsutie est copiosissimâ, quam nonnunquam ex parte deperditam gerit.

CCCIII. Gramen thyphoides maximum spicâ longissimâ, 25. in Prodr. C. B. pag. 10. Großes langes Rölblein- oder Fuchsschwanz-Gras mit einer zwieblechten Wurzel. Radici bulbosæ geniculatæ, fibris exiguis, & numerosis instructæ, culmus insitit rectus, bicubitalis, spicâ superbiens, cujus longitudini mensus pollice ac indice explicato, *Δίχας* Græcis, sæpius exæqvatur. Spica modò longior, modò brevior. In arvis sæpè reperitur bey Königsberg.

CCCIV. Gramen thyphoides asperum primum. C. B. Pin. p. 4. Gramen typhinum primum Tab. ic. 217. Liesch-Gras Tab. Scharff Rölblein-Gras. In monte Apollinis zu Duednau.

CCCV. Gramen thyphoides spicâ angustiore C. B. Pin. p. 4. Gramen aloperuroides minus alterum. Lob. ic. p. 9. Gramen alopecurinum secundum Tab. lib. I. fol. 641. Rölblein-Gras/ Fuchsschwanz-Gras Tab. hinter der Haberbergischen Kirchen ad margines pratorum. It. bey Schwamis im Gebrüch.

CCCVI. Gramen thyphoides culmo reclinato. C. B. Pin. p. 4. Gramen alopecurinum tertium. Tab. lib. I. fol. 641. Rölblein Gras mit zurücktretendem Helm. Gramen alopecuroides minus. Lob. ic. p. 9. Fuchsschwanz-Gras das dritte Tab. In arvis passim,

CCCVII. Gramen pratense tomentosum paniculâ sparsâ. C. B. Pin. p. 4. Baumwolltragendes Binsen-Gras. Linagrostis, Tab. lib. 1. fol. 665. Gramen tomentarium. Linum pratense, Tab. ic. p. 230. Gramen Eriophoron, Dod. Lateinisch. fol. 562. Gnaphalion, Trag. Kyber. in Trag. pag. 683. Linum pratense, Lon. deutsch fol. 210. Juncus bombycinus, Tomentum & linum pratense Cordi, & Gnaphalium Hieronymi Bockii Lob. ic. p. 87. Juncus bombycinus. Adv. Lob. fol. 44. Gramen junceum lanigerum, Thal. 55. Flachs-Gras Tab. Matten-Flachs Kyb. in Trag. Matten/ und Wiesen-Wollen/ Lon. Wiesen-Flachs und Matten-Woll/ vulgò. In pratis humectis, & vallibus uliginosis passim.

CCCVIII. Gramen junceum spicatum seu trigloch, C. B. Pin. p. 6. Binsen-Gras mit einer langen Ahr. Gramen junceum spicatum, Tab. ic. p. 224. Carex minor, Lon. deutsch fol. 209. Gramen marinum spicatum alterum, Lob. ic. 17. Gramen marinum spicatum alterum majus. Cam. hort. 69. Gramen mixtum ex junco & gramine Thal. p. 55. Gramen junceum 4. Tab. Geährt Binß-Gras. Tab. ic. klein Ried-Gras Trag. Kyber in Trag. Binszen-Gras vulgò. In pratis humectis circa Regiomontum passim. it. Bey der Neuhauschen Mühle am Berge.

CCCIX. Gramen junceum folio articulato sylvaticum. C. B. Pin. p. 5. Gramen junceum sylvaticum Tab. ic. p. 223. Wald-Binszen-Gras/ und Wald Wies-Gras mit zergliederten Blättern. In der hollen Grund in uliginosis. It. Beym Zoll-Haus am Wall.

CCCX. *Gramen junceum aqvaticum semine ramoso. Joh. Lœf. Radix est geniculata, longiuscula, fibris instructa suis, foris subflava, intus albicans, ex quâ sub terrâ

terrâ longius incedente, & nova gramina excludente, cauli-
 culus exurgit, paucis foliis junceis comitatus, in summitate
 nonnihil brachiatus, cujus ramusculis fructus insistit race-
 mosus. Fortè illud est, quod Bauhino fuerat missum à D.
 Fleissero. *Wasser-Binsen-Gras mit traubichstem Saamen.*
Hinter Osterrod im Bruch.

CCCXI. *Gramen junceum semine acuminato. Joh.
 Lœf. *Binsen-Gras mit schwarzgespitztem Saamen.* Radix
 è villis longiusculis structa, thyrsulos promit uncias novem
 altos, læves ac virides, in fastigio genicula habentes, è qui-
 bus novi & exiles coliculi, foliolis acutis rubicundisq; fulti,
 enascuntur, semen in exortu geminis pallidisq; paleis in-
 stens, mox aliis horridè nigris vestitum, oblongum, splen-
 dens, & in acutiem tendens, sustinentes. Remotis paleis
 semen subalbidum est, escam gratissimam volucrum generi,
 ut existimo, conferens. Foliis est tenellulis, copiosis, quin-
 que vel sex unciarum longitudine, quæ ad radicem con-
 gressa bulbum quasi quendam concursu emetiuntur suo.
 Flos ei purpureus mense Junio. In den Wäldern am
 Wege.

CCCXII. Gramen junceum sextum Tab. lib. 1. fol.
 660. Gramen nemorosum caliculis paleaceis. C. B. Pin.
 p. 7. Holosteum Matth. Lob. ic. p. 18. Gramen epigonato-
 cavlon, Thal. p. 55. Holostium 1. Matth. Bauh. in Matth. f.
 687. *Krotten-Gras* Tab. ic. *Poggen-Gras* quibusdam.
In der hollen Grund passim.

CCCXIII. Gramen Cyperoides palustre majus spicâ
 divisâ. C. B. Pin. 6. Gramen Cyperoides parvum aqua-
 ticum, Lob. ic. p. 19. Gramen cyperinum palustre minus.
 Tab. ic. p. 220. *Groß Wasser Ziper-Gras mit zertheilten*
braun.

braun-gelben Aehren. Klein wild Galgen-Gras Quibusdam. Variat magnitudine, cum foliis sit modò latioribus, modò majoribus, modò angustioribus, modò brevioribus. In Prætis nach dem Bretter-Krüge.

CCCXIV. *Gramen Cyperoides palustre spicâ pendulâ. Joh. Lœf. Wasser-Cyper-Gras mit hangenden, schwarz-grünen Aehren. Radix ex crassulis lignosis & rotundis villis maximam partem constituta, ac mirè capillata, caules in altum egerit sesquicubitales, acutos, triangulos, quibus ad internodia spicæ tres, quatuor vel quinque, quarum binæ ultimæ sæpiusculè steriles, è capsulis oblongis, tenellis, numerosissimis, viridibus, paleis interspersis nigris, constitutæ, ac sesquiunciam longæ, alternatim sibi succedentes, assistunt, folio circa exortum suffultæ longiore & acutiore. Foliis reliquis est arundinaceis sesquicubitalibus peracutis, è radice enascentibus, & caulem fotu quodam amplexantibus. Notabile est, hujus graminis radici, nonnunc, quam & cauliculo, adnasci Mense Julio corpuscula quædam oblonga, exilia, albicantia, formicarum ovis assimilata, quæ aperta exiguissimos intrà conclusos ostendunt vermiculos. Exsiccata ova rubrum acquirunt colorem. Fortè ex istis vermiculis muscæ tandem generantur, quemadmodum id observavi in Ranunculo longifolio palustri majore. C. B. auff den Wiesen nach dem Bretter-Krug. It. bey Sunnicken.

CCCXV. *Gramen Cyperoides minus repens spicâ divisâ. Joh. Lœf. Klein kriechend Cyper-Gras mit zertheilten braun-gelben Aehren. Hinter Frauenburg in montosis. Radix fusca internodiis distincta suis, summâ tellure reptando incedit, tenellulis aliis radiculis, ad singula genicula ortis, & capillaceâ quasi lanugine instructis, sustentata:

ex geniculis passim cauliculi oriuntur virides, triquetri, unciarum sex longitudine, quæ spicæ aliquot perbreves (formæ affimiles spicis, qui in gramine cyperoidæ palustri majori C. B. advertuntur) spadiceo-lutei coloris, cui & quantillum viridis admixtum, alternatim dispositæ, quarum prima foliolum subiectum habet, adhærescunt: foliis est tenuissimis & acutissimis.

CCCXVI. *Gramen Cyperoides spicis curtis divulgis Joh. Lœf. Cyper-Gras mit kurzen abgesonderten Aehren. Radix villosa & egregiè capillata thyrsulos semicubitales, majores sæpe, sæpè minores, acutos ac triquetros, exire patitur, quorum columnina quinque, sex vel plures exornant spicæ curtx, virides, ex tenellis, rubicundis, & in acutiem abeuntibus granulis constructæ, alternatim cauli affirmatæ. Folia sunt tenuia & acuta. In locis udis passim.

CCCXVII. Gramen Cyperoides spicâ variante. Joh. Lœf. Klein Cyper-Gras mit zweyerley Aehren. Gramen hoc ex teneris radicum fibris exsurgens, thyrsos edit triangulos, semicubitales, & longius evagantes, quorum fastigiis tres vel quatuor pumiles spicæ, ex viridibus & rotundatis aliquot capsis, paleisq; ad nigrorem tendentibus intermistis, ornamento sunt, perexiguo à se dissidentes spatio, & in exorto foliolo tenui & acuto firmatæ. Præter has spicas alia, diversa prorsus ab illis, ac in extimâ graminis parte velut in speculâ hærens, visitur, quæ tenuis, erecta & squamosa est, coloris spadiceo-lutei. Passim.

CCCXVIII. Gramen exile Cyperoides spicis nigris. Joh. Lœfel. Klein Cyper-Gras mit schwarzen Aehren. In pratis nach dem Bretter-Krüge zu. Plantula hæc ferè dodrantalis radice est fibrosâ, lignosâ tamen ac nigricante: ex hac foliola exsurgunt graminea, & cauliculi trique-

tri subasperi, quorum summis insident spicæ plerumq; tres, alternatim sibi succedentes, nigricantis coloris. Flosculos habet minutissimos, subluteos.

CCCXIX. Gramen exile hirsutum Cyperoides. Lob. ic. 15. Gramen hirsutum capitulis Psyllii. C. B. Pin. 7. Gramen cyperinum pilosum Tab. lib. 1. fol. 656. Cyperella Cordi & Pseudocyperi species pumila Gesn. hort. 256. *Haarechtig Cyper-Gras*. Tab. Primo vere passim prodit in incultis.

CCCXX. Gramen Cyperoides hirsutum repens spicis minoribus minusq; compactis Joh. Lœf. *Haarechtig kriechend Cyper-Gras mit weichen Ähren*. In incultis hinter der Neuen Kirch.

CCCXXI. Gramen arundinaceum enode majus montanum. C. B. Pin. 7. *Groß Berg-Rohr-Gras ohne Knoten*. Gramen harundinaceum montanum Tab. lib. 1. fol. 666. Juncus *λυχνίδειμος* major, Thal. p. 60. Scirpi primum genus, Trag. Seb. in Trag. deutsch. fol. 542. *Winden-Halm/ Bald-Rohr oder Schmelen* / Seb. in Trag. *Berggriedt* / Tab. *Berg-Rohr* quibusdam. *Grosse Schmelen* Nostratibus, qui scopas seu excutias (die Rehr-Bürsten/ quibus pulveres ac paleæ excutiantur) ex eodem parant, frumentum ventilaturi. Gramen hoc proverbio: nodum in scirpo quærere, celebre quidem est, nodos tamen proximè radicem obtinet. Nassæ quoq; & fiscellæ ex eodem conficiuntur. Dicitur & Motel nonnullis, unde Polonis Miotta ein Besem. Culmiejus viri proceritatem attingunt. *Hinter Mohrungen*. Im Mohrungschen Walde copiose. Item bey Lauten-Mühle. *Ex scirpo olim effigies fiebant, quæ per Virgines Vestales annis singulis jaciebantur in Tyberim.* Ovid. Fastorum lib. V. v. 621.

Tunc quoq; priscorum Virgo simulacra Virorum

Mittere roboreo scirpea ponte solet.

Apud Asc. Pedianum in Orat. Cic. pro C. Cornelio, legimus, simulachra effigiesq; hominum è sæno fuisse facta, quibus objectis ad spectaculum præbendum, tauri irritabantur. Existimo, sæni vocabulo scirpum hic esse exaudiendum aut stramen, ein Stroh-Mänchen. Wie bey uns in der Bähren-Neze.

CCCXXII. Gramen arundinaceum enode minus sylvaticum, C. B. Pin. 7. Juncus λυχάνθεμος tenuis major, Thal. p. 60. Scirpi alterum genus. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 542. Kleine Schmel. Klein Waldrohr: Gras ohne Knoten. Corbulæ ac pileoli elegantissimi ex hoc scirpo parantur. Radiculis est albicantibus. Passim.

CCCXXIII. Gramen arundinaceum, paniculâ molli spadiceâ majus. C. B. Pin. p. 6. Graminis loliacei octavi alia species. Thal. p. 51. Gramen tomentosum & acerosum. Calamogrostis quorundam, & vulgi gramen plumosum, Lob. ic. p. 6. Groß Röhr-Gras mit seinem weichen braun-rothen Strauß. Quibusd. Schmeel/ed falsch. Bey dem Dorff Wittenberg.

CCCXXIV. Gramen palustre paniculatum altissimum. C. B. Pin. 3. Straußtragendes sehr hohes Wasser-Niedgras. Gramen aquaticum arundinaceum paniculatum, Tab. lib. 1. fol. 653. In fossis bey dem Bretter Krüge.

CCCXXV. *Gramen arundinaceum foliis acutissimis paniculâ multiplici, Cyperi facie, Joh. Læf. Vielsträußiges scharffes Cyperähriges Röhr-Gras. In locis udis.

CCCXXVI. *Gramen arundinaceum paniceum divisâ paniculâ. Joh. Læf. Radice est lignosâ, fibrosâ & albicante, "ex quâ culmi tricubitales, rotundi, concavi, ac geniculati,"
explan-

,explantantur, folia acuta & lata veluti per tubulos transe-
 ,unt, ac in summo paniculam substavescentem, eamq; di-
 ,visam sustinentes. Ubi defloruit, semina fert exigua, fol-
 ,liculis inclusa suis, oblonga, splendentia, spadicei ferè co-
 ,loris, & quidem mense Julio. Am Thamm beyhm Bret-
 ter Krüge zu.

CCCXXVII. Gramen paniceum spicâ simplici. Ely-
 magrostis. C. B. Pin. 8. Hirssegras mit schlechten Aehren.
 Panici effigie gramen simplici spicâ, Lob. ic. p. 13. Gra-
 men paniceum 1. Tab. lib. 1. fol. 663. Panicastrella, Cæs.
 Lib. 4. c. 58. p. 185. Lolium 6. & Miliaria herba Plinii, Trag.
 Seb. in Trag. deutsch. 531. Senich-Gras das 1. Tab. Se-
 men avibus grata esca. In der hollen Grund. It. beyhm
 Krüge in der Sarkau.

CCCXXVIII. Gramen paniceum spicâ aristis longis
 armatâ. C. B. Pin. p. 8. Hirssegras mit langspitzigen Aeh-
 ren. Gramen paniceum secundum Tab. lib. 1. fol. 663.
 Panici effigie gramen aristis circumvallatum. Lob. ic. p. 14.
 Senichgras das 2. Tab. In der hollen Grund. It. circa
 vias nach dem alten Hammer zu. Nudum sæpè aristis con-
 spicitur, ætatis tractu iis deciduis factis, & tum facile pro
 panico herbariorum sylvestri Lob. agnoscitur.

CCCXXIX. Gramen marinum spicâ secalinâ, Joh.
 Loef. Meergras mit Korn-Aehren. Gramen hoc culmo ac
 radice secali assimilatur, spicâ tamen est grandiore, in quâ
 exusta visuntur granula oblonga, nigricantia. Circa littus
 maris bey S. Albrecht. It. Bey Sarkau copiosè.

CCCXXX. Gramen latifolium spicâ triticeâ di-
 vulsâ, 54. in Prodr. C. B. Pin. 18. Breitblätterig Gras
 mit zertheilten Weizen-Ahren. Sparsum,

CCCXXXI.

CCCXXXI. Gramen loliaceum spicâ longiore. C. B. Pin. p. 9. Lolium & triticum temulentum, Lob. ic. p. 35. Frumentum fatuum Lon. deutsch fol. 287. Lolium, Ruell. fol. 325. Cord. in Diosf. fol. 43. Tab. lib. 1. fol. 675. Matth. deutsch fol. 127. Casl. lib. 4. c. 49. fol. 179. Dod. Lateinisch. fol. 538. Lülch oder Dort. Tab. Taubkorn Lon. Unkraut/ Dorten Matth. Drespe Saxonibus & Nostratibus. Zwalch/ Weizen/ Solch und Durt quibusd. Inter segetes passim.

CCCXXXII. Gramen montanum avenaceum spicatum. C. B. Pin. p. 10. Gedhrtes Haber Berg-Grass. Gramen sylvaticum secundum, Tab. lib. 1. fol. 661. Gramen montanum spicatum. Clus. hist. lib. 6. fol. 219. Wald-Grass das ander/ Tab. In monte Apollinis zu Duednau. It. im Penartschen Walde.

CCCXXXIII. Glossularia multiplici acino sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes officinarum. C. B. Pin. 455. Ribes Arabum Lob. ic. p. 202. o. Ribes rubra Adv. Lob. f. 445. Ribes Fuchsl. fol. 663. Tab. lib. 3. fol. 784. Lon. deutsch fol. 63. Ribes vulgaris Matth. deutsch 54. Ribesium fructu rubro, Eystett. Ribes hortense, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 708. Ceariothus levis, Gefh. hort. fol. 252. Ribes vulgò Casl. lib. 3. c. 12. pag. 99. S. Johannis Beerlein Fuchs. S. Johannis Traublein Tab. Matth. Seb. in Trag. Zahme S. Johannis Traublein. Lon. In der Hollen-Grund in umbrosis, item auff dem Lenzkenberg hinter Brandenburg.

CCCXXXIV. Grossularia non spinosa fructu nigro C. B. Pin. fol. 455. Ribes vulgaris nigro fructu Clus. hist. lib. 1. fol. 120. Ribes sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 780. Ribes sylvestris Thal. p. 96. Ribesium fructu nigro, Dod. Niederländisch. fol. 1172. Ribes nigra, Adv. Lob. fol. 445. Lob. ic. p. 202. o. Tab. lib. 3. fol. 784. Ribes baccis nigris

Cam. hort. p. 141. Amomum falsum & Pseudoamomum, Gefn. Hort. fol. 246. Ribes fructu nigro, Eystett. Schwarze Johannis Träublein. Tab. Gicht-Beeren und Bocks-Beeren Nostratibus. Zu Schwanis am Mühl-Fluß copiosè. It. in der Hollen-Grund.

CCCXXXV. Grossularia sylvestris rubra. C. B. Pin. 455. Ribes sylv. Cam. hort. p. 141. Ribes sylv. Matth. Bauh. in Matth. fol. 151. Lon. deutsch. fol. 63. Ceanothi levis genus sylv. Gefn. hort. fol. 252. Wilde S. Johannis Träublein Lon. Helvetiis Reoz-Beer. Wilde Corinthen Nostratibus. Hinter Latten-Walde in montibus passim. Foliis provenit oxyacanthæ ferè, pronâ parte hirsutis, supinâ lævibus, solidis & crassiusculis: Quatuor vel quinq; baccæ ut plurimum uni pediculo assistunt, acinis duobus, vel tribus instructæ. Degustatæ baccæ dulci sunt sapore, ac viscidam humiditatem obtinent. Tussi mederi creduntur.

CCCXXXVI. Hedera helix, Matth. deutsch fol. 245. Brunf. Lateinisch tom. 2. fol. 7. & 8. Fuchf. fol. 423. Lon. deutsch fol. 235. Cæs. lib. 3. c. 5. p. 93. Tab. lib. 2. fol. 567. Dod. Lateinisch fol. 413. Cam. hort. p. 71. Helix sive provoluta sterilis Hedera Lob. ic. p. 614. Hedera species tertia, Helix vocata Thal. p. 57. Hedera arborea sylvestre genus. Gefn. hort. 261. Hedera major sterilis. C. B. Pin. p. 305. Kleiner Epheu Matth. Tab. Kleiner Bald-Epheu / Lon. Baum-Epheu / Brunf. deutsch. Nloss / Nostratibus. Siccatur, calefacit & nonnihil adstringit. Succum in affectibus oculorum vulgus commendat. Im Morungschen Walde / hinter dem Mohrung lacus est, copiosè in umbrosis. It. im Bruchwalde bey Brandenburg.

CCCXXXVII. Hedera terrestris, Brunf. tom. 1. fol. 167. Tab. lib. 2. fol. 568. Cæs. lib. 2. cap. 36. p. 452. Dod. Lateinisch.

teinitſch fol. 394. Matth. Bauh. in Matth. fol. 467. Hedera terreſtris herbariis communiter appellata, Thal. 57. Hedera terreſtris vulgaris, C. B. Pin. p. 306. Humilis hedera, Hederula, ſive Chamæciſſus Adv. Lob. 268. Humilis Hedera, Chamæciſſus, corona terræ, terreſtris hedera, Lob. ic. 613. ſive Chamæciſſos, ſeu hedera terreſtris, Trag. Kyb. in Trag. 799. Chamæciſſus vulgaris Hort. Cam. p. 38. Chamæciſſus Fuchſ. fol. 876. Chamælema, Cord. hiſt. fol. 160. Gündelrâb/ Tab. Fuchſ. Gündelrâb/ oder Erd-Epheu. Matth. Gündreb oder Gündelreb/ Kyb. in Trag. Udram Noſtratibus. Paſſim in arenolis bey Königsb. Floret Menſe Majo. Foliis aliqv. tubercula adnaſcuntur. Hedera terreſtris cum pauxillo vini contuſa, ſucco eqvorum oculis manè & vesp̄eri immiſſo: albuginem certò tollit, affirmantibus hyppocamis.

CCCXXXVIII. Helenium vulgare C. B. Pin. p. 176. Helenium Matth. Bauh. in Matth. fol. 72. Cord. in Dioſc. fol. 10. Geſn. hort. fol. 261. Eyſtett. Tab. lib. 2. fol. 264. Dod. Lateiniſch f. 344. Cam. hort. p. 71. Helenion, Adv. Lob. fol. 246. Helenium & Inula, Angvillaræ Panax chironium, Lob. ic. 574. Enula campana, Brunf. tom. 3. fol. 100. Enula, Lon. deutſch fol. 161. Cæſ. lib. 12. c. 34. p. 499. Elenion Trag. Seb. in Trag. deutſch fol. 137. Allantwurz Tab. Allant oder Allant-Kraut Lon. Allantwurz/ Sebiz in Trag. Calefacit, aperit, attenuat. Fern. 5. M. m. Extra hortos ad ſepes zu Neuhaufen.

CCCXXXIX. Helleborine latifolia montana C. B. Pin. p. 186. Breit-blättrige Berg-Nieſewurz mit brauner Blüth. Helleborine, ſive Epipactis recentiorum Lob. ic. 312. Elleborine recentiorum ſecunda, Cluſ. hiſt. lib. 2. fol. 272. Helleborine, Dod. Lateiniſch fol. 384. Helleborine 1. Tab. lib. 2. fol. 395. Satyrium octavum Trag. Seb. in Trag.

Trag. deutsch fol. 619. *Epipactis latifolia*, Eystett. *Damasonium calliphyllon*, Cord. hist. fol. 151. *Sigillum S. Mariæ* vulgò. Cæs. lib. 10. cap. 49. fol. 431. *Wilde Nieswurß* Tab. *Folia gustu sunt amaro & ingrato.* Hinter der Sackau im Gebirg.

CCCXL. *Helleborine latifolia montana flore albo.* Joh. Lœf. *Wilde breitblätterige weiße Berg-Niese-Wurß.* *Foliis cum priori convenit.* Hinter Osterod am Berge.

CCCXLI. *Helleborine montana angustifolia purpurascens.* C. B. Pin. 187. *Schmalblätterige Purpurbraune Berg Niese-Wurß.* *Helleborine angustifolia*, Tab. lib. 2. fol. 396. *Damasonium tenuifolium* Cord. hist. fol. 151. *Alisma tenuifolium*, Thal. p. 13. *Elleborine quinta* Clus. Pan. p. 275: *Elleborine recentiorum sexta*, Clus. hist. lib. 2. f. 273. *Sigillum S. Mariæ tertium*, Cæs. lib. 10. c. 49. p. 431. *Wild schmalblätterig Niese-Wurß* Tab. Hinter Osterod am Berge.

CCCXLII. *Helleborine angustifolia pratensis ex albo purpurascens.* Joh. Lœf. *Schmalblättrige Wiesen-Niese-Wurß mit weiß-brauner Blüth.* In pratis in der Hohen-Grund und hinter der neuen Bleich.

CCCXLIII. *Hieracium foliis & facie Chondrillæ;* Lob. ic. p. 239. *Habicht-Kraut mit Wegwart-Blättern;* *Hieracium foliis & facie chondrillæ* Lobelii, Cam. hort. p. 75. *Hieracium chondrillæ folio hirsutum*, C. B. Pin. p. 127. *Hieracium secundum*, Tab. lib. 1. fol. 607. *Klein Habicht-Kraut* Tab. *Lævius est nostrum, infimis foliis maximè lacinatis, supremis integris corniculis duobus caulem amplectentibus.* Am Kneiphöfischen Wall passim.

CCCXLIV. *Hieracium Chondrillæ folio glabrum;* C. B. Pin. p. 127. *Urauhes Habicht-Kraut mit Wegbreit-Blät-*

Blättern. Hieracium Aphacoides, Tab. ic. p. 182. **Habichtkraut.** Tab. In fabulis passim bey Königsb.

CCCXLV. Hieracium phlomoides, Tab. ic. p. 184. Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum flore magno, C. B. Pin. 128. Hieracium latifolium Pannonicum, Cam. hort. p. 75. Hieracium primum latifolium, Clus. Pann. pag. 640. Clus. Hist. lib. 5. fol. 139. **Bullhabichtkraut.** Tab. **Raues Habichtkraut mit breiten Blättern und grosser Blüth.** Foliis est modò sinuatis, modò laciniatis, lividis aliquando maculis insignitis, aliquando etiam minus hirsutis. Plura quoq; folia habet, ac in icone visuntur apud Clus. & Tab. **Zu Duednau** in monte Apollinis.

CCCXLVI. Hieracium montanum latifolium non sinuatum. Joh. Lœf. **Berg Habichtskraut mit breiten unzerschnittenen Blättern.** Radix exilis, nigra, filamentis comitata flavis, folia proximè terram alit; modò plura, modò pauciora, quincunciali fermè altitudine, secunciali latitudine, viridia, aspera, obtusius acuminata, è quorum medio caulis rectà assurgit cubitalis, singularis, rotundus, striatus, viridis, aphyllocavlos, & asper, cujus fastigium luteoli flores, singuli petiolis brevibus, incumbentes, agminatim exornant, ætatis tractu in lanugines, per aëra volitantes, transeuntes. **Bey Gerdauen am Berge nach dem alten Hofse zu.**

CCCXLVII. Hieracium montanum hirsutum ramosum, Joh. Lœf. **ästiges Berg Habichtkraut mit rauhen Blättern.** Cubitale & longius est sæpè, radice albicante, villis instructa: caule rotundo, striato, hirsutie aspero, ac ramoso: foliis viridibus, hirtis, alternis thyrsum amplexantibus, ex lato in cacumen abeuntibus, & in ambitu parùm sinuatis: floribus luteis, cacumina caulium petiolis longis occupan-

cupantibus, quibus papposa succedit lanugo, hiant e calyce avolans. Formam refert hieracii montani latifolii minoris, Tab. 1. 1. f. 610. Hirsutiem asperam ei si demas. In der Hollen-Grund.

CCCXLVIII. Hieracium montanum latifolium glabrum minus C. B. Pin. 129. Hieracium montanum latifolium minus. Tab. lib. 1. fol. 610. Klein Berg-Nabicht-Kraut mit breiten Unkraut-Blättern. Tab. In der Hollen-Grund.

CCCXLIX. Hieracium alterum grandius Lob. ic. p. 240. Groß-staudiges Nabicht-Kraut mit schmalen Blättern. Hieracium montanum angustifolium primum Tab. lib. 1. fol. 610. Hieracium alterum grandius Lobelii, Cam. hort. pag. 75. Hieracium fruticosum angustifolium majus. C. B. Pin. p. 129. Hieracium primum, Dod. Lateinisch fol. 638. Hieracium Sabaudum, Obs. Lob. fol. 124. Hieracium majus angustifolium, vel tertium, Clus. Pann. 642. Hieracii tertii genus alterum angustifolium. Clus. hist. lib. 5. fol. 141. Berg-Nabicht Kraut mit schmalen Blättern/ Tab.

Refrigerant Hieracia, siccant cum adstrictione, aperiunt, abstergunt, ac mundant. Succus in caligine oculorum perutilis, melli ac vino edentulo mistus & instillatus, Tab. In der Hollen-Grund. It. in monte Apollinis zu Dvednau.

CCCL. Hieracium dentis leonis folio monoclonon C. B. Pin. 127. Nabicht-Kraut mit Psaffenröhrlens-Blättern. Hieracium intybaeum Tab. ic. p. 183. Begwarten-Nabicht-Kraut Tab. Subaspera est planta, thyrsulo saepe uno, nonnunquam pluribus, ex radice assurgentibus, rarissime brachiatis. Folia etiam nunc magis, nunc minus sunt incisa. Bey Lauten-Mühl inter fruticeta.

CCCLI. Hieracium foliis oblongis in ambitu aculeatis monoclonon Joh. Lœf. Nabicht-Kraut mit langlächten
und

und am Rande stachlichten Blättern. Joh. Lœf. Einstänglichicht
stachlichtes Nabit-Kraut mit länglächtigen Blättern. Hie-
racium hoc ex supellectili herbaria D. D. Halbachii obtinuit
Lœselius, ipsi nunquam visum, repertum fuit in fruticeto bey
Spittel-Hoffe / floruit Julio.

CCCLII. *Holosteum affinis, cauda muris*, C. B. Pin. 190.
Cauda murina, Dod. Lat. fol. 112. *Cauda muris*, Tab. lib.
1. fol. 679. Adv. Lob. fol. 187. *Myosuros, cauda muris*,
Lob. ic. p. 440. *Myosuron, quorundam Holostium*, Thal.
p. 79. *Holostium Loniceri*, Cam. hort. p. 75. *Coronopus*
sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch 76. *Holosteum*, Lon.
deutsch fol. 210. *Mäus-Schwäncklein* Tab. *Hunds-Gras*
oder *Hunds-Zahn* Lon. *Wild Kappensfußlein* Seb. in Trag.
Tausent-Krohn / Adv. Lob. *Mäus-Gras* / und *Mäuse Zäg-*
lein vulgò. *Am Kneiphöfischen Wall* passim.

CCCLIII. *Hyoscyamus albus*. Matth. deutsch 460.
Lob. ic. p. 269. Observ. Lob. 139. Dod. Lat. fol. 451. Lon.
deutsch fol. 115. Eystett. Gesn. hort. fol. 262. Cam. hort. pag.
77. *Hyoscyamus candidus*, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol.
107. *Apollinaris tertia*, Cord. in Diosc. fol. 66. *Hyoscyami*
alterum genus in maritimis, Cæs. lib. 8. c. 45. p. 345. *Hy-*
oscyamus secundus, Tab. lib. 2. fol. 278. *weiß Bilsen*. Seb. in
Trag. *Bilsen-Kraut* / Tab. *weiß Bilsen*. Lon. *weiß Bilsen-*
Kraut Matth. *Bilsen* / *Sambon* / *Doll-Kraut* / *Schlaff-*
Kraut / *Kinds-Wurzel* und *Zigeuner-Kraut* / vulgò. *Auff*
der Kneiphöfischen Klapper-Wiese & circa pagos in incultis
passim. *Succus hyoscyami* illitu aliquantisper continuato
albuginem emaculat. Aëtius tetrabibl. 2. serm. 3. c. 40.

CCCLIV. *Hypericum Brunf.* tom. 3. fol. 81. Matth.
Bauh. in Matth. fol. 667. Lob. ic. p. 398. Adv. Lob. fol. 172.
Obser.

Observ. Lob. 216. Fuchf. fol. 831. Eyflett. Dod. Lateinisch f. 76. Tab. lib. 2. fol. 536. Cæs. lib. 9. c. 41. p. 394. Lon. deutsch fol. 158. Cam. hort. p. 77. Hypericum vulgare C. B. Pin. pag. 279. Ascyron. Cord. in Diosc. f. 61. Hypericum vulgare, & herba perforata, Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 56. S. Joh. Kraut Tab. Lon. Fuchf. Matth. Gemein Harthau Seb. in Trag. Unseres Herren Gottes Wunden Kraut Nostratibus. In fabulosis bey Königsb. passim.

Herba hæc, quæ eo nomine fuga Dæmonum salutatur, vulgò feminis suffitu omnem fugat Dæmonem, corpori vel domui appropinquantem, uti nugigerulus mulierum fabulatur sexus. De Sexu hoc obiter cape, quod habet Baal Hatturim ad margin. Bibl. Venetor. & Basil. Gen. 3. v. 20. Decem cabi Confabulationum, inquit, descenderunt in mundum, & novem istorum abstulerunt mulieres. Inde Adam vocavit nomen mulier Chavah, quia (multum) loquitur.

Hypericum sub elevatione Poli 45. 46. 47. optimum. Flores colligendi Sole 10. & obfidente. Tota planta legatur Sole 6. & occupante; semen, Sole 15. Libræ ingresso.

CCCLV. Jacea nigra squamoso capite major. C. B. Pin. 271. Jacea squamato capite montana prima, Clus. hist. lib. 4. fol. 6. Jacea Austriaca prima, Clus. Pann. pag. 542. Groß Schwarze Glocken-Blum mit schuppichten Köpfen. Flore est purpureo. Vulneraria est planta. Hinc à Chirurgis in fracturis & vulneribus consolidandis extollitur: sunt, qui eâdem in faucium & tonsillarum tumoribus utuntur, Passim in locis siccioribus bey Königsb.

CCCLVI. Jacea nigra squamoso capite, flore albo. Joh. Læs. weiß blühende schwarze Glocken-Blum mit schuppichten Köpfen. Hinter German am Berge. A priore nihil differt, nisi florum colore.

CCCLVII.

CCCLVII. *Jacea laciniata squamata*, C. B. Pin. 271.
Jacea squamato capite tertia Cretica, Clus. hist. lib. 4. fol. 6.
 Glocken-Blum mit zerschnittenen Blättern/ und schuppich-
 ten Köpfen. Bey Lauten-Mühl, circa vias.

CCCLVIII. *Jacea latifolia capite hirsuto*. C. B. Pin. 271.
Jacea Austriaca secunda, vel *Jacea môtana villosa capite elatior*.
 Clus. Pann. p. 543. *Jacea Austriaca villosa capite*, sive quarta ela-
 tior, Clus. hist. lib. 4. f. 6. & 7. *Cyanus sylv. montanus integrifo-*
lius, *Cyanus sylv. κορυλλωσσοφυλ* ☉, Thal. p. 29. breit-blättrige
 Glocke-Blum mit haarichte Köpffe. Flore est purpureo; foliis te-
 nuiter crenatis, & thyrsulis subrubentib⁹. Crenas in suo cyano
 prors⁹ abesse tradit Thal. Beym Penartsche Walde am Fluß.

CCCLIX. *Jacea latifolia capite hirsuto flore albo*.
 Joh. Loef. Weiß-blühende Glocken-Blum mit haarichten
 Köpfen. Folia cum caulibus dilute virescens. Hinter der
 Löbnichtschen Wind-Mühl. Vor dem Sackheimschen Thor.

CCCLX. *Jacobea*. Dod. Lateinisch. fol. 642. *Jacobæa*
vulgaris laciniata, C. B. Pin. p. 131. *Jacobæa vulgaris* Clus.
 hist. lib. 4. fol. 22. S. Jacobs-Blum. Brunf. deutsch fol. 317.
 Flos S. Jacobi, Trag. Seb. in Trag. deutsch. fol. 228. Lon.
 deutsch. fol. 128. Herba *Jacobæa* 1. Tab. lib. 1. fol. 576. Se-
 necio major, sive flos S. Jacobi. Matth. Bauh. in Matth. 794.
Jacobæa Senecio, & herba S. Jacobi. Lob. ic. p. 227. *Jacobæa*
Senecio Adv. Lob. fol. 79. Herba S. Jacobi Cæs. lib. 12. c. 37.
 p. 500. Fuchf. fol. 742. *Artemisia polyclonos Dodonæi*,
 sive flos *Jacobæus*, Thal. 9. S. Jacobs-Blum. Seb. in Trag.
 Lon. Fuchf. Tab. S. Jacobs-Kraut vulgò. S. Jacobs-
 Blum/ quibusd. Abstergit & consolidat. In faucium ulceri-
 bus gargarrifatu utilis. In agrorum marginibus passim.

CCCLXI. **Jacobæa Barbareæ instar lanciniata* Joh.
 Loef. S. Jacobs-Blum mit Winter-Kreß-Blättern. Foliis "

,,est barbarea sive Pseudobuniados, per ambitum incis, & post insigniter laciniatis. Bey dem Zollhause auff der Wiese.

CCCLXII. *Iberis Nasturtii folio*. C. B. Pin. 97. *Iberis Matth. deutsch.* fol. 212. *Iberis secunda*, Tab. lib. 2. fol. 170. Groß Besem Kraut und wilde Kressen. Tab. Viâ quâ itur nach der neuen Brück in fimetis copiosè.

CCCLXIII. *Iris pratensis angustifolia humilior*, C. B. Pin. 32. Kleine schmall-blättrige blaue Wiesen-Schwertel. *Iris tenuifolia*. Cord. hist. fol. 133. Gesn. hort. fol. 263. *Xiphion*, seu *gladiolus cœruleus minor* Trag. Seb. in Trag. deutsch. 557. *Iridis undecimæ altera species*, Clus. Pann. p. 253. *Iridis Angustifoliæ secundæ species altera*. Clus. Pann. lib. 2. fol. 229. *Xyris minor*, Cam. hort. p. 183. Kleine blaue Schwertel Seb. in Trag. Bey dem Penartschen Walde ad margines pratorum; It. bey Birckenfelde in pratis nach der Ziegelscheune zu. *Iridis flores lupos nominari* Philinus scribit apud Athenæum, quod lupi rictui labrisq; similes sint.

CCCLXIV. *Juncus palustris major*. Trag. Seb. in Trag. deutsch 542. Tab. lib. 1. fol. 695. *Juncus maximus*, sive *scirpus major*. C. B. Pin. p. 12. *Juncus aquaticus maximus*, Lob. ic. pag. 85. *Juncus holoschoenos*. Dod. Lateinisch. fol. 605. *Juncus grandis holoschoenos*, Cord. in Diosc. fol. 65. & 66. *Juncus levis aquaticus maximus*. Thal. p. 60. *Juncus rotundus tertius*. Cæs. lib. 4. c. 60. p. 188. Groß weicher Bingen. Seb. in Trag. Tab.

Accolæ lacûs Curlandici elychnia sua ac redimicula pileorum parant ex medullâ. Alias ex junco sellarum fiunt sedes, ac storeæ. Im Pregel nach Jerusalem zu copiosè. It. im frischen und Curischen Nass passim.

CCCLXV. *Juncus floridus major*. C. B. Pin. 13.

Blü.

Blühende Waſer-Binſen. *Juncus floridus*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 731. *Juncus Cyperinus floridus*, Tab. lib. 1. f. 696. *Calamogroſtis ſecunda*, Trag. Seb. in Trag. *deuſch* fol. 537. *Gladiolus paluſtris*, Cord. hiſt. fol. 124. *Gladiolus aquatilis*, Dod. *Lateiniſch*. fol. 601. *Juncus cyperoides paluſoſus*. Eyſtett. *Juncus cyperoides floridus paluſoſus*, Lob. ic. p. 86. Adv. Lob. 44. *Butomus*, Cæſ. lib. 14. c. 17. p. 553. *Cyper-Schwertel*, Tab. *Binſen-Schwertel* quibusd. *Flore quandoq;* *conſpicitur candido*. In *paluſtribus paſſim bey Königsberg*.

CCCLXVI. *Juncus lævis paniculâ non ſparſâ*, C. B. Pin. p. 12. *glatte Waſer-Binſen*. *Juncus* Matth. *deuſch*. fol. 445. *Juncus paluſtris minor*, Tab. lib. 1. fol. 695. An *juncus rotundus primus*? Cæſ. lib. 4. c. 60. p. 188. *Juncus lævis glomerato flore*, Lob. ic. p. 84. *klein Waſer-Binſen*/ Tab. *Binſen* Matth. *klein Weyher/ oder Waſſer-Binſen/ vulgò*. *Paſſim in uliginofiſ*.

CCCLXVII. **Juncellus cyperoides capitulo ſimpli-ci*. Ioh. Lœſ. *Schlechtköpffigte kleine Cyper-Binſen*. In *pratiſ nach dem Breter-Krüge zu paſſim*.

CCCLXVIII. *Juniperus fruticoſa baccifera*. *Juniperus vulgaris fruticoſa* C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris*, Trag. Seb. in Trag. *deuſch* 850. *Juniperus vulgatiſ*. Adv. Lob. 448. *Juniperus*. Brunf. tom. 3. fol. 182. Lob. ic. p. 222. O. Dod. *Lateiniſch*. fol. 852. Matth. Bauh. in Matth. f. 118. Lon. *deuſch*. fol. 40. *Juniperus, & juniperus baccifera*, Tab. lib. 3. fol. 650. *Juniperus minor*, Cord. in Dioſc. 17. Fuchſ. fol. 78. *Juniperi primum genus*, Cæſ. lib. 3. c. 58. p. 136. *Juniperus humilis*, Gefn. hort. f. 263. *Juniperus noſtras*, Cam. hort. p. 81. *Beckholder-Baum/ Matth. Lon. Seb. in Trag. Beckholder Tab. Brunf. Fuchſ. Wacholder oder Wacholder-Baum*

und Kramot Baum vulgò. Helvetiis *Rechholder*/ fortè quasi *Reuchholder* à suffitu. Cord. in Dios. Nostratibus *Rattick*. Calfacit & siccatur. Baccæ venenis resistunt, crassos & glutinosos humores tenuant, renes detergunt, & urinam mensesque pellunt. Pota vitii thoracis, tussibus, inflammationibus, & torminibus auxiliantur. Lacryma Arabum est Sandaracha, officinarum vernix. In hæmoptoë, dysenteria, diarrhæa, mensium ac hæmorrhoidum fluxu salutaris. Bey Brandenburg und Königsberg inter ericeta copiosissimè.

CCCLXIX. *Juniperus vulgaris* arbor. C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris* celsior & arboreescens. Clus. hist. 1. fol. 38. Clus. Hispan. p. 101. In districtu Insterburgicò, zu *Cumetshen*. *Juniperus* quondam annosa & vegeta visa fuit, cujus caudicis perimeter cubitorum ferè trium, altitudo sedecim cubitorum. Tres ejus rami cubitalis fuerunt crassitudinis. Baccifera existit adolescens, post ad senium devergens, spatio jam quinquaginta annorum, nullas amplius genuit baccas, attestante hoc cernuo ac decrepito quodam Sene. Gummi adhuc copiosum fudit antehinc, tunc nullum. Nascitur ibidem & alia, cubitum, & quod excedit, crassa, baccas ferens non rotundas, sed oblongas, prorsum similes iis, quas frutex *juniperus* excludit. Ætate fertur viginti annorum, & necdum gummifera est.

CCCLXX. *Kali folio gramineo semine pastinacæ*. Joh. Lœf. *Weerstachel Kraut mit Pasternack Saamen*. Radix oblonga, lignosa, alba, pauculis fibris, gustu modicè acris, caulem edit virescentem, cubitalem & minorem sæpè, incurvum, in plures ramos, inordinatè dispositos brachiatum, quos folia longiuscula, subhirsuta, aculeata nonnihil, ac pallidè virescentia alternatim excipiunt: Flos ex duobus foliolis nanis & candidis, Julio erumpentibus, constituitur, cui semen succedit

dit latiusculum, subnigricans, insipidum ferè, pastinacæ effigie, cauli adhærens & folio suffultum. Bey der Pillau/ und Sarsau in locis arenosis passim. An Kali sit gramineo folio C. B. quod. 2. in Prod. p. 133. subdubito.

CCCLXXI. Kali spinoso affinis C. B. Pin. p. 289. Tragum Matth. Bauh. in Matth. fol. 731. Tragon. Tab. lib. 2. fol. 377. Tragus Lon. deutsch/ fol. 93. Tragon Matth. Lob. ic. p. 797. Meerstachel-Kraut Tab. Boeck's Kraut Lon. Untreu und Scorpion-Kraut quibusd. Bey German und Pillau in littore maris passim.

CCCLXXII. Lamium purpureum & album non fœtens folio oblongo, C. B. Pin. 231. Lamium sive archangelica flore albo. Lob. ic. p. 520. Adv. Lob. fol. 223. Galeopsis Matthioli seu urtica vulgaris mortua. Thal. 55. Urtica la-beo fœmina. Brunf. Lateinisch Tom. 1. fol. 155. Galeopsis vera Dioscoridis, Clus. hist. lib. 4. fol. 35. Galiopsis, Matth. Bauh. in Matth. fol. 791. Lamium album & purpureum, Tab. lib. 2. fol. 237. Urtica iners, sive Lamium primum, Dod. Lat. f. 153. Todte Nesseln mit weissen und blauen Blumen/ Tab. Taube oder todte Nesseln Matth. Am Kneiphöffschen Wall passim. It. secus vias hinter der Kneiphöffschen Wind-Mühl.

CCCLXXIII. Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis, C. B. Pin. p. 230. Urtica non mordax vulgaris, fœtens, purpurea, Lob. ic. pag. 520. Galiopsis vulgaris fœtens purpurea, Adv. Lob. fol. 222. Urtica iners altera. Dod. Lateinisch fol. 153. Galeopsis, Cæs. lib. 8. c. 48. f. 349. Galeopsis, Cord. in Diosc. fol. 69. Lon. deutsch fol. 138. Galiopsis secunda Tab. lib. 2. f. 238. Lamium Trag. (vel urtica 8. 9. 10.) Sebitz. in Trag. deutsch fol. 3. Urtica mortua Gesn. hort. fol. 287. Taub/ oder todt Nessel Tab.

Binsauge/ Lon. Stinckende und braune Wald-Nessel/ vulgo. Am Kneiphöfischen Wall & alibi passim.

CCCLXXIV. *Lamium folio oblongo luteum*, C. B. Pin. 231. *Lamium luteum*, Lob. ic. p. 521. Adv. Lob. fol. 223. Tab. lib. 1. fol. 237. *Galiopsis flore croceo*, vel *urtica sexta*, Trag. Kyber. in Trag. p. 5. *Galeopsis flore luteo*, vel *urtica tabea* Cam. hort. p. 63. *Urtica inerstertia*, sive *lamium luteo flore*, Dod. Lateinisch 153. *Leucas montana*, Cæs. lib. II. c. 31. p. 450. Taube oder todte Nessel mit geelen Blumen. Geele taub/ oder todte Nesseln/ Tab.

Efficacissimum alia inter, quasvis durities, carcinomata, & strumas discutit, tumentes hæmorrhoides, imposito succo aperit, & sanguinem congestum educit, thymum circa sedem curat. Bey dem alten Hammer/ und Löbnichtschen Walde in umbrosis passim.

CCCLXXV. *Lamium maximum sylvaticum foetidum* C. B. Pin. p. 231. Große stinckende taube Wald-Nessel. *Urtica Herculea*, Tab. ic. p. 536. *Galeopsis legitima*, vel vera Diosc. Clus. hist. lib. 4. fol. 35. & 36. *Heraclea* vel *urtica undecima*, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 4. *Urtica foetida maxima porphyranthemosa* Thal. p. 132. Wald-Nessel. Lon. deutsch fol. 139. Wald-Nessel Seb. in Trag. Tab. Hirsuta est planta, quæ hirsuties apud Tab. & Trag. à sculptore expressa non est, apud Clusium verò elegantissime. Im Pernartschen Walde/ und in der Hollen-Grund passim.

CCCLXXVI. *Lamium folio caulem ambiente minus*. C. B. Pin. p. 231. kleine taube Nessel/ dessen Blätter um den Stengel herum gehen. Morsus Gallinæ folio *Hederulæ alterum*, Lob. ic. p. 463. *Leucas quarta*, Cæs. lib. II. c.

31. p. 456. Hüner Biß mit Bündelreb-Blättern. Inter segetes und am Rneiphöfischen Wall passim.

CCCLXXVII. *Lapathum aqvaticum folio cubitali*. C. B. Pin. p. 116. Waßer Grindwurz/ dessen Blätter eine Ell lang. *Hydrolapathum magnum, sive aqvaticum*, Adv. Lob. 117. *Hydrolapathum magnum*, Lob. ic. p. 285. *Rumex palustris*, Trag. Seb. in Trag. deutsch. 249. *Lapathum sativum*, Dod. Lateinisch fol. 648. *Lapathum palustre*, Tab. lib. 2. fol. 147. *Hippolapathum*, Gefn. hort. fol. 263. Lon. deutsch fol. 119. *Rumicis quintum genus*, Cord. in Diosc. fol. 44. *Hippolapathum sylvestre* Matth. Bauh. in Matth. 354. *Hippolapathum sylvestre*, *Hydrolapathum* Thal. p. 57. *Beyerampffer*/ Tab. *Waßerampffer* oder *Rosampffer*, Lon. In aqvosis & uliginosis passim bey Königsberg.

CCCLXXVIII. *Lapathum aqvaticum minus*. C. B. Pin. 116. Klein Waßer Grindwurz/ *Hydrolapathum minus* Lob. ic. 286. Tab. lib. 2. fol. 147. Klein *Beyerampffer*/ Tab. Bey Pöckten am frischen Hase. It. auff der Alstärtschen Klapper-Wiese nach dem Baum zu.

CCCLXXIX. *Lapathum folio subrotundo*. C. B. Pin. p. 115. *Lapathum folio minus acuto*. Lob. ic. p. 285. *Lapathum folio retuso*, Adv. Lob. 117. *Hippolapathum sylv.* Tab. lib. 2. fol. 146. *Rumex agrestis*, Cord. in Diosc. fol. 44. Grindwurz mit hohen rundlechten Blättern/ wilde Mengolwurz/ Tab. Hasenampffer/ Gassenwurz/ Butterampffer und Butterlchtig. Cord. in Diosc. Streiffwurz/ wilder Mangold/ vulgò. *Folia alvum lubricant, semina siliunt*. Passim in incultis.

CCCLXXX. *Lapathum folio acuto crispo*. C. B. Pin. 115. Grindwurz mit spizen krausen Blättern. *Lapathum*

thum acutum crispum. Tab. lib. 2. fol. 147. Krause spitze Mengolwurzh/ Tab. Passim bey Königsberg.

CCCLXXXI. *Lapathum unctuosum* C. B. Pin. 115. Stolzher Heinrich/ Guttheinrich/ Brunf. deutsch fol. 75. Bonus Henricus. Matth. Bauh. in Matth. fol. 449. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 250. Tab. lib. 2. fol. 134. Tota bona sive bonus Henricus, Lob. ic. 256. Tota bona, Dod. Lat. fol. 651. Rumicis tertium genus, Fuchf. fol. 463. Tota bona, spinaciæ facie, Adv. Lob. fol. 97. Tota bona Dodonæi. 1. Thal. p. 128. Guter Henrich oder Schmerbel/ Tab. Schmerbel Seb. in Trag. Gut oder Stolz Henrich vulgò. In pagis passim.

CCCLXXXII. *Lappa major purpurea*. Joh. Læf. *Lappa major*, *Arcium Dioscoridis*, C. B. Pin. 198. *Lappa major*, Trag. Kyb. in Trag. p. 837. Brunf. Lat. tom. 3. fol. 54. Cæf. lib. 3. c. 50. p. 536. *Bardana*, sive *Lappa major*, Dod. Lateinisch fol. 38. *Personata*, *Lappa major*, *Bardana*, Lob. ic. p. 588. Adv. Lob. fol. 253. *Personata*, *Lappa major*, *Bardana*. Matth. deutsch 506. *Personata*, Lon. deutsch fol. 97. *Personata* Fuchf. fol. 72. *Arctium*, *Personata*, *Lappa major*, Thal. p. 13. *Arcion*, Cord. in Diosc. fol. 198. Große Klett mit Purpurfarben Blumen/ Große Kletten/ Matth. Fuchf. Ros. Kletten / Kyber in Trag. Lon. Brunf. Bußen Kletten/ und grosse Kletten/ Cord. in Diosc.

Caulibus est rubentibus nonnihil, foliis ex atro-virentibus. Radice ac semine urinas pellit, renes infarctu liberat, arenulas calculosq; excutit. Phthisicos quoque & hamoptoicos juvat radix. Ejus medullacea pars, antequam caulescit, edulis est, ac verno tempore delicatissima inter acetaria habetur.

Lappa major in laqueari domus suspensa credulo vulgo tonitrua avertit, Rustici siccatâ, linteamine sive obducto involutâ &

incensâ lappâ, festivitatis nuptialis tempore, saliare in modum, ubi horum vorsum cursitant, tadarum locô utuntur. In arenosis passim bey Rönigsb. Soleatæ mulieres, quæ ab utero sæpe præfocantur, folia Bardanæ tibialibus suis immittunt, eademque pedibus conculcant, remedium adversus hystericam passionem inculpatum experturæ. Vertici capitis admota folia malum accelerant: Lappæ majoris radices porrigunt hippiatri equis vermiculantibus. Observabile quid est, Augustæ Vindelicorum aliquando in corde equi, celerrimè extincti, vermem fuisse repertum dodrantalem, fili bombycini crassitudine, albicantem, & in gyros variè se torquentem.

CCCLXXXIII. Lappa major candida Joh. Lœf. Große Klette mit weißen Blumen. Hæc caulibus & foliis est viridibus, floribus candidis, cætera priori similis.

Ejus semine communiter utuntur mulieres, ab utero præfocata, loco seminis cumini. Am Wege nach dem Dorff Laffskén.

CCCLXXXIV. Lappa minor, Xanthium Dioscoridis, C.B. Pin. 198. Xanthium, Matth. Bauh. in Matth. fol. 834. Fuchsf. fol. 579. Cord. in Diosc. fol. 72. Cord. hist. fol. 159. Dod. Lat. 39. Gesn. hort. fol. 287. Cæs. lib. 8. c. 3, p. 319. Lon. deutsch 98. Lappa minor, Trag. Kyber. in Trag. fol. 839. Tab. lib. 2, fol. 448. Klein Kletten/ Brunf. deutsch. fol. 233. Hieron. Boëf. fol. 317. Xanthium, sive strumaria Lob. ic. p. 588. Adv. Lob. fol. 254. Xanthion seu Lappa minor, Thal. 133. kleine Klette. Tab. Lon. kleine Kletten/ Bettlersläuse/ Matth. Bubenläuse/ Igelsläuß/ und Igels- Kletten vulgò. Radix & semen strumas ac tumores discutiunt

tiunt. Fructus Havedinem inducit crinibus. In fimetis nach
der neuen Brücken zu.

CCCLXXXV. *Lathyrus latifolius* C. B. Pin. 344. Clymenum, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 690. *Lathyrus sylv. major*, seu *purpureus*, Thal. 74. *Lathyrus sylv. latifolius*. Cam. hort. 84. Clymenum Matthioli, Clus. Pann. p. 742. *Cicercula Sylvestris* Tab. lib. 2. fol. 202. *Lathyrus latiore foliô*. Lob. ic. p. 68. o. *Lathyrus Narbonensis latiore foliô*, Adv. Lob. 398. Observ. 517. *Ervilium*, Cæs. lib. 6. c. 6. p. 233. wilde Rüchern Tab. In der Hollen-Grund passim.

CCCLXXXVI. **Lathyrus angustifolius radice tuberosâ*. Joh. Lœf. Wilde schmalblättrige Rüchern. Beym Altstättchen Gericht.

CCCLXXXVII. *Lathyrus sylv. luteus foliis viciæ*. C. B. Pin. 344. *Vicia* Tab. lib. 2. fol. 207. An *Aracus flore luteo*, Adv. Lob. fol. 398. *Lathyrus sylvestris floribus luteis*, Thal. 74. *Glandibus terrestribus congener flore luteo*, Clus. Pann. 744. *Legumen terræ glandibus simile*, Dod. Lateinisch. fol. 550. Geel Wicken Tab. In rubetis & dumetis passim.

CCCLXXXVIII. *Laureola folio deciduo flore purpureo*. Officinis *laureola fœmina*, C. B. Pin. 462. *Chamæ-læa*, sive *Mezereon*, Trag. Seb. in Trag. Deutsch. fol. 751. *Laurus pusilla*, Lob. ic. p. 367. *Daphnodes flore purpureo*, Tab. lib. 3. fol. 776. *Daphnodes* Fuchf. fol. 227. *Piper montanum*, Gesn. hort. fol. 272. *Thymelæa*, Cord. in Diosc. fol. 75. *Chamelæa Germanica* Dod. Lateinisch 364. Cam. hort. p. 39. *Chamelæa Germanica seu nostras*, Thal. 35. *Chamædaphne*, sive *pusilla laurus*, Adv. Lob. fol. 155.

Rel-

Kellershalß Tab. Seidelbast oder Läusekraut Seb. in Trag. Zeiland/ Fuchsl. Scheißlorbeeren Matth. Wolffsbast aliis. Autore Traog graviter spirat totâ substantiâ, demptô flore, qui jucundi est odoris. Folia, flores, cortex, & grana gustata, fauces & guttur acrius vellicant.

Fructus hujus Laureolæ Coccognidium est officinarum, quod à Belgis redimunt nostrates. Rusticos & Polyphæmos fortiter & cum dysphoriâ purgat granorum quindecim dosi. **Hinter Morungen im Walde.** It. **Zu Neuhausen am Thiergarten.** In umbrosis.

CCCLXXXIX. Lenticula palustris vulgaris C. B. Pin. 362. Lens palustris Matth. deutsch. fol. 783. Lob. ic. p. 249. o. Cord. in Diosc. f. 68. Lenticula aquatica, Thal. p. 73. Lenticula aquæ, Brunf. tom. 3. fol. 118. Lens lacustris Dod. Lateinisch fol. 578. Lenticula palustris, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 547. Tab. lib. 2. fol. 206. Casl. lib. 16. c. 35. p. 612. Lenticula, Adv. Lob. fol. 129. **Wasserlinsen/** Tab. Matth. **Meerlinsen/** Brunf. Seb. in Trag. **Wassermos** quibusdam. **Enten-Flott** Nostratibus. Aquis stagnantibus passim innatat. Im Graben beym Philosophischen Gang.

CCCXC. Lenticula aquatica trifulca C. B. Pin. 362. Hederula palustris, Tab. lib. 2. fol. 570. Hederula aquatica Lob. ic. p. 36. o. **Wasser-Ephem.** Tab. **Dreer-spitziger Wasser-Eppich** quibusdam. In fossis nach dem Bretter-Krüge zu copiosè.

CCCXCI. Lenticula palustris bifolia fructu tetragonô C. B. Pin. 362. Callitriche Plinii, Colum. min. cogn. part. 1. p. 316. **Klein kriechend Linsen-Kraut mit viereckichter Frucht.** Pusilla est planta, fundo rivorum tenuissimis fibris

inharens ac repens. Im Biesen-Graben unten auffm Boden gegen Jerusalem über.

CCCXCII. **Lenticula palustris angustifolia* folio in apice dissecto. Joh. Loef. Schmalblättricht Linsen-Kraut/ dessen Blätter in der Spitze zerschnitten.

Fibris terræ insitens, coliculos exire patitur virides, ramosos reptatu horsum vorsum euntes, binis ex intervallo foliolis angustis, longis, in summitate obtusis, ac tenerrimè semel incisis, quæ in caulium fastigio congressu suo stellulam quasi quandam effigiant, instructos. Foliola inter visuntur saepe nova quædam capitella albida, rotunda, pediculis suis fulta. In der Hollen-Grund. It. beyhm Bleich-Garten in lacunis.

CCCXCIII. *Lichen petræus latifolius* sive *hepatica fontana*. C. B. Pin. 362. Lichen, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 732. Dod. Lat. fol. 473. Thal. p. 73. Fuchsf. fol. 476. Cæs. lib. 16. c. 19. f. 601. Lichen herba, Cord. in Diosc. fol. 65. Leber-Kraut/ Brunf. deutsch f. 177. Epatica Lon. deutsch. f. 247. Hepatica prima Tab. lib. 2. fol. 488. Lichen, hepatica, Lob. ic. p. 246. o. Jecoraria, seu hepatica fontana, Trag. Seb. in Trag. deutsch/ 416. Leberkraut das I. Tab. Stein-Leberkraut/ Matth. Fuchsf. Lon. Brunnen-Leberkraut/ Seb. in Trag. Steinflechten/ Moßflechten und Leberkraut/ Cord. in Diosc. bey Schwanis in palustribus. It. in der Hollen-Grund ad fossarum margines.

CCCXCIV. *Lilium floribus reflexis alterum*, lanugine hirsutum. C. B. Pin. 78. *Lilium montanum*, sive sylvestre primum majus. Clus. hist. lib. 2. fol. 134. *Lilium Saracenicum*, Tab. lib. 2. fol. 328. *Hemerocallis flore rubello*, Lob. ic. p. 168. *Lilium purpureum mas*, Gesn. hort. fol.

fol. 264. Bleichrothe punctirte wilde Lilien mit umbgebo-
genen Blumen. Berg Lilien. Hemerocallis herbariorum.
Nauhe umbgebogene Berg Lilien. Heydnisch Lilien/ oder
Heydnische Blumen. Tab. Goldwurz/ vulgö. In der Oste-
rodtschen Heyde passim. It. bey Rastenburg/ und im Walde
bey Neuhoff/ nicht weit von Lagarben.

CCCXCV. *Lilium convallium album*. C. B. Pin. p.
304. *Lilium Convallium*, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol.
456. Tab. lib. 2. fol. 428. Dod. Lat. fol. 205. Gesn. hort.
fol. 246. Matth. deutsch fol. 345. Clus. hist. lib. 2. fol. 190.
Cæs. lib. 5. c. 34. p. 224. Antholog. mag. fol. 90. Ephe-
merum non lethale, Fuchf. fol. 240. *Lilium convallium*
vulgare, Cam. hort. p. 89. *Lilium convallium*, vel vernum
Theophrasti, Lob. ic. p. 172. *Lilium convallis*, & sylvestre
lilium, Brunf. Lateinisch tom. I. fol. 211. *Cacalia*, Lon. deutsch
fol. 217. Mayen-Blümlein / Tab. Brunf. Fuchf. Meyen-
Blümlein oder Zaucken/ Matth. Meyenryß / Gesn. hort.
Copiosè hinterm Kranz-Krüge. It. bey Königsb. in um-
brosis sylvis passim. Baccas habet post deciduos flores ru-
bellas, Sub elevatione Poli 46. 47. efficacissimum est. Sole
in 1. ☉ constituto. Semen colligatur, Sole 15. ☿ inco-
lente: cerebrum confortat, & memoriam acuit juxta quos-
dam, ac præfertur ipsis floribus.

CCCXCVI. *Lilium convallium minus*. C. B. Pin.
304. *Morphyllon*. *Unifolium recentiorum*, Lob. ic. p. 303.
Monophyllon, *unifolium* Thal. p. 77. Einblatt / Brunf.
deutsch f. 235. *Unifolium*, Tab. lib. 2. fol. 428. Dod. Latei-
nisch 205. Cam. hort. 183. Eystett. *Cotyledon sylvestre*, &
unifolium Trag. Seb. in Trag. deutsch 386. *Bifolium pri-
mum*, Lon. deutsch fol. 269. *Monophyllon* Matth. Bauh. in
Matth. fol. 709. Einblatt/ Tab. Lon. Bey Lauten-Mühl in
umbrosis passim.

Radix drachmæ unius pondere, cum aceto sumpta mox in initio, pesti medetur.

CCCXCVII. *Linaria vulgaris lutea flore majore.* C. B. Pin. p. 212. *Linaria vulgaris*, Trag. Seb. in Trag. deutsch 284. Eyttett. Cam. hort. p. 90. *Linaria vulgò*. Gesn. hort. f. 265. Cæs. lib. 8. c. 51. p. 350. *Scheißkraut / Leinkraut* Brunf. deutsch f. 78. *Linaria prima*, Lon. deutsch fol. 190. Dod. Lat. fol. 284. *Osyris* Matth. Bauh. in Matth. fol. 837. Cord. in Diosc. fol. 72. Fuchf. fol. 545. *Osyris Linaria sive Urinaria*, Lob. ic. p. 406. *Osyris major*, Tab. lib. 2. fol. 497. *Scheiß / Lein- und Harn-Kraut / Lon. Groß-Harn-Kraut* Tab. *wilder Flachs / unser Frauen Flachs / Kröten-Flachs / und Nabel-Kraut vulgò Frauen-Flachs / Bor.*

Amara est, ac jecoris obstructions expedit, Gal. 8. simpl. Dodonæo aperiendi, lotiumque ciendi vi prædita. Ictericis & calculosis utilis, Tab. Hæmorrhoidum dolores ad miraculum compescit, Horst. lib. 4. Observ. 42. In locis siccis & apricis bey Königsb. passim.

CCCXCVIII. **Linaria maritima floribus odoratis.* Joh. Lœf. *Meer-Harnkraut mit wolriechenden Blumen.* "Foliis provenit *Osyridis* Matth. sed crassioribus, & magis "succulentis, gustu amaris. In capsis semen nigrum idq; copiosum & elatum continentibus, effigie renem quoque representans. Flosculis luteis Cheiri odorem spirantibus, minoribus tamen, quàm in vulgari *linariâ*. Radice nititur longiusculâ, albicante, fibris instructâ suis. Bey Sarkau an den See Bergen.

CCCXCIX. *Lithospermum majus erectum.* C. B. Pin. 258. *Erhabene große Meer-Hirsen.* *Lithospermum*, Fuchf. fol. 489. Adv. Lob. 192. Cord. in Diosc. fol. 60.

Cord.

Cord. Hist. fol. 94. Lon. deutsch fol. 250. *Lithospermum arvense*, Tab. lib. 2. fol. 521. *Lithospermum commune*, Gesn. hort; fol. 265. *Lithospermum minus*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 657. Lob. ic. 457. Dod. Lat. fol. 83. *Lithospermum vulgare minus* Cam. hort. p. 91. *Saxifraga tertia*, Brunf. Lat. Tom. 2. fol. 188. *Lithospermum sativum* Fuchs. ic. p. 274. *Milium solis sativum*, Trag. Seb. in Trag. deutsch 426. *lithospermum legitimum* Clus. hist. lib. 5. fol. 163. *Anchusæ tertiæ similis altera* Cæs. lib. 11. c. 8. p. 435. *Milium soler Mauritanis*, quoniam in montibus Soler frequens nascitur. Ineptè ergò *milium solis* vulgò appellatur, Gesn. hort. 265. *Lithospermum alterum fruticosum*, Thal. p. 74. Meerhirschen / oder Steinsamen / Lon. kleine Meer-Hirse / Tab. Beym Neuhäusischen Schloß, in arenosis, copiosè.

CD. *Lithospermum arvense radice rubrâ*, C. B. Pin. 258. Acker-Meerhirse mit rothen Wurzeln. *Anchusæ arvensis minor facie milii solis*, Tab. lib. 2. fol. 520. *Lithospermum sylv.* Trag. Seb. in Trag. deutsch 427. *Anchusa degener facie Milii solis*, semine Buglossi Loc. ic. p. 459. *Lithospermum tertium* Dod. Lateinisch fol. 83. *Anchusa tertia lithospermo similis*, Cæs. lib. 11. c. 8. p. 435. *Anchusa arvensis alba*, Thal. p. 9. Rothe Ochsen-Zung Tab. Wild Meerhirschen Seb. in Trag. Am Rneiphöfischen Wall passim. Ex *anchusæ radice fucus* quoque confici potest, quem *παιδερῶσα* dixere Veteres. Is rubro colore genas tingit, qualis in pueris advertitur & placet. Fuci hujus cum Alexis in Fabulâ, quam Ilostasium inscripsit, mentionem olim fecerit, ac meretricium apparatus, comptumque artificiosum, lepidè descripserit, lubentia fuit, totam rem lectu jucundissimam, obiter huc apponere;

Præcipuum studium (meretricum intellige) ad questum est, & eos,

Qui propius se admovent spoliandos: supervacua cetera:

Omnibus struunt insidias: ubi verò ditata sunt,

Novitias meretrices assumunt, tyrocinium artis facturas:

Ipsas statim informant, ut nec ingenium

Nec vultus ac facies semper eadem permaneat.

Brevi si corpore quadam est, suber crepidis

Infarcitur: si grandior, soleâ tenui calceus suppingitur:

Et capite in humerum dejecto prodit:

Hoc de proceritate nonnihil adimit: si cui gracilior coxa est,

Affutâ subitâ veste induit, ut pulchris esse natibus

Exclament, qui viderint: venter

Si tumidior est, fasciis ritè obstringitur

A tergo si pectoris gibbus prominet,

Virgulis statim ac tabellis anteriora versùs

Ut contis in ventrem repellunt:

Ruffa quæ supercilia sunt, pinguntur fuligine:

Quæ nigro colore est, cerussâ oblinitur:

Quæ nimis candida est, PÆDEROTA huic affricant.

Quod in corpore pulchrum est, nudum id ostenditur.

Quibus elegantes sunt naturâ dentes, ridere coguntur invitæ.

CDI. Loto affinis vulneraria pratensis, C. B. Pin.
332. Anthyllis leguminosa Belgarum, Lob. ic. p. 87. o. Anthyllis leguminosa, Clus. Pann. p. 744. Clus. hist. lib. 6. fol. 232. Anthyllis lenti similis Dod. Lat. fol. 552. Lagopodium flore luteo, Tab. lib. 2. fol. 223. Anthyllis leguminosa, Lobelii, Cam. hort. P. 17. Vulneraria rustica, Gesn. hort. fol. 287. Arthetica Saxonum, Thal. p. 10. geeler Haasen Klee Tab. Wund Kraut Gesn. hort. Berg Kraut accolis lacus Curlandici. Sangvinem discutit grumosum, ac in vulnere-

bus

bus, ulceribusque sanandis extollitur à Rusticis. Zwischen
Kunzen und Sarchau an den See Bergen procerior &
succosior provenit. It. Bey Lauten-Mühl in incultis,
ubi exilior, & macrior.

CDII. Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor gla-
bra. C. B. Pin. 332. Kleine niraunge fünffblättrige gelbe
Schoten-Klee. Trifolium filiquosum minus. Tab. lib. 2.
fol. 219. Lotus pentaphyllos, Gesn. hort. fol. 265. Meli-
lotus Germanica, Fuchf. fol. 527. Lon. deutsch 136. Trifoli-
um corniculatum primum, Dod. Lat. 573. Lagopus primus
& Meliloti exigui species altera, vel septima & nobilis. Trag.
Seb. in Trag. deutsch f. 472. Meliloti tertium genus. Fuchf.
ic. 298. Melilotus coronata: Adv. Lob. f. 386. Melilotum
vulgò, Cæs. lib. 6. c. 22. p. 244. Kleiner Schoten-Klee/
Tab. Lon. Unser Frauen Schühlein. Fuchf. Schöne Gold-
geele gedrungene Klee Blume/ Seb. in Trag. Horn-Klee
und Honig-Klee/ vulgò.

In pratis proveniens foliis est majoribus, & filiquis tenu-
ioribus: in montanis foliis minoribus, & filiquis crassiori-
bus, adstringentis & digerentis est facultatis. Fuchf. Hinter
dem Altstärtschen Wall. It. Bey Lauten-Mühl passim.

CDIII. Lunaria Græca nostras. Joh. Læs. Preussche
Pfennig-Blum. Tricubitalis ferè est planta, radice ac sili-
quis à Lunaria Græcâ seu Bolbonâ Lob. p. 322. in iconi-
bus differens. Foliis nascitur crenatis, velut illa Lobelii,
flosculis ex cæruleo albicantibus, quos deciduos sequuntur
siliqvæ longiores, ex tribus laminis constructæ, semen lati-
usculum formam renis exprimens, continentes. Radice ni-
titur oblongâ, & fibratâ nonnihil, bulbulis prorsus destituta.
Lunaria hæc Viola lunari 2. Tab. lib. 2. fol. 31. assimilis
T quidem

quidem est siliquis, foliis verò dissimillima, *Hinter Lattenwalde im Gebirge.*

CDIV. *Lunaria racemosa*, Lob. ic. p. 807. *Traubische Mohn-Raute.* *Lunaria racemosa*, Ceterach foliis, racemulis Ophioglossi, Adv. Lob. fol. 360. *Lunaria racemosa minor vel vulgaris*, C. B. Pin. 354. *Lunaria botryitis polyphyllus*, Thal. p. 74. *Lunaria botryitis*, Cam. hort. p. 91. Eyfett. *Ruta lunaria*, *Ruta jecoraria*, Tab. ic. p. 137. *Lunaria minor*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 647. Lon. deutsch fol. 253. Gesn. hort. fol. 266. Fuchf. 482. *Lunaria minor seu racemosa*, Cæs. lib. 16. c. 18. p. 600. *Epimedium Dioscoridis*, Colum. in Phytobas p. 80. *Lunaria botrytis minor*, Clus. hist. lib. 5. fol. 118. *Lunaria Trag.* Sebitz. in Trag. deutsch fol. 719. Dod. Lateinisch. fol. 139. *Mohnraut und Leberraut*/Tab. Klein *Mohnraut.* Fuchf. *Traut Babbichen* sieh mich an/ *vetulæ quædam.* Am Lautschen Teich in collibus herbosis nach Bladau zu. Sinit alba menstrua.

CDV. *Lupulus mas*, C. B. Pin. p. 298. *Lupulus Brunf.* Lat. Tom. 3. f. 113. Matth. Bauh. in Matth. f. 839. Dod. Lat. fol. 409. Clus. hist. lib. 1. fol. 126. Tab. lib. 2. fol. 583. *Lupus salictarius spontaneus sive lupulus & vitis septentrionalium*, Lob. ic. p. 629. *Lupulus sativus & sylvestris* Trag. Seb. in Trag. deutsch/ 641. *Lupus salictarius*, Fuchf. f. 164. Gesn. hort. fol. 266. Cæs. lib. 4. c. 17. p. 157. NB. *Lupulus*, qui fructum fert, non floret, qui verò floret, sine fructu est Cæs. cit. loc. *Lupulus salictarius spontanea*, Adv. Lob. fol. 276. *fruchtbarer Hopffen.* Tab. Matth. Fuchf. *Zahm und wild Hopffen*/ Seb. in Trag. *Amaror & odoris gravitas*, vim aromaticam floribus decernunt. *Menses ac lotium cient*, infarctus jecoris ac lienis expediunt, humores crassos extenuant, abstergunt & discutiunt. *Turiones seu asparagi lupuli*, vetulis.

tulis Hopffen Rühn/ acetaria inter sunt, alvum mollientia & sanguinem mundantia. In sylvis passim.

CDVI. *Lupulus* fœmina, C. B. Pin. p. 298. unfruchtbarer Hopffen Cam. hort. p. 93. Foliis ad radicem tantum serratis, non incis, provenit, editque flosculos subpallidos, in pollinem luteum abeuntes, nullò post se fructu relicto. Inter sepes & fruteta passim.

CDVII. *Luteola* herba falicis foliò, C. B. Pin. p. 100. *Luteola* Adv. Lob. ic. p. 353. *Pseudostruthium*, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 442. Eystett. *Antirrhinon* Trag. Kyb. in Trag. p. 362. *Struthium* Gesn. hort. fol. 283. *Catanance*, Lon. deutsch fol. 191. *Catanance prima*, Tab. lib. I. f. 395. *Antirrhinon*, Tragi Thal. p. 9. *Lutum herba*, Dod. Lat. fol. 80. *Guadarella vulgò*, Cæs. lib. 9. c. 35. p. 388. *Weiden-blättriges Streich-Kraut* / Tab. Orant oder Stärck-Kraut/ Lon. Kyb. in Trag. *Ackerpsriemen* quibusdam. *Am Altstättchen Ball nach dem Baum zu*.

CDVIII. *Lychnis sylvestris alba simplex*. C. B. Pin. 204. *Ocymastrum*, sive *Ocimoides*, Bauh. in Matth. f. 706. Matth. deutsch 422. Cam. in Matth. 344. Tab. lib. 2. fol. 14. *Rosæ Marianæ similis tertia*. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 101. *Strutio similis*, *Walcken-Kraut*/ Lon. deutsch 109. *Ocimoides major*, Cæs. lib. 6. c. 47. p. 256. *Ocimoides album*. Gesn. hort. f. 269. *Lychnis sylvestris alba* Cam. hort. p. 93. *weißer Wiederschoss* Tab. wilde *Basilien*/ Matth. Cam. in Matth. *Marien-Röslein* quibusdam. Foliis est hirsutis; floribus in summis ramulis candidis, quibus cytini seu conceptacula seminum succedunt, velut in *hyoscyamo*. Semen *ασπιόμεγες* siccantis est indolis, demorsis à serpentibus utile. Inter segetes passim,

CDIX. *Lychnis sylv. floribus purpureo-rubentibus* Dod. Lat. p. 171. *Lychnis sylv. rubra* Cam. hort. 93. *Ocymastrum rubrum*, Tab. lib. 2, fol. 15. *Lychnis sylv. rubello flore.* An Hesperis Theophrasti, Lob. ic. p. 335. Observ. Lob. 181. *Lychnis sylv. aquatica purpurea simplex.* C. B. Pin. 204. *Rosæ Marianæ similis quarta* Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 101. *Melandryum Plinii genuinum* Clus. hist. libr. 3. fol. 294. *Lychnis sylv. Eystett. Ocymoides rubrum* Thal. p. 81. *Ocymoides purpureum vel roseum*, Gesn. hort. fol. 269. *Roth Wiederstoß / Tab. Roth Margenrößlein und wilde Christus / Auglein* vulgò. Juxta pratorum & fluviorum margines passim.

CDX. *Lychnis segetum major.* C. B. Pin. 204. *Nigellastrum* Dod. Lat. fol. 173. *Pseudomelanthium*, Mat. fol. 33. Lob. ic. p. 38. Adv. Lob. f. 12. Lon. deutsch 114. *Nigella* Brunf. Lateinisch tom. 1. fol. 242. *Lolium.* Fuchsl. p. 127. *Pseudomelanthium*, *ἡδερμον φυλλώδες* Theophrasti, Thal. 86. *Githago Rosæ Marianæ sexta species*, Trag. Seb. in Trag. deutsch. 101. *Lychnis arvensis.* Tab. lib. 2. fol. 10. *Pseudomelanthium flore rubescente*, Eystett. *Lychnis alia inter triticum*, Cæs. lib. 6. c. 43. p. 253. *Raden* Tab. Lon. *Raden oder Korn-Neglein* Matth. *Ratten-Blum*, Brunf. *Ratten.* Fuchsl. *Groß Raden* Seb. in Trag. Inter segetes passim.

Radix Pseudomelanthii, die corporis Christi, sole meridianum punctum occupante, effossa, manibus servata, ut incalescat, quamvis hæmorrhagiam sistere à quibusdam dicitur.

CDXI. *Lychnis sylv. quæ Beenalbum vulgò.* C. B. Pin. 205. *Papaver spumeum, sive Ocymastrum alterum*, Lob. ic. p. 340. *Papaver spumeum*, Cam. hort. 117. *Beenalbum* Gesn. hort. *Beenalbum sive Polemonium*, Dod. Lateinisch fol.

fol. 172. Polygonaton & Rosa Mariana quinta, Trag. Seb. in Trag. deutsch 103. Herba articularis, Tab. ic. p. 298. Lychnis sylv. Lon. deutsch fol. 171. Polemonium primum Dodonæi. Thal. p. 92. Melandryum Plinii quorundam, Clus. hist. lib. 3. fol. 293. Polemonia, Cæs. lib. 6. c. 50. p. 258. Gliedweich und wild Margen-Rößlein Lon. Eyndreich Seb. in Trag. Sphlyspettel und Glied Kraut Tab. Semen & effigie, & sapore assimile est semini papaveris nigri. In fabulosis passim.

CDXII. Lychnis sylv. viscosa rubra angustifolia. C. B. Pin. pag. 205. Klebriche Purpurrothe Marien-Rößlein mit schmalen Blättern. Lychnis sylv. purpurea, Tab. lib. 2. fol. 11. Lychnis sylvestris prima flore rubrô, Clus. Pann. pag. 328. & 329. Lychnis Sylvestris quarta Clus. hist. lib. 3. fol. 289. Lychnis viscosa sylvestris flore incarnatô, Eystett. Ἰζόκανθα ruber Thal. p. 59. Wild Purpurroth Marien-Rößlein Tab. Vulnerariam esse plantam, viscum ejus attestatur. In monte Apollinis bey Quednau.

CDXIII Lychnis viscosa flore muscosô C. B. Pin. pag. 206. Muscipula sive Armoraria altera Lob. ic. p. 453. Muscipula sive Viscaria altera flore muscoso. Adv. Lob. 190. Orites Lychnidis sylvestris genus, Tab. ic. pag. 820. Viscago Cæs. Lib. 6. cap. 49. pag. 257. Viscago major Cam. hort. 178. Sesamoides magnum Salmanticum, Clus. hist. lib. 3. fol. 295. καυρόφιλον, Thal. pag. 68. Ohr-Löfflein Kraut Tab. Varietas est in hac plantâ. Flores nunc sunt minusculi, copiosi & congesti, nunc calyculis exiguis, curtis & albicantibus inhærentes: nunc majores ac distracti, calyculis longioribus subpurpureis, conclusi, quos vanaescentes sequuntur seminum capsæ majusculæ, in caulibus & foliis

hirsuties quædam advertitur. In der Brandenburgischen und Fischehäusschen Heyde/ secus vias passim.

CDXIV. **Lychnis sylvestris viscosa foliis Otitidis.* Joh. Lœf. Klebrige weiß Marien-Rößlein mit Ohr-Löffel-Kraut-Blätter. Radix lignosa ferè est, cortice subalbido tecta, quæ cauliculum modò unum, modò plures effert cubitales, & minores, rotundos, hirsutos, geniculatos, viscosos, nunc subvirentes, nunc rubescentes, quorum geniculis singulis duo ex adversum folia innata viridia in acumen tendentia ac hispida, ramulis plerumque binis, ad genicula exclusis, subservientia; floribus in fastigiò caulis ac surculis mense Julio est candidis ac dilabidis brevi spatiò, foliolis decem constantibus, circa summum leviter incisus, tractu ætatis mox incurvis ac reflexis, quorum stamina tria vel plura ex albo purpurea post: Semen in capsis flavescentibus subnigricans est, papaveris semini proximum, sed minus: folia summâ tellure copiosa alit. Radix hirsuta, oblonga, in extremitate subrotunda, pediculis prolixis nitentia, otitidis facie. Zu Quednau auffm Berge. Item bey Lauten-Mühl.

CDXV. *Lyfimachia lutea major: quæ Dioscoridis C. B. Pin. 245. Lyfimachia lutea, Trag. Sebitz, in Trag. deutsch fol. 146, Fuchf. fol. 492. Tab. lib 2. fol. 524. Adv. Lob. fol. 185. Cæs. lib. 6. cap. 50. p. 261. Eystett. Lyfimachia lutea sive Salicaria Lob. ic. pag. 342. Lyfimachia lutea communis Clus. hist. lib. 4. fol. 50. Lyfimachium luteum Gesn. hort. fol. 266. Thal. pag. 71. Lyfimachia prima, Matth. Bauh. in Matth. fol. 675. Lon. deutsch fol. 164. Lyfimachia vera, Cord. in Diosc. fol. 61. Großer geeler Weiderich Tab. Fuchf. Matth. Lon. In der Hollengrund/ juxta rivos passim, Lyfimachia lutea sub Elevatione poli 45. 46. 47. 48. optima.*

Radix & folia adstringunt, & omnis generis fluxus compescunt.

Herba ac flores lutei colligendi, Sole 15. Ω occupante. In lixiviô decocti flores flavedinem inducunt crinibus.

CDXVI. *Lyfimachia bifolia* flore globosô luteo C. B. Pin. 245. Zwenblättriger Weiderich mit einer gelben runden Blüth. *Lyfimachium aquatile*. Dod. Niederländisch fol. 958. *Lyfimachia lutea* altera Clus. hist. lib. 4. fol. 50. Wasser-Weiderich Dod. Niederländisch. Bey Schwamnis im Gebrüch. It. In der Hollen-Grund ad fossas.

CDXVII. *Lyfimachia filiquosa hirsuta* magnô flore C. B. Pin. 245. Rauger Schoten-tragender Weidrich mit großer Blüthe. *Lyfimachia purpurea*, Fuchf. fol. 491. *Lyfimachia purpurea* primum genus Fuchf. ic. pag. 278. *Lyfimachia filiquosa prima* Tab. lib. 2. fol. 524. *Antoniana major hirsuta* Gesn. hort. fol. 247. *Lyfimachia seu Salicaria altera* Trag. Kyber. in Trag. p. 182. *Onagra campestris hirsuta*, Cæf. lib. 6. Cap. 70. & 71. pag. 268. *Lyfimachia secunda & tertia* flore purpureo vel rubro, Lon. deutsch 164. *Lyfimachii majoris purpurei prima species*, Thal. pag. 70. Weiderich Rößlein Tab. Roth Weiderich Fuchf. Braun und roth Weiderich Lon. Plantam hanc in pago Langfheim ad oram rivuli alluentis reperi: ejus caulis rotundus, hirsutus ac concavus quatuor surgebat in ulnas.

CDXVIII. *Lyfimachia filiquosa hirsuta*, parvô flore C. B. Pin. 245. Großer rauger Schoten-tragender Weidrich mit kleiner Blüth. *Lyfimachia filiquosa secunda* Tab. lib. 2. fol. 525. Weiderich Rößlein Tab.

CDXIX. *Lyfimachia filiquosa glabra* major C. B. Pin. pag. 245. Großer unrauger Schoten-tragender Weidrich

derich. *Lyfimachia filiquosa*, filius ante Patrem Lob. ic. p. 343. *Lyfimachia filiquosa major*, Clus. hist. lib. 4. fol. 51. *Lyfimachia filiquosa flore albô* Tab. ic. pag. 83. *Pseudo-lyfimachium purpureum primum* Dod. Lateinisch fol. 85. *Lyfimachii majoris purpurei secunda species* Thal. pag. 70. *Onagræ alterum genus* Cæs. pag. 265. *Weißer Weiderich* Tab. Pota dysenterias, sanguinis rejections, & muliebre profluvium sanat. Gal. 7. simpl. In locis udis.

CDXX. *Lyfimachia filiquosa glabra minor* C. B. Pin. pag. 245. *Kleiner unrauger Schoten-tragender Weiderich*. *Lyfimachia minor & tertia* Tab. lib. 2. fol. 524. *Lyfimachia filiquosa varietas* Adv. Lob. fol. 145. *Lyfimachii medium genus*, Thal. p. 70. *Klein Weiderich*. Tab. In der Hollen-Grund in uliginosis.

CDXXI. *Lyfimachia filiquosa glabra minor flore albô*. Joh. Læfel. *Klein unrauger Schoten-tragender Weiderich mit weißer Bluhm*. Bey Gerdauen am Mühl-Teich in umbrosis.

CDXXII. *Lyfimachia Chamænerion dicta latifolia* C. B. Pin. pag. 245. *Lyfimachia vulgò altera*, Cam. Hort. p. 93. *Antoniana*, f. S. *Antonii herba*, foliis lævibus. Gesn. Hort. ap. pag. 290. *Chamænerion & Epilobion*, Eystett. *Sanct Antonii Kraut*. Foliis duntaxat lævibus passim apud nos provenit, quæ Gesnero rarior inventu. In der Hollen-Grund. Item dieseit Neuendorff am Graben.

CDXXIII. *Lyfimachia spicata purpurea fortè Plinii* C. B. Pin. 246. *Lyfimachia purpurea fortè Pliniana* Lob. ic. pag. 342, *Lyfimachia purpurea* Tab. lib. 2. fol. 524. *Lyfimachia flore purpureo* Cam. Hort. pag. 93. Cæs. Lib. 6. cap. 55. pag. 261. *Lyfimachia altera* Matth. Bauh. in Matth.

Matth. fol. 675. Eyttett. *Lyfimachia purpurea* sub Elevatione Poli 45. 46. 47. 48. optima. *Pseudo-Lyfimachium purpureum* alterum. Dod. Lateinisch fol. 86. *Solidaginis Saracenica* alia species, Trag. Kyber. in Trag. p. 487. *Lyfimachium purpureum* Gesn. hort. fol. 266. *Lyfimachia purpurea communis major*, Clus. Hist. lib. 4. fol. 51. Brauner spiziger Weiderich Tab.

Radix collecta, Sole ultimum ☉ gradum accedente, ac collo appensa certissimum Epilepsiæ remedium. Flores colligendi, Sole ultimum ☉ gradum inhabitante. Utiles sunt in sputo ac mictu sanguinis, mensiumque nimio fluxu, pulvisculô eorum exhibitô. Faciem emaculat aqua florum destillata. Semen colligatur Sole 2. ♄ occupante, herba verô tota 8. ♄ Sole adeunte, *Lyfimachia purpurea*, ipsô Jacobi die, vesperâ ingruente effossa, torrefacta, in sacculum coniecta, & novendium collo appensa, post in profluentem missa, putrilaginem gingivarum scorbuticam corrigere creditur. In incultis est juxta rivos passim.

CDXXIV. *Lyfimachia spicata cærulea*. C. B. Pin. 246. *Lyfimachia Cærulea hortensis* Lob. ic. pag. 344. *Lyfimachia cærulea hortensis*, *Veronica recta* quorundam Adv. Lob. fol. 145. *Veronica recta cærulea* Eyttett. *Pseudo-Lyfimachium cæruleum* Dod. Lateinisch fol. 86. *Lyfimachii tertium genus*, Gesn. hort. fol. 266. *Lyfimachia cæruleô flore* Clus. Hist. lib. 4. fol. 52. Spiziger blauer Weiderich. In ascensu montis bey der Neuhausischen Muhl. It. bey Bießdehlen in pratensibus.

CDXXV. *Lyfimachia cærulea galericulata*, vel *Gratiola cærulea* C. B. Pin. 246. Blauer gehelmter Weiderich. *Lyfimachia flore cæruleô*. Cam. hort. pag. 93. Tertia-

lianaria Tab. lib. 2. fol. 93. *Lyfimachia galericulata* Lob. ic. pag. 344. Herba Judaica altera, Dod. *Niederländisch*. f. 127. Gratia Dei Cæs. lib. 6. cap. 65. pag. 265. *Lyfimachia galericata*, Lobelii. Clus. Hist. Lib. 4. fol. 53. *Sideritis carulea*, Thal. pag. 104. *Sieber-Kraut*. Tab. Ad fluviorum ripas passim.

CDXXVI. **Lyfimachia hirsuta purpurea*, flore galericulatô. Joh. Lœf. *Krauter gehelmtter Weiderich mit Purpurfarben Blumen*. Sæpe bicubitalis altitudine in locis humectis, sæpe multò minor in aridioribus, caulibus est quadrangulis, striatis, hispidis, geniculatis, concavis, ἐπὶ τὸ πλεῖστον brachiatis, quorum geniculis bina serviunt folia oblonga, viridia, hirsuta, tactu holoserica, in ambitu crenata, nova thyrsulorum germina haud rarò amplexu suò foventia. Caulium summitas flosculorum gaudet concursu duobus ad quodvis geniculum foliis suffultorum, verticillatim thyrsum ambientium, capsis in summò incisissimis insistentium, galericulatorum, hiantium, maculosâ purpurâ tenuissimis intus staminibus, quorum intermedium in cacumine bifurcum. Flosculis deciduis, in quâlibet capsâ quatuor ad-vertes semina rotunda. Radix nodosa albicans & concava, villis circa nodos instruitur plusculis. Ad rivorum margines, sæpe & inter segetes.

CDXXVII. *Malva sylvestris folio sinuato* C.B. Pin. 314. *Große wilde Pappel*. *Malva sylvestris major* Tab. lib. 2 fol. 442. Thal. pag. 76. *Malva agrestis major* Gesfr. hort. fol. 266. *Malvæ vulgaris altera species*. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 292. *Malvæ sylvestris procerior vulgaris* Lob. ic. pag. 650. *Malva vulgaris major*, Lon. deutsch fol. 191. Cam. Hort. pag. 95. *Malva sylvestris elatior*, Fuchf. fol.

fol. 509. Malva sylvestris vulgaris, Cord. in Diosc. fol. 44. Malva sylvestris procerior Dod. Lateinisch 653. Malva sylvestris recta, Cord. hist. fol. 114. Tab. Hasen-Pappeln; Graß-Pappeln Lon. Ros-Pappel. Fuchsl. Folia sæpè ita sinuata sunt in nostrate, ut in acutiem tendant eorum partes. Cauliculi hirsuti sunt, ac flores violacei. Hinter Fischhausen/ viâ, quâ itur nach Lochstädt. Item am alten Schloß zu Gerdawen.

CDXXVIII. Malva sylvestris rotundô folio. C. B. Pin. 314. Rund-blättrige kleine Bald-Pappeln. Malva sylvestris pumila Fuchsl. fol. 508. Thal. pag. 76. Dod. Lateinisch fol. 653. Malva vulgatissima. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 292. Malva minor Lon. deutsch fol. 191. Malva vulgaris minor. Cam. hort. pag. 45. Malva sylvestris minor Tab. lib. 2. fol. 442. Gänß-Pappeln. Brunf. deutsch f. 228. Malva Matth. Bauh. in Matth. fol. 359. Malva sylvestris recens pumila Lob. ic. pag. 651. Malva sylvestris. Adv. Lob. fol. 292. Malva agrestis minor, Gefn. hort. fol. 266. Malva sylvestris supina, Cord. hist. fol. 149. Gänß-Pappeln Tab. Fuchsl. Gemeine Räß-Pappel. Sebitz. in Trag. Kleine Pappeln Lon. Hasen-Pappeln Nostratibus. Phantias libro de plantis ait, in malvâ seminis formam placentam vocari, quia sit ei similis. Vetulis & pueris apud nos Räß-Pappeln dicitur. Circa hortos, pagos, & rudera passim.

CDXXIX. Malus sylvestris minor, Tab. ic. p. 1009. Mala sylvestria, quæ & alba & rubra. C. B. Pin. pag. 433. Mala sylvestria rubentia Tab. ic. pag. 1008. Malus sylvestris major alba. Tab. ic. pag. 1008. Klein Holz-Äpfel. Holz-Strömpling; Weiße große Holz-Äpfel Tab. Holzst.

Borussis. Ex his præparatur potus, quem *Hölzken-Schem-*
per nominant. In sylvis & pagis passim. Pomis olim pu-
 gnatum, retulit Chares Mytyleneus, Alexandrum, cum ma-
 la pulcherrima in agris circa Babyloniam reperisset, iis sca-
 phas complevisse, ac illorum jactu è navibus, ut pugnarent,
 imperasse, unde prælium illud dictum fuit *μηλομαχία*.
 Obiter jocum huc adscribam. Dum circa arborem hanc
 cum Amicò versor, austera fustibus mala decutiens, ex illo,
 otii causâ, quæro: cur *Malum* homini os claudat, *Mala* ve-
 rò aperiant? Causam cum daret prorsus alienam, dixi lite-
 ram M hoc præstare, quæ omnes inter literas os claudit,
 reliquis id aperientibus. Rem ut exactius caperet, Epigram-
 ma hoc in voculam SCIP à me olim fufum ipsi recito:

Literula M claudit, reliquarum tota caterva

Os aperit; res est pensiculata diu.

SCIP dictum factum claudit rursus ora puella,

Et vult lege suâ mente tegenda tegi,

SCIP cur collectum claudit, cur pandit amica

Os, ubi literulas ordine SCIP recitat?

SCIP, quod rivalis docuit, recludere non fas,

SCIP schola quod docuit, tutò aperire potest.

Adhæc quæsi ex eodem, qui fiat, quod litera M nunquam
 finiat voces Grajas:

Literulas inter Latias quæ claudere soeta

Voces, cur Grajas claudere non potis est?

Causâ locò attulit illud Ausonii:

Vocibus in Grajis nunquam ultima conspicio M.

CDXXX. Marrubium album vulgare C. B. Pin-
 pag. 230. Marrubium Fuchf. fol 590. Dod. Lateinisch f. 87.

Cord.

Cord. in Diosc. fol. 58. Cæs. lib. ii. cap. 24. pag. 447. Marrubium vulgare Clus. hist. lib. 4. fol. 34. Eystett. Marrubium album Lob. ic. pag. 517. Tab. lib. 2. fol. 239. Gesn. hort. fol. 267. Marrubium candidum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 8. Marrubium sive Prassium, Matth. deutsch fol. 346. Andorn-Weiblein Brunsf. deutsch fol. 83. Marrubium album odorum Adv. Lob. fol. 222. Weißer gemeiner Andorn Tab. Fuchs. Matth. Gottes-Bergeß quibusdam. In pagô Kraptepellen / ubi succini hamiotæ, copiosissimè visitur. Item in Gerdauen / und bey der alten Pfund-Bude in incultis. Sub Elevatione poli, 45. 46. 47. 48. 49. Radix perutilis, Sole in 1. 8 constitutô effossa. Folia colligenda Sole 16. v occupante; flores Sole 1. 60 ingressô.

CDXXXI. Marrubium nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis C. B. Pin. 230. Ballote sive marrubium nigrum Lob. ic. pag. 518. Dod. lat. fol. 90. Marrubium nigrum Gesn. hort. fol. 267. Lon. deutsch fol. 140. Marrubiastrum Tab. lib. 2. fol. 240. Ballote, Matth. Bauh. in Matth. fol. 601. Cord. in Diosc. fol. 57. Cæs. lib. ii. cap. 22. pag. 445. Marrubium majus Trag. Kyb. in Trag. p. 8. Schwarzer stinkender Andorn Tab. Fuchs. Matth. Lon. Groß und schwarz Andorn Kyber. in Trag. Am Kneiphöfischen Wall. Item bey Lauten-Mühl in rudibus passim.

CDXXXII. Marrubium Cardiaca dictum, forte primum Theophrasti C. B. Pin. 230. Cardiaca Matth. Cam. in Matth. fol. 397. Lob. ic. pag. 516. Adv. Lob. fol. 221. Tab. lib. 2. fol. 248. Dod. Lateinisch fol. 94. Cæs. lib. ii. cap. 23. pag. 445. Fuchs. fol. 395. Andorn-Männlein Brunsf. deutsch fol. 82. Melissa sylvestris, Trag. Kyber. in Trag. pag. 12. Herz-Gespann Tab. Herz-Gesperr und Herz-Kraut / Kyber. in Trag. Flosculis albis provenit in

arce *zu Lieb-Mühl.* Amara est, calidæ ac siccæ indolis. In Epilepsiâ & cordis affectibus singularis creditur esse virtutis. Sepibus & rivulis uliginosis passim se associat. Quæritur, cur plantæ siccatione plerumque citius nigrescant parte pronâ quàm aversâ, uti in hâc videre est? ▽ hujus plantæ destillata viridis (ni fallor) est coloris. Ulti ▽ Pulsatillæ & Spiritus Pimpinellæ cærulea, an ob cupream vesicam? non satis stannô obductam? sicque per accidens. An per se? In vitrô destillationem nunquam tentavi. Sic contra Chymicorum assertum, Tincturæ vegetabilium transcenderent alem-bicum.

CDXXXIII. Marrubium palustre glabrum C. B. Pin. 230. unrauger Wasser Andorn. Marrubium palustre Lon. deutsch fol. 140. Marrubium aquaticum Trag. Kyber. in Trag. pag. 9. Thal. pag. 76. Marrubium aquatile Dod. Lateinisch fol. 595. Marrubium aquaticum vulgi. Sideritis secunda Matthioli Lob. ic. 524. Marrubium aquaticum vulgi Adv. Lob. fol. 211. Sideritis prima Heraclia Matth. Bauh. in Matth. fol. 711. Sideritis prima Cam. hort. pag. 160. Verbenæ alterum genus Cæs. lib. 11. cap. 33. pag. 451. Lan- cea Christi, Gesn. Hort. fol. 263. Wasser oder weicher An- dorn Lon. Gliedt Kraut das 1. Matth. Bruch oder Wasser-Andorn quibusdam; juxta rivos & uliginosa passim
CDXXXIV. Melampyrum purpurascens comâ. C. B. Pin. 234. Triticum vaccinum Dod. Lateinisch fol. 541. Braunechte Wald-Hirse oder Ruh-Weizen. Hinter der Lief in locis udis.

CDXXXV. Melampyrum luteum latifolium C. B. Pin. pag. 234. Breit-blättrige gelbe Wald-Hirse oder Ruh- weizen. Milium sylvaticum primum & secundum Tab. 1. 1. fol.

fol. 682. solò coloris flore differunt hoc & præcedens. Melampyrum primum Tal. pag. 79. Parietaria sylvestris secundà, Clus. hist. lib. 4. fol. 44. Clus. Pann. pag. 603. Parietaria sylvestris Eystett. Cratægonon Adv. Lob. ic. pag. 36. Wald-Hirschen Tab. Ruh-Weissen quibusdam. Nacht und Tag vetulis. Ad margines sylvarum passim.

CDXXXVI. Melilotus officinarum Germaniæ, C. B. Pin. pag. 331. Melilotus germanica Lob. ic. pag. 430. Cam. hort. pag. 99. Melilotus germanica flore luteò, Eystett. Melilotus vulgaris major Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 471. Lotus urbana Matth. Bauh. in Matth. fol. 809. Lotus sylvestris Tab. ic. pag. 508. Cæs. lib. 6. cap. 17. pag. 241. Melilotus vera, Gesn. Hort. fol. 267. Loti sive trifolii species, Cord. in Diosc. fol. 70. Saxifraga lutea, Fuchs. fol. 749. Trifolium odoratum, sive Melilotus, Dod. Lat. fol. 567. Trifolium odoratum Imum Dodonæi Thal. pag. 125. Wilder Stein-Klee. Sieben-Gezeit Tab. Gemeiner oder großer Stein-Klee Matth. Geeler Stein-Klee vulgò. Dießseits Friedland propè viam, in tantà copiâ Melilotus tum luteò tum albidò flore crescit, ut vel maxima seu currus herbâ onerari possit. Odorata herba est, ὁ μελίλωτος εἰς πλεῖον χρόνον ἔννοσμος διαμένει, inquit Theophrastus. Hinc fragrantia odoris coronis texendis olim serviebat.

CDXXXVII. Mentha cataria vulgaris & major. C. B. Pin. 228. Nepeta vulgaris, Trag. Seb. in Trag. deutsch 12. Menta felina, Cattaria Tab. ic. pag. 348. Eystett. Cattaria sive mentha Catti, Lob. ic. pag. 511. Adv. Lob. fol. 519. Nepeta fruticosa Cord. in Diosc. fol. 52. Nepeta Germanica, Cam. hort. pag. 106. Herba gattaria, Matth. Bauh. in Matth. fol. 530. Cattaria herba, Dod. Lateinisch. fol. 99. Ca.

Calaminthæ primum genus. Fuchf. fol. 434. *Calamintha* tertia seu *Nepeta*. Tal. pag. 34. *Calaminthæ* species quibusdam, Gefh. hort. fol. 251. *Calamintha montana* Lon. deutsch fol. 142. *Gattaria vulgò*, *Calaminthæ* tertium genus *Dioscoridis*, Cæs. lib. II. c. 63. pag. 472. *Raßen Münz/ Raßennapt*. Tab. Nept / *Zahm Raßen Kraut*. Sebitz. in Trag. *Borgemünz und Stein-Münz* Lon. *Marien-Nessel* *Nostratibus*. In pago *Laffstien* ad hortorum sepes.

CDXXXVIII. *Menthastrum* vel *mentha sylvestris altera*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 15. *Menthastrum* Matth. deutsch fol. 291. Dod. Lateinisch f. 96. Fuchf. fol. 292. Clus. Hist. lib. 4. fol. 32. Lob. ic. pag. 509. Cord. Hist. fol. 157. *Mentha sylvestris longiore foliô*. C. B. Pin. pag. 227. *Langblättrige wilde Ros-Münz*. *Mentha sylvestris* Gefh. hort. fol. 267. Lon. deutsch fol. 143. *Ros-Münz*. Brunf. deutsch fol. 254. *Menthastrum sylvestre*, Eyfett. *Mentha sylvestris altera*, Cæs. lib. II. cap. 64. pag. 473. *Wilde Münz/ oder Ros-Münz* Matth. *Raßen Balsam* Sebitz. in Trag. *Wild Balsam/ oder wilde Münz* Lon. *Bicubitalis* est planta, nonnunquam & longius excrefcit. Magnam vim obtinet calafaciendi ac resolvendi. Zu Langenheim am Graben. Item bey Schönbruch und Creuzburg am Mühlen Fluß. Item zu Glommen am Graben.

CDXXXIX. *Mercurialis spicata* sive *foemina*, *Dioscoridis* & *Plinii*. C. B. Pin. 121. *Mercurialis foemina* Dod. Lateinisch fol. 658. Matth. deutsch 541. Fuchf. fol. 473. Cam. in Matth. 434. Tab. lib. 2. fol. 254. Lob. Observ. fol. 131. Adv. Lob. fol. 100. *Phyllon Thelygonon* *Theophrasti*, Cord. in *Diosc.* fol. 59. *Mercurialis vulgaris* & *prima*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 151. *Bingel Kraut* Weib/

Weiblein Tab. Matth. Fuchf. Bengel. **Kraut** Sebitz. in Trag. **Rüh-Burg** / **Mercurius-Kraut** / **Rüh-Kraut** und **Scheiß-Kraut** vulgò. Incidit, emollit, abstergit, digerit, bilem & aquosos humores educit. Locis muliebribus subdita menses & secundas ejicit. Porta & genitalibus admota, mulierem foemellis generandis aptam reddit. Diosc. Mas è foliorum sinu in curtis petiolis coleos duos gestat, semini Aparines formâ & asperitate consimiles. Foemina spicas alit, racemosis flosculis onustas, absque fructu vel semine vanescentes. Ad hortorum sepes.

CDXL. Mercurialis montana spicata. C. B. Pin. pag. 122. **Mercurialis sylvestris foemina**, Cord. Hist. fol. 111. Thal. pag. 77. **Cynocrambe foemina**. Matth. Bauh. in Mat. fol. 891. **Cynocrambe sive Mercurialis foemina sylvestris**, Cam. hort. pag. 101. **Wild Bingel-Kraut** **Weiblein** Mat. **Im Sarkschen Gebirge** in opacis copiosissime. Item bey **Trunk** copiose. Ejus cauliculi exsiccati tractu temporis caelum acquirunt colorem.

CDXLI. Mespilus apii foliô sylvestris spinosa sive oxyacantha C. B. Pin. 454. **Cynosbatos** Theophrasti Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 771. Lon. deutsch fol. 60. **Oxyacantha** Tab. lib. 3. fol. 741. Lob. ic. pag. 200. o. Cæs. lib. 3. cap. 13. pag. 99. Cam. Hort. pag. 113. **Oxyacantha, acuta spina**, Matth. Cam. in Matth. fol. 46. **Oxyacantha Matthioli** Thal. pag. 81. **Sorbus aculeata** Cord. hist. fol. 176. **Spina** Appendix Plinii, Clus. hist. lib. 1. fol. 121. **Oxyacantha Dioscoridis** Cord. in Diosc. fol. 19. **Oxyacantha Dioscoridis & Plinii spina appendix**, Gesn. Hort. fol. 270. **Saurach** Tab. **Hagedorn** Matth. Sebitz. in Trag. Lon. **Mählbaum** Nostratibus. *Baccæ συνηκην, nuclei λι-*

Ἰαν Ἰριγίτην obtinent virtutem. Inter fruticeta in der Hollen = Grund passim.

CDXLII. Millefolium vulgare album C. B. Pin. pag. 140. Weiße gemeine Schaaff-Garbe. Millefolium vulgare Trag. Kyber. in Trag. pag. 477. Millefolium vulgò, Gesn. hort. fol. 268. Millefolium terrestre vulgare. Stratiotes Millefolium Dioscoridis Lob. ic. pag. 747. Militaris sive Millefolium flore albò Adv. Lob. f. 333. Millefolium flore albò Eystett. Cam. Hort. pag. 101. Millefolium album Brunf. Lateinisch fol. 171. Stratiotes millefolia, Fuchf. fol. 727. Millefolium terrestre majus, Cord. Hist. fol. 139. Tab. lib. 1. fol. 462. Millefolia stratiotes Cod. in Diosc. fol. 70. Achillæa & Millefolium Lon. deutsch fol. 267. Millefolium Thal. pag. 77. Millefolium sive Achillæa Dod. Lateinisch fol. 100. Groß-Garben-Kraut Tab. Feld-Garben/ Groß-Garben/ Groß-Schaaffriibb Lon. Schaaff-rip oder Gerwel Kyber. in Trag. Weiße Garb Brunf. In arenosis passim. Item am Wege nach dem Dorff Laffsten copiosè.

CDXLIII. Millefolium purpureum. Tab. lib. 1. fol. 463. Millefolium purpurei floris Dod. Lateinisch fol. 100. Millefolium vulgare purpureum minus C. B. Pin. pag. 140. Millefolium terrestre purpureis floribus Lob. ic. pag. 747. Militaris sive Millefolium flore purpureò Adv. Lob. fol. 333. Millefolium minus Matth. Bauh. in Matth. fol. 799. Millefolium vulgare flore diluti ruboris, Trag. Kyber. in Trag. 477. Millefolium rubrò colore, Clus. hist. lib. 3. pag. 331. Purpur-rotthe Schaaff-Garbe Tab. Am Kneiphöffschen Ball nach dem Brandenburgschen Thor zu.

CDXLIV. Millefolium aquaticum lenticulatum C. B. Pin. pag. 141. Fœniculum aquaticum galericulatum, Tab.

Tab. lib. 1. fol. 230. Millefolium aquaticum flore luteo galericulato Lob. ic. pag. 791 Wasserhelm-Kraut/ und Wasser-Fenchel Tab. Wasser-Garb mit geelen Blüthlein. Beym Kranz-Krug/ item in fossis nach dem Bretter-Krug zu. Siccat & vulnera solidat.

CDXLV. Millefolium aquaticum flosculis ad foliorum nodos C. B. Pin. 141. Myriophyllum aquaticum minus, Clus. hist. lib. 6. fol. 252. Clus. Pann. pag. 711. Knottigte Wasser-Garbe mit kleinen weißen Blüthlein. Thyrsus est rotundis numerosis nodis interceptis, radicationem capillaceis fibris impetrantibus. Singulis folia assistunt tenuissimè incisa, radicem versùs longiora, in cacumine breviora, quæ in caulium summitate ad quodvis geniculum flosculos gerunt candidos, octonis foliolis difficulter se explicantibus, instructos, tractu temporis in tubercula degenerantes. πολύκαρπον conspicitur Julio mense. In fossis bey der Hollen-Grund.

CDXLVI. Millefolium aquaticum filamentis foliaceis. Joh. Læf. Myriophyllum, Maratriphyllum palustre alterum. Lob. ic. pag. 790. Peucedanum aquaticum Tab. lib. 1. fol. 230. Millefolium aquaticum foliis foeniculi ranunculi flore & capitulò C. B. Pin. 131. Myriophylli species coliculis fluitantibus. Thal. pag. 77. Sademblättrigte Wasser-Garb/ Wasser-Fenchel/ der 4. Tab. Foliis est squalidis, strictis, oblongiusculis, teneris, filamentorum instar, coliculis in summo ex intervallo flosculis jam deciduis, fructus innascitur oblongus, subrotundus, tetrorchis sæpè, cujus cavo velut in cochleâ incurvum & flavescens corpusculum continetur. In der Sarkauschen Bäche.

CDXLVII. Millefolium aquaticum pennatum, spicatum

tum, quod 4. in Prodr. C. B. pag. 73. Matth. Bauh. in Matth. 813. Feder-Wasser-Garb. Hinter dem Altstädtschen Wall nach der Hollen-Grund zu in fossis.

CDXLVIII. Millefolium aquaticum, seu viola aquatica caule nudô, C. B. Pin. pag. 141. Wasser-Garb oder Wasser-Violen mit nackten Stengeln: fœniculum aquaticum secundum. Tab. Lib. 1. fol. 230. Myriophyllum alterum equisetifolium fluviatile Lob. Obs. fol. 460. Adv. Lob. fol. 354. Myriophyllum alterum Matth. Bauh. in Matth. f. 812. Viola aquatilis, Dod. Lat. fol. 584. Stratiotes fluviatilis Gesn. hort. fol. 283. der dritte Wasser-Fenchel Tab. die ander Fenchel-Garb. Matth. In lacunis passim.

CDXLIX. Mollugo montana angustifolia, vel Galium album latifolium C. B. Pin. 334. Mollugo vulgarior Herbariorum, Galion album quorundam Lob. ic. p. 802. Galion candidô flore. Cord. in Diosc. fol. 69. Cæs. lib. 8. c. 11. pag. 325. Gallion tertium, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 391, Gallion album, Thal. pag. 54. Mollugo prima Tab. lib. 1. fol. 538. Dod. Lateinisch fol. 354. Gallium flore albô, Cam. hort. pag. 63. Groß-Stern-Meger-Kraut. Tab. Breit-blättriges weißes Meger-Kraut und Wallstroh. Seb. in Trag. In arenosis bey Königsberg passim. An Mollugo montana sive secunda Dod. Lat. fol. 354. quæ in monte bey Duedenau reperitur?

CDL. Muscus terrestris vulgaris Lob. ic. pag. 242. o. Muscus palustris. Dod. Lateinisch fol. 472. Muscus vulgarissimus C. B. Pin. pag. 360. Muscus hortensis Trag. Kyber. in Trag. pag. 946. Gemein Erd-Moß. Im Gebrûch bey Lauten-Nühl copiosè. Flore ut plurimum purpureo ibi repertus.

CDLI. *Muscus pennatus*: in prodr. C. B. pag. 151.
Wald-Feder-Moß. In petrosis ac sylvis frequens est.

CDLII. *Muscus pennatus* tectis vetustis insidens
 Joh. Læf. **Feder-Moß/** so auff den alten Dächern sitzt. Vi-
 ticulis suis brevibus ac ramosis latè serpit hic muscus, foliis-
 que minutis pennam æmulantibus exornatur. Color ejus
 ex luteo virescit. Adnascitur etiam haud rarerer muris in
 senio constitutis.

CDLIII. **Muscus pennatus* major cauliculis ramo-
 sis in summitate velut spicatus, Joh. Læfel. **Gespizter**
großer Feder-Moß mit ästigen Stengelschen. Im Löbe-
 nischsen Walde.

CDLIV. **Muscus pennatus* minor cauliculis ramo-
 sis in summitate velut spicatus. Joh. Læfel. **Gespizter**
kleiner Feder-Moß mit ästigen Stengelschen. Cauliculi e-
 jus textiles quasi sunt minutiis ac contortis foliolis copiose
 ornati. Ramosi adhæc cauliculi, parvulas quasi spicas in
 summitate habentes. Viridis est muscus, sed quâ terram
 spectat ferrugineus. Im Löbnischsen Wald.

CDLV. **Muscus filicinus* minor repens. Joh. Læf.
Klein kriechender Waldfahren-Moß. Viticulis est exiguis,
 ramulosis, per terram serpentibus, in summitate velut spi-
 catis, foliolis viridiusculis, tenerimè dissectis. Radicationem
 fibris tenellulis refert acceptam. Bey Lauren-Mühl
 im Walde.

CDLVI. **Muscus bifolius* procumbens foliis sub-
 rotundis Joh. Læf. **Zweyblättriger liegender Moß mit**
breiten rundlechten Blättern. Tenellula radix viticulas
 promit humi procumbentes, foliolis binis subrotundis, vi-
 ridiusculis, arctè se insequentibus, instructas ad latera pul-
 lulum

lulum sæpe seu ramusculum extrudentes. Im Löbnichtschē Walde.

CDLVII. *Muscus ramosus erectus oblongifolius Joh. Læfel. Moß mit breiten länglichten Blättern. Ex radiculâ villosâ, nigricante cauliculus exit foliosus, in summitate ramosus, foliolis oblongis, latiusculis, virentibus numerosis, alternè incedentibus vestitus. Tenerior adhuc ramulis destituitur. Bey Selnicken oder Sunnicken.

CDLVIII. *Muscus erectus foliis in orbem sparsis Stern-Moß. Thyrsulis nascitur uncialibus sæpe & majoribus, quorum summo foliola insident amœnulè in orbem disposita, virentia & acuminata. Bey Selnicken.

CDLIX. Muscus uvida amans foliis subrotundis expansis. Joh. Læfel. Wasser-Moß mit runden ausgebreiteten Blättern. Cauliculis crescit nigricantibus, quibus foliola adhærent subrotunda, viridia, aliquantulum crispa, alternatim sibi succedentia. Radiculæ tomentô quasi quodam subnigricante obducuntur. Im Gebrüch beyrn Sarfäuschen Krüge.

CDLX. *Muscus cupressiformis ramosus. Joh. Læf. Nestiger Cypressen-Moß. Cupressus quasi est, incanus, ramulosus, ramusculis intus cretulae in modum candidis, quæis indiscreta granulorum congeries assistit. Validissimè siccatur, attritu digitorum in pollinem cinereum actus. Beym Löbenichtschē Walde.

CDLXI. *Muscus membranæ pilosus. Joh. Læfel. Dünner haarichter Baum-Moß. Assulatim adhæret corticibus arborum, musci pulmonarii instar, foris totus hirsutus & incanus, subtus membranæ & albidus. Im Löbnichtschē Walde.

CDLXII.

CDLXII. Muscus erectus ramosus saturè viridis C. B. Pin. pag. 360. Selago tertia, Thal. pag. 116. *Meir* femau Nostratibus. Thyrsulus est ad radicem arctim conjunctis, superius verò latius à se invicem disjunctis, in summo plerumque divaricatis, foliolis saturatè viridibus, quæ inter granula quædam asservantur. Iulos petiolis insistentes suis, quales muscus clavatus profert, edit nullos. Ruptis, sugillatis, & præcipitatis auxiliò est. Purgat fortiter, tineas necat, menses citat, & foetus expellit, hinc ægrè distrahitur in officinis. Equorum usitatissimum est medicamen. In der Fischehäusischen Heyde.

CDLXIII. Muscus terrestris clavatus C. B. Pin. pag. 360. Muscus clavatus Lob. ic. pag. 242. o. Muscus terrestris Trag. Kyber. in Trag. pag. 555. Matth. deutsch fol. 16. Muscus terrestris, sive Licopodium Dod. Lateinisch fol. 472. Lycopodium Tab. lib. 2. fol. 487. Selaginis species altera, Thal. pag. 116. Chamæpeuce Cord. hist. fol. 111. Musci genus, quod pro spicâ Celticâ vendebatur Cæs. lib. 16. cap. 21. pag. 602. Beer Lapp Kyber. in Trag. Matth. Ragen-Leiterlein. Tab. Gürtel-Kraut/ Seil-Kraut/ Haar-Schaar und Teuffels-Klauen Dod. Löwen-Fuß / Neunheil und Neungleich quibusdam.

Clavi hujus plantæ pulverem reddunt elegantissimum, Plaun Russis dictum, quem distrahunt vesicæ bubulæ inclusum. Clavos Augustò mense maturatos copiosè colligunt, in furno siccatos, tundunt ac pulvisculum excutiant, quem in vulneribus & ulceribus siccandis commendatissimum habent, ac intertrigine infantum etiam nihil albo præferunt. Adhæc Russi pulvisculò hœc ignes suos celebrant Chalda-

cos, flammæ eo excitantes aspectu ludicras. Pixidulæ laminæ, ulnæ dimidiatæ longitudine ac Pyramidis formâ, Plaun istud ingerunt, orificio admotâ seu face seu candelâ, post pixidulum deorsum impetu quodam trahendo commovent, ut pulvisculus lychnum tangat, & in flammæ vertatur. Id ubi multoties iteratur, flammis subinde novis excitatis jucundum redditur adstantibus spectaculum. Sunt & qui tubulum Tabaci Plaun hâc complent admistâ aliâ pulvere, & inter scyphos convivis flammæ offerunt cum stridore insperatas. Mirum est, pulverem hunc non accendi igne, nisi insuffletur. Olearius in descript. Itineris Persici pag. 331. In locis umbrosis inter ericeta passim. Item in der Fischhäusischen Heyde.

CDLXIV. Muscus clavatus foliis cupressi C.B. Pin. 361. Savina sylvestris Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 441. Savina sylvestris Tragi, Gesn. hort. fol. 278. Sabina sylvestris Lon. deutsch fol. 213. Chamæcyparissus Tab. Lib. 3. fol. 649. Savina Tragi sylvestris seu filaginis Plinianæ prima species, Thal. p. 115. Bald-Cypress Tab. Bald-Sadenbaum Sebitz. in Trag. Lon. Gertlein / Gertel / Gertwurz / und Schoßwurz quibusdam. Wilder Sadenbaum Nostratibus. Calefacit & siccât. Contra oculorum vitia suffitu prodest. Hinter der großen Glas Hütt im Scapen / in ericetis.

CDLXV. Muscus Coralloides muralis Joh. Lœfel. Maur-Moß. Cinerei est coloris, ac muris ad eò firmiter adhærescit, ut baculô decussus aliquid lateritiæ substantiæ radicis locò secum auferat. Non inutile credo in hæmorrhagiâ

rhagiâ, & fortè Ulnæ Cranii præferendum. In pago Mar:
genau an der Kirch.

CDLXVI. Muscus Pyxioides terrestris C. B. Pin.
pag. 361. Büchsenformiger Erd-Moß. Muscus terrestris
pyxidatos alabastriculos imitatus. Lob. ic. pag. 267. o. In
der Fischhäusischen Heyde/ in Ericetis passim.

CDLXVII. Muscus pyxioides saxatilis, in Prodr. de-
scriptus C. B. pag. 152. Büchsenförmiger Stein-Moß/ Sa-
xis passim adnascitur.

CDLXVIII. Muscus terrestris Coralloides erectus
incanus, C. B. in Prodr. pag. 152. Gerader grauer Coral-
len-Moß/ bey dem Löbnichtschen Walde.

CDLXIX. Muscus terrestris Coralloides erectus,
cornibus rufescentibus C. B. in prodr. pag. 152. Ge-
rader Corallen-Moß/ mit röthlichen Hörnern. In locis ari-
dioribus inter ericeta nach dem Löbenichtschen Walde zu.

CDLXX. *Muscus arboreus pyxioides pilosus Joh.
Lœf. Hårigter Büchsenformiger Baum-Moß. Incanus est to-
tus, ramusculis instructus plurimis, pilosis, ac velut in cor-
nua dislectis, qui vel ad latera, vel in fastigio passim tubulos
gestant, sed depiles, quales in pyxioides terrestri. In Qver-
cubus bey Selnicken und im Löbnichtschen Walde.

CDLXXI. Muscus capillaceus cinerei coloris è ra-
mis ilicis dependens, Clus. Hist. In Indice apud Clus. non
est. Muscus capillaceus longissimus C. B. Pin. pag. 361.
sehr langer Aschfarber Baum-Moß. In sylvis passim, item
in der Fischhäusischen Heyde.

CDLXXII. Muscus arboreus, Trag. Kyber. in Trag.
pag. 946. Matth. Bauh. in Matth. fol. 65. Thal. pag. 77.
Dod. Lateinisch fol. 471. Muscus arboreus. Ulnæ officina-

rum C. B. Pin. pag. 361. Muscus Cord. in Diosc. fol. 7. Muscus arborum Tab. Lib. 2. fol. 482. Lon. deutsch fol. 87. Muscus quernus Lob. ic. p. 242. Baum-Moß. Tab. Moos oder Baum-Moos Lon. Eichen-Moß quibusdam. Pinus & abietinus, isque candidus melior censetur quernô. In sylvis passim obuius.

CDLXXIII. Muscus pulmonarius, sive pulmonaria Officinarum Lob. ic. pag. 248. o. Pulmonaria, Trag. Kyber. in Trag. pag. 524. Tab. Lib. 2. fol. 259. Fuchf. fol. 637. Dod. Lateinisch fol. 474. Lon. deutsch fol. 247. Pulmonaria tertia, Clus. Pann. pag. 675. Pulmonaria secunda, Bauh. in Matth. fol. 733. Pulmonaria vulgaris Thal. pag. 89. Pulmonaria Lichenis quoddam genus, Cæs. Lib. 16. c. 20. pag. 602. Lungen-Kraut. Tab. Matth. Lon. Fuchf. Eichen-Lung Rusticis. Passim in sylvis.

CDLXXIV. Muscus pulmonarius corpusculis fuscis papillatus. Lungen-Moß mit dunkeln Warzeln. Im Löbenichtschen Walde.

CDLXXV. *Muscus marinus λιθοπύγων dictus Johan. Lœf. Meer-Moß oder Steinbart. Ex numerosissimis villis, modò latiusculis, modò tenuissimis barbæ instar à lapide pendentibus, eidemque firmissimè annatis, constituitur, qui siccati crispuli fiunt filamentis contractis. Color jam subviridis est, jam purpureus, jam albicans. Barbati hi lapides in littore maris frequentes. Bey Germau an der See.

CDLXXVI. Muscus marinus capillaceus, Joh. Lœf. Langer See-Moß. In littore maris.

CDLXXVII. *Muscus aquaticus Ceratoides, Johan. Lœf. Gehörnter Wasser-Moß. Septem octôve uncia-

ciarum sæpè est, sæpiùs minor, totus ex atrò virens, nonnunquam & incanus, thyrsis rotundis, spongiosis, ramulosis, in extremitate trifidis, quadrifidis, cornua quasi quædam effigie exprimentibus. Lignis putridis adnascitur sub aquis, & putidulus seu graveolens existit, vel diutulè servatus vel etiam siccatus. Im Mühlen-Fluß zu Schwanis. Item zu Kahlhoff im Teich bey der Kupffer-Mühlen.

CDLXXVIII. *Muscus aquaticus denticulatus, Joh. Læf. Zähnigter Wasser-Moß. Ramosus est, sub aquis fluitans, saxis nonnunquam & lignis firmiter annatus, foliis exiguis, numerosis, subviridibus, ex oblongò in acumen abeuntibus, quæ trinâ constitutâ serie cauliculos ita ambiunt, ut quasi trifulci appareant. Im Fluß Zahin bey Glaubitzten. Item Zu Bladan im kleinen Bächichen nach Neuhausen zu.

CDLXXIX. *Muscus aquaticus bombycinus retiformis Joh. Læf. Subtiler Netz-förmiger Wasser-Moß. In fossis nach dem Bretter-Krüge zu.

CDLXXX. *Muscus aquaticus bombycinus tenuissimis filamentis Joh. Læf. Wasser-Moß von ganz zarten Fädemchen. In fossis nach dem Bretter-Krüge.

CDLXXXI. Muscus aquaticus tenuissimis foliis, cauliculis adhærentibus Joh. Læf. Wasser-Moß mit ganz kleinen subtilen Blätterchen. Bey Robitten in paludibus. Muscus hic in locis udis natus & exsiccatus tectis inservit, suppositus lateribus Vieber-Schwäns vocatis. Soll bessere und dichtere Dächer geben / als wenn die Ziegel mit dem besten Kalk verschmieret würden.

CDLXXXII. Muscus aquaticus subterraneus Johan. Læf. Langer Wasser-Moß / so tieff unter der Erden gestanden.

den. In prædiô Wandlacen anno 1648. puteum dùm fodiunt, vena offenditur ampla, exsultim ludentem copiosè exspuens aquam. Cujus profunditatem contò ligneò, orgyas duas longò ubi explorare desudant, contus abyssò delusus, non solùm impete vastò ab aquâ derepentè redditur, sed & unà muscus quidam incognitus, cubitò longior egeritur, quem putearii & infruniti adstantium animi negligentius habuère, terrâ eum statim obruentes.

CDLXXXIII. *Myagrum filiquâ longâ*. C. B. Pin. pag. 109. *Lein-Dotter mit langen Schoten*. Cameline, *Myagrum alterum Thlaspi effigie* Lob. ic. pag. 225. *Myagrum secundum Lobelii* Tab. Lib. 2. fol. 538. *der ander Leindotter* Tab. Cauliculis est rotundis, striatis, asperis, sæpius virentibus, quandoque rufescentibus, quorum fastigiis quadrangulæ filiquæ nanis flosculis luteis succedentes, ac pedicellis suis fultæ insistant. Folia oblonga & exiliter sinuata, aspera sunt. Radix contortula ac filamentis instructa albicat. Passim bey Königsberg.

CDLXXXIV. *Myagrum fativum* C. B. Pin. pag. 109. *Myagrum primum* Tab. Lib. 2. f. 358. *Pseudomyagrum* Bauh. Matth. fol. 815. *Linaria quinta* Trag. Sebitz, in Trag. deutsch fol. 283. *Myagrum adv.* Lob. f. 115. *Sesamum* Lon. deutsch f. 189. *Camelina sive Myagrion* Dod. Lateinisch f. 532. *Camelina Dodonæi seu Myagrion* Thal. p. 28. *Dorella*, Cæs. Lib. 8. cap. 79. pag. 367. *Leindotter oder Glachs-Dotter* Lon. *Glachs-Kraut* quibusdam. Lino passim se admiscet. Utrum hoc *Sesamum* in *Linum* degeneret, notandum.

CDLXXXV. **Myagrum monospermon hirsutum* filiquis rotundis. Joh. Læf. *Myagri* duæ species. Cam. in

in Matth. deutsch f. 454. Rauger Leindotter mit runden Schöttlein. Bicubitali quandoque est caule, viridi, proximè radicem digitum minimum crasso, concavô, hirsutô, striato ac ramosô. Foliis Thlaspi hirsutæ asperis, acuminiatis, in exortu lobis duobus caulem amplexantibus: flosculis in ramorum fastigiis nanis, luteis foliolis quatuor instructis, quos deciduos excipiunt plusculæ capsæ virescentes, duriusculæ, ex lato rotundatæ: petiolis longis innitentes, filamento in apice exili, quæ diffractæ in singulis theculis unicum asservant semen. Radix ei albicans lignosa, paucis fibris. Floret mense Julio, imò & Octobri illud floruisse memini. Hinter dem Kneiphöfischen Wall im Stadtgraben.

CDLXXXVI. Myrrhis sylvestris feminibus lævibus C. B. Pin. pag. 160. Cicutaria Gesn. Hort. f. 253. Lon. deutsch f. 266. Myrrhis Fuchs. f. 525. Myrrhis sylvestris Cam. Hort. pag. 104. Busch-Mören mit glatten Saamen. Busch-Mören oder Kälber-Korn Lon. Wilde Körnel Fuchs. Kälberkropff Nostratibus. Radix menses & secundas ejicit, pulmonum ulcera abstergit ac solidat. Bey Königsberg copiosè.

CDLXXXVII. Myrrhis sylvestris feminibus asperis C. B. Wilder Körnel mit scharffen Saamen. Myrrhis sylvestris nova Æquicolorum. Colum: min. cogn. stirp. & rar. pag. 113. part. I. Busch-Möhren mit raugen Saamen. Passim am Königsbergschen Wall.

CDLXXXVIII. Myrrhis sylvestris inodora Joh. Lœf. Wilder Körnel/ so keinen Geruch hat. Im Gepusch bey Blatau.

CDLXXXIX. Nasturtium aquaticum Dod. Lateinisch Y 3 f. 592.

f. 592. Lon. deutsch f. 144. *Nasturtium aquaticum* & secundum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 82. *Nasturtium aquaticum supinum* C. B. Pin. pag. 104. *Sion Cratevæ Erucaefolium* Lob. ic. pag. 209. *Sisymbrium aquaticum* Bauhin. in Matth. f. 379. Cæs. Lib. 8. cap. 68. pag. 362. *Sisymbrium aquaticum primum* Tab. Lib. 2. f. 167. *Sisymbrium Cardamine*, Fuchs. fol. 723. *Sisymbrium alterum* Cord. in Diosc. f. 45. *Sisymbrium alterum Dioscoridis*. Gefn. hort. fol. 281. die Iste Brunn-Kreß. Tab. Kyb. in Trag. Fuchs. Brunn-Kreß oder Wasser-Kreß Lon. Ad marginem des Penartischen und Löbenichtischen Waldes in fossis, item hinter Selnicken am Land-Graben zwischen Lenzen und Dörckten. Folia nonnihil quandoque laciniata sunt. Folia colligenda Sole in 8 versante, flores in 1. ☉.

CDXC. *Nasturtium pratense vel tertium*. Trag. Kyber. in Trag. pag. 83. *Nasturtium pratense magnò flore* C. B. Pin. pag. 104. *Nasturtium aquaticum simplici flore* Eystett. *Sisymbrium aquaticum secundum* Tab. Lib. 2. f. 168. *Iberis* Fuchs. ic. pag. 185. *Cardamine altera simplici flore*, Clus. hist. Lib. 5. f. 128. *Cardamine altera sive Sisymbrium Cardamine secundum* Lob. ic. pag. 210. *Nasturtium agreste* Fuchs. fol. 325. Lon. deutsch f. 195. *Sisymbrium aquatico non absimilis*. Cæs. Lib. 8. cap. 68. pag. 362. Gauch-Blum Brunf. deutsch f. 131. flosculi Dod. Lateinisch f. 592. *Iberis sive Dardamantice Nasturtii foliò*, Thal. pag. 60. *Lepidium minus* Cord. in Diosc. f. 48. Gauch-Blum Lon. Fuchs. Die andere Brunn-Kreß. Tab. Wiesen-Kreß mit großer Blüth. In riguis passim bey Königsberg.

CDXCI. *Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum* C. B. pin. pag. 105. Wilde Kreß oder Sophien-Kraut mit ganz

ganz kleinen zertheilten Blättern. Sophia Chirurgorum Lob. ic. pag. 738. Sophia Dod. Lateinisch f. 133. Nasturtium sylvestre Gesn. hort. f. 268. Thalictrum, Herba Sophia latifolia, Tab. ic. pag. 6. Seriphium Germanicum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 338. Seriphium absinthium Fuchf. fol. 2. Seriphium Lon. deutsch f. 184. Thalictrum Dodonæi, seu Sophiæ, & Nasturtium *μυριόφυλλον* Thal. p. 121. Accipitrina Cæs. Lib. 8. cap. 66. pag. 361. Wellsaamen Lon. Kyber. in Trag. Sophien-Kraut-Männlein Tab. Semen ejus officinis est semen sangvinariæ. In incultis bey Königsberg passim.

CDXCII. Nummularia major lutea C. B. Pin. pag. 309. Nummularia Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 637. Matth. Bauh. in Matth. fol. 716. Dod. Lateinisch fol. 600. Eystett. Cam. hort pag. 107. Numularia Lon. deutsch fol. 239. Cæs. Lib. 6. cap. 56. pag. 261. Centummorbia, Fuchf. f. 401. Nummularia sive Centmorbia, Lob. Adv. ic. p. 474. Numularia Tab. Lib. 2. fol. 547. Egel-Kraut Fuchf. Groß und klein Egel-Kraut Tab. Egel-Kraut/Pfennig-Kraut/ und klein Natter-Zung Lon. Schlangenkraut quibusdam. Wasser-Polley vetulis. In locis humidis circa fluentia passim.

CDXCIII. Nymphaea lutea major C. B. Pin. p. 139. Große gelbe See-Rannen. Clus. Hist. Lib. 4. f. 77. Nymphaea lutea Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 552. Dod. Lateinisch fol. 585. Lon. deutsch fol. 213. Matth. deutsch fol. 372. Lob. ic. pag. 594. Tab. Lib. 2. f. 413. Fuchf. fol. 536. Eystett. Nenuphar luteum, Brunf. Lateinisch tom. I. fol. 38. Nymphaea citrina. Cord. Hist. fol. 99. Nymphaea altera Cord. in Diosc. f. 59. Nymphaea altera flore ex toto luteo Cæs.

Cæs. lib. 11. cap. 7. pag. 568. Geele See-Blum Tab. Seb. in Trag. Fuchf. Matth. Geele See-Blumen / Kellernurß / Reulwurß / Wasser Mohu / Haarnurß und Herculis Wurß. Lon. Haarnurß und Wasser-Lilien quibusdam. Geele Mummeln Nostratibus, item geele See-Rannen. In aquis stagnantibus passim. Folia Nymphææ infensas sibi habent erucas, hinc rarò folium invenitur non erosum aliquâ sui parte. Erucæ illæ albicant, & inter duo foliorum frustula, quæ erodendò abstulerunt, nave quasi constructâ, delitescences super aquis vehuntur.

CDXCIV. Nymphæa lutea minor parvò flore C. B. Pin. pag. 194. An Nymphæa parva alia Cam. in Matth. fol. 306. Nymphæa lutea minor Septentrionalium. Lob. ic. pag. 595. Kleine gelbe Seekannen in fossis nach dem Bretter Krug zu.

CDXCV. Nymphæa alba major. C. B. Pin. p. 193. Nymphæa alba Matth. deutsch fol. 372. Dod. Lateinisch f. 585. Tab. lib. 2. fol. 412. Cord. hist. fol. 59. Thal. fol. 80. Lob. ic. pag. 595. Lon. deutsch fol. 212. Nymphæa candida Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 552. Fuchf. fol. 535. Nymphæa alba, Lotus Ægyptia Alpini. Clus. hist. lib. 4. fol. 77. Nymphæa major alba, Eystett. Nenuphar album, Brunf. tom. 1. fol. 38. Weiße See-Blum Matth. Lon. Tab. Fuchf. Weiße See-Rannen / und weiße Mummeln Nostratibus. Refrigerant flores & humectant. Radix vinò nigrò docta potu immoderatum mensium fluxum efficaci ac certo remedio sistit. Porcis ægrotantibus offertur à Nostratibus. In fossis & piscinis passim.

CDXCVI. Nymphæa alba minima. C. B. Pin. pag. 193. Morsus ranæ Dod. Lateinisch fol. 583. Lob. ic. pag. 596. Nym-

Nymphaea alba minor, Tab. Lib. 2. fol. 412. Kleine weiße See-Blum Tab. Grosch-Biß. In fossis nach dem Bretter Krüge zu.



CDXCVII. Ocimum vulgatius C. B. Pin. pag. 226. Ocimum sive Basilicum medium vulgatius Lob. ic. pag. 503. Ocimum medium vulgatius Adv. Lob. fol. 215. Ocimum medium Matth. deutsch f. 197. Eystett. Cam. in Matth. f. 164. Ocimum magnum, Tab. ic. pag. 343. Basilica minor & Baccharis Germanica. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 23. Ocimum mediocre, Fuchf. fol. 548. Ocimum tertium & medium Cæs. Lib. 11. cap. 59. pag. 469. Mittel Basilien Matth. Fuchf. Klein Basilgen Sebitz. in Trag. Groß Basilien Thab. Hinter dem Wall bey der Haberbergischen Kirche. Item bey Lauten-Mühl inter segetes.


CDXCVIII. Onobrychis floribus viciæ dilute cæruleis C. B. Pin. pag. 351. Onobrychis secunda, Clus. hist. lib. 6. fol. 239. Clus. Pann. pag. 753. Onobrychis Clusii secunda, Tab. Lib. 2. fol. 214. Hanen-Kopff mit licht-blauen Wicken-Blühmlein. Ad littus maris bey S. Albrecht. Item zwischen dem Sand und Dimpel Krüge. In arenosis.

CDCXIX. Ophioglosson, Matth. Bauh. in Matth. fol. 447. Trag. Kyber. in Trag. pag. 323. Dod. Lateinisch fol. 139. Thal. pag. 81. Cam. hort. pag. 110. Eystett. Ophioglossum Lon. deutsch f. 132. Tab. Lib. 2. f. 519. Fuchf. fol. 577. Lancea Christi & Ophioglossum Gesh. hort. fol. 263. & 269. Ophioglossum vulgatum C. B. Pin. f. 354. Lingva serpentina, Cæs. Lib. 16. cap. 17. pag. 600. Ophioglosson, sive Enophyllum. Lob. ic. pag. 808. Lingula vulneraria Cord. Hist. fol. 153. Matter Zünglein Kyber. in Trag. Z Tab.

Tab. Lon. Fuchf. Im Dollkeimischen Roß-Garten in mufcosis, mense Juniô. Variat lingulâ, quæ communiter simplex, quandoque duplex vel triplex. Manû subdulcis est herba & glutinosa nonnihil. Radix cum amarore subacris, exsiccat cum exiguo calore, tumores discutit, recentia & maligna vulnera glutinat, Phitificos, hæmoptoicos ac herniosos egregiè juvat, pota vel admota. Chirurgi plantam oleo macerant, quò diutiùs insolato post felicissimè utuntur. Ab apibus læsum succas illitu curat. In loca hortorum umbrosa translata durat.

D. Ophris bifolia C. B. Pin. pag. 87. Ophris Bauh. in Matth. f. 846. Fuchf. f. 566. Tab. Lib. 2. f. 396. Cæs. lib. 10. cap. 48. pag. 430. Bifolium Adv. Lob. ic. pag. 302. Cam. hort. pag. 28. Lon. deutsch f. 269. Alisma Gesn. hort. fol. 245. Bifolium & Satyrion decimum. Trag. Kyber. in Trag. p. 734. Pseudoorchis, Bifolium Dod. Lateinisch fol. 242. Perfoliata mascula Brunf. Lateinisch Tom. I. fol. 182. Zwey-Blatt Tab. Matth. Fuchf. Lon. Durchwachs-Männlein Brunf. In uliginosis ac tenebrosis beyhm Kranz-Prun-ge. Item beyhm Penartischen Walde.

DI. *Ophris  bulbosa. Joh. Læf. Einblatt mit zwieblechter Wurzel. Radix bulbosa & fibrosa, cui  interdum bulbulus alius cauliculum simplicem & rotundum exire patitur, spithamæ longitudine, sæpè & productiorem, folium latum & oblongum præstò habentem, cacumen versùs numerosis instructum capsis, tenui pediculò fultis, quibus flosculi paulò antè infederant. Bey Rositten im Gebrüch.

DII. *Ophris  bulbosa, Joh. Læf. Bifolium bulbosum Dod. Lateinisch f. 242. Ophris bifolia bulbosa

C. B.

C. B. Pin. pag. 87. *Zwey-Blatt mit zwieblechter Wurzel.* Radix bulbosa uvam veluti quandam adstitem habet uvæ crispæ ferè assimilem, stipulam exilem sursum efferentem. Exilior est priore, utraque ophris defloruerat, ubi eas acciperam. Ad rupta & vulnera glutinanda efficax. *Hinter Fischhausen auff der Wiesen nach Lochstätt zu.*

DIII. Orchis alba bifolia minor calcare oblongo C. B. Pin. pag. 83. testiculus vulpinus primus, cujus flores culices expriment Lob. ic. pag. 178. Testiculus vulpinus latifolius Tab. lib. 2. fol. 349. Orchis bifolius Cam. hort. pag. 111. Orchis flore albô minor Eystett. Testiculus bifolius Cord. Hist. fol. 150. Orchis Serapias primus Dod. Lateinisch fol. 237. *Fuchs-Hödlein oder Fliegen-Blumen* Tab. Standhart vetulis. In locis herbosis beyhm Penartischen Walde.

DIV. Orchis palmata palustris tertia C. B. Pin. pag. 86. Palma Christi palustris secunda, Tab. lib. 2. fol. 357. Cynosorchis palustris lævi folio & angusto, seu Leptophylla omnium vilissima C. Gemmæ Lob. ic. pag. 193. *Wasser-handleins-Wurz* Tab. mit glatten schmalen Blättern. In riguis bey dem Penartischen Walde.

DV. Orchis palmata pratensis maculata C. B. Pin. pag. 85. Palma Christi maculata Tab. ic. Eystett. Satyrium foemina foliis maculatis Thal. pag. 113. Orchis foemina altera Trag. Sebitz, in Trag. deutsch fol. 616. Palma Christi. Serapias foemina pratensis Lob. ic. pag. 188. Satyrium foemina Swert, florileg. part. I. fol. 63. Satyrium Basilicon Græcorum, officinarum Christi palma Ruell. fol. 564. Orchis Serapias Lobelii Cam. hort. pag. 111. Satyrium Basilicon foemina Lon. deutsch fol. 234. Dod. Lateinisch fol. 240.

Palma Christi, Cord. hist. fol. 130. Cæs. lib. 10. cap. 47. pag. 430. Händlein-Burz/Creuz-Blum Tab. Creuz-Blum-Weiblein Kyber. in Trag. Lon. Gesprenge Händlein-Burzel Nonnullis. In riguis beyrn Penartschen Walde copiosè.

DVI. *Orchis palmata flore galericulatò dilutè viridi. Joh. Læf. Händlein-Burz mit gehelnter lichtgrüner Blüth. Coliculum effert novem unciam in longitudine, striatum, pallidè virentem ac lævem, cui folia assistunt plantaginis nervosæ facie, quorum ima terræ appronata majora ac rotundiora, cætera thyrsi in progressu servientia, minora & acutiora. Flosculis in fastigio est galericulatis, labro prominulo, scrophulariæ aquaticæ quoquo modo æmulis, infimâ parte rubentibus, supernâ pallidè virentibus, ac foliolis suffultis. Radix variat, quæ modò palmata est, modò egregiè digitata. Convenit ferè cum Orchide palmatâ, flore viridi, C. B. in prodr. pag. 30. descriptâ. Floret mense Juniò. Im Grönhöfischen im Dollkeimischen Ros-Garten.

DVII. Orchis palmata palmis inversis flore albò, Joh. Læf. umbgekehrte Händlein-Burz mit weißer Blüthe. Caulis hujus orchidis undecim uncias longus est geniculatus, foris candidus ac splendens, concavus intus, cujus geniculis foliorum locò valva quædam apponitur, ad fuscum nonnihil devergens colorem. Fastigio thyrsi mense Julio flosculi insident galericulati, candidi, effigie muscas ferè referentes, quibus quinque alia subflava ac semiunciam longa assistunt folia. Tota florum compages petiolò nititur exili, cui ad geniculum caulis unicum substernitur foliolum oblongum & acuminatum. Radix fusca est ac palmata, ex fru-

frustulis quatuor constituta, quæ in summo bifida, trifida ac quadrifida, palmas erectas ferè facie præsentantia. *Hinter Kraßsen im Walde. Menſe Julio.*

DVIII. *Orchis muscam referens major.* C. B. Pin. pag. 83. Testiculus muscarius quartus Tab. Lib. 2. f. 346. *Orchis Myodes altera, foliò læviore & flore grandiusculò Lob. ic. pag. 182. Brauntothe glatte Fliegen Ständel Wurß mit großer Blüth; Die vierdte Ständel Wurß Tab. Beym Kranß Krüge und Noednau. Radicibus utuntur officinæ in conficiendo electuario.*

DIX. **Orchis muscæ corpus referens maculosa.* Joh. Lœf. *Flechticht Fliegen Ständel Wurß.* Radix geminò bulbò, quorum alter turgidus & albus, nucis moschata magnitudine, cauli modò affirmatur tenellis duobus filamentis, & capsulâ quasi quâdam, in summo bulbi enatâ, exortis; modò absque mediò thyrsò nequitur: alter flaccidus totus, rugosus & succo inanitus, thyrsò tenaciter jungitur, villis longiusculis dependentibus instructus. Caulis erat viridis, semicubitum proceritate superans, rotundus, cavus, striatus, fastigium versùs contortus, cui flores initio purpurascens, temporis lapsu albescentes, è volvis oblongis, viridibus & contortis, cauli indiscriminatim & copiosè adstantibus, quæ singulis foliolum subservit viride, exeunt. Labellum florum inferius in quatuor elegantissimè divisum est partes, pronâ facie albicans, maculisque purpureis insignitum, aversâ candidum, lobum exilem purpurascentem, sapiùs album, & nonnihil inflexum imâ parte alens. Superius flos seu galea quina alit folia, quorum tria suprema majora, duo sub se alia minora abscondunt, convexâ parte purpurei, simâ pallidi coloris, in meditullio corpusculum sublatus

sæpe pallidum, musca capitulum referens, concludentia. Cæterum grandiora proximè terram folia nervosa sunt, ex quibus unum vel alterum in medio caulis constituta eundem fotu suo velut in vaginâ conclusum servant ac tuentur. Grandior radicis bulbus viscidæ succi, gustu subdulcis est initiô, mox acredine quantillâ lingvam vellicat, adstrictionem qualem qualem post se relinquens. Floret mense Majo, & Juniô incipiente. *Bey Lauten-Mühl.*

DX. **Orchis coleô unicô*, seu *Monorchis flosculis* pallidè viridibus Joh. Lœf. *Einhödlein-Wurz mit lichtgrüner Blüth.* Plantula est septem unciarum & pauciorum sæpe altitudine, thyrsulô exili striatô, foliis propè terram binis, coliculum amplexantibus, quæ in processu thyrsi foliolum succedit acuminatum: flosculis in summitate est pallidè virentibus, thecularum effigie, in ambitu foliosis. Radix coleô unicô ac transparente ferè, filamentis quibusdam crassiusculis superbit. Floret mense Junio. *Im Grönhöffischen und Dollkeimischen Ros-Garten.*

DXI. *Orchis abortiva fusca* C. B. Pin. pag. 86. *dunkel- le mißgebürtige Knaben-Wurz.* Nidus avis ex speciebus *Satyrii abortivi.* *Orchis abortiva* Lob. ic. 194. *Eystett.* *Satyrium abortivum* species *Hypocyti* Lob. ic. pag. 271. o. *Satyrium novum* Trag. Sebitz, in Trag. deutsch fol. 620. *An Orobanche prima* Tab. Lib. 2. fol. 358. *Orchis sylvestris* Lon. deutsch fol. 233. *Orchis abortiva Lobellii.* Clus. hist. lib. 2. fol. 270. *Neottia* Dod. Lateinisch fol. 553. *das neunde Margendrehen.* Sebitz, in Trag. *Bild Knabenwurz* Lon. *Im Buch-Walde zwischen Schwanis und Persch- Fe/ in umbrosis.*

DXII. *Origanum vulgare* Trag. Sebitz, in Trag. deutsch


Deutsch fol. 29. Matth. deutsch fol. 284. Lon. deutsch fol. 148. Eysett. Oryganum Sylvestre. Cunila bubula Plinii C. B. Pin. pag. 223. Agrioriganum sive Onitis major Lob. ic. pag. 492. Origanum sylvestre Dod. Lateinisch fol. 285. Cord. in Diosc. f. 52. Cam. hort. pag. 112. Origanum sylvestre seu vulgare Fuchs. f. 552. Tab. ic. pag. 346. Origanum Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 159. Origanum Italicum, Cæs. Lib. II. cap. 52. pag. 463. Gemein Dosten oder Bollgemuth Tab. Bollgemuth Brunf. Fuchs. Berg-Münz und brauner-Feld-Dost quibusdam. Calefacit & siccatur tertio excessu, incidit, extenuat, Gal. 6. simpl. Folio ex umbellâ infarctus omnes expedit tussientes, spleneticos & ictericos juvat, mentesque ducit: Oedemata, aliosque laxos tumores fotu illituque discutit. Prurigines, scabies balneo expurgat. Cerevisiæ additum eam ab acore præservat. Inter coryleta bey Bladau. Sub Elevatione Poli 45. 46. 47. 48. 49. Flores colligendi Sole 15. δ. occupante: Semen, Sole 8. ☿ obsidente.


Origanum olim columbis vulneraria erat planta. Antigonus Carystius, hist. mirab. c. 42. ἡ φάση δὲ ὅταν πληγὴ τὴν ὀρίγειον ἔσῃ, εἰς τὸ ἔλκεσθαι καὶ γίνεσθαι τῶτον τὸν τροπὸν ὕγιος. Palumbes percussa origanum vulneri indit, hocque modo sanatur. Ubi notandum Antigoni foeminino genere origanum ponere. Eodem genere protulit sive Cantharus sive Plato: *Ex Arcadiâ hic Origanum attulit acerrimam.* Sunt, qui masculino genere Origanum dixerunt. Alexandrides: *Asparagum condidit ac lentiscum, & origanum, qui admixtus Coriandro, salsamentis gratiam addit & ornamentum.* Ion. *Ejus manu abditus est statim origanus.* Neutro & Epicharmus & Ameipsias Origanum efferunt genere.

DXIII. *Origanum sylvestre album* C. B. Pin. pag. 123. *Origanum album*. Tab. lib. 2. fol. 58. *Origanum sylvestre flore albô* Cam. hort. pag. 112. *Weißer Feld-Dost*. Vulgari respondet demptô flore. Passim.

DXIV. *Ornithogalum luteum* C. B. Pin. pag. 71. Cord. in Diosc. fol. 46. Lob. ic. pag. 165. Tab. Lib. 2. f. 321. *Sweett. Florileg. part. 1. fol. 57.* *Bulbus agrestis* Trag. Kyber. in Trag. pag. 737. *Bulbus sylvestris* Tragi, Cam. hort. pag. 31. *Bulbus esculentus* Lon. deutsch, fol. 226. *Bulbus sylvestris alius bifolius*. Gesn. Hort. fol. 251. *Silyrinchion*, Cord. hist. fol. 122. *Acker Zwiebel / Feld Zwiebel und Wild Zwiebel*. Kyber. in Trag. *Geele Feld Zwiebel* Tab. *Feld- oder Acker Zwiebel*. Lon. *Klein Erd-Nuß*. Cord. in Diosc. *Ziegen-Lauch* Nostratibus. Mense Aprili copiose inter dumeta in der Hollen Grund.

DXV. *Orobanche major, garyophillum olens* C. B. Pin. pag. 87. *Hypogenista*, *Rapum genistæ à similitudine* Lob. ic. pag. 268. o. *Orobanche*, Matth. deutsch fol. 198. Cord. in Diosc. fol. 46. Lon. deutsch fol. 276. Eystett. Cæs. pag. 342. Thal. pag. 80. *Orobanche vera* Gesn. hort. fol. 270. *Leonina herba & Legumen Leoninum* Ruell. fol. 390. & fol. 326. circa finem. *Orobanche prima* Clus. hist. lib. 2. pag. 270. *Orobanche secunda* Tab. lib. 2. f. 358. *Limodoron sive Orobanche* Dod. Lateinisch f. 552. *Sommer-Wurß* / Lon. Tab. *Wollriechende Sommer-Wurß* / *Erwennwürger* Matth. *Orobanche hæc semper alterius plantæ radici adnascitur, eidemque alimoniam subtrahit, unde & Limodoron Theophrasto nominatur.* Hinter Lopa-nen in incultis nach der See zu.

DXVI. Orobanche *μονόκλων*  flosculis pediculis infidentibus, radice acuminatâ J. L. Spitzwurzige Sommer-Wurz/ dessen Blüth auff kleinen Stangen. An Orobanche hypopytis C. B. qua 3. in Prodr: p. 31. quæ sub piceis abietibus & pinastris provenit. In der Fischhäusichen Heyde passim.

DXVII. Orobanche radice dentata major. C. B. Pin. p. 88. Dentaria major Bauh. in Matth. f. 685. Dentaria major Matth. Lob. ic. pag. 270. o. Cam. hort. pag. 54. Eystett. Dentaria Matthioli Tab. Lib. 2. fol. 88. Anblatum Cord. hist. fol. 89. Dod. Lateinisch fol. 553. Anblatum Cordi seu dentaria major Thal. pag. 7. Dentaria major, seu *αφύλλ*  I. Clus. hist. lib. 5. fol. 120. Squamatia Lon. deutsch fol. 303. Große Schuppen-Wurz Tab. Unblatt/ Freysam: Kraut/ Blumen-Kraut/ S. Georgen-Wurz und Klein-Kahl-Bahn-Kraut vulgò. Sau-Brodt Rusticis. Bey Neuhausen am Thier-Garten/ ubi effossa radix odorem spargit Iridis florentinæ. Item bey Trunz copiosè. Floret mense Aprili in der Hollen-Grund.

DXVIII. Orobus sylvaticus purpureus vernus C. B. Pin. pag. 351. Braunrothe frühzeitige Wald-Rüchern. Orobus Pannonicus primus Clus. hist. lib. 6. fol. 230. Clus. pann. pag. 736. Orobus Sylvestris vernus Thal. Orobus pannonicus Eystett. Arachus latifolius alter Dod. Niederländisch fol. 868. Orobus sylvaticus vernus Cam. Hercyn. Stirp. ic. 6. Thal. pag. 80. Astragalus, Colum. in Phytobas. pag. 60. In der Sackau. Item bey Bladau im Ross-Garten.

DXIX. Orobus sylvaticus viciæ foliis C. B. Pin. pag. 382. Würffel-saamigte Wald-Rüchern mit Vicken-Blättern. Orobus Pannonicus secundus, Clus. hist. Lib. fol. 230. Astragaloides Dod. Lateinisch fol. 551. Astragaloides altera herbariorum Lob. ic. pag. 78. o. Würffel-Saamen

quibusdam. Bey Lauten-Mühl am Teich. Planta recens inspicienda est & conferenda cum illâ, quæ provenit in der Hollen Grund. Conf. Clus. Pann. sub tit. Orobus Pann. purpur. 2. pag. 737.

DXX. *Ostrya ulmo* similis fructu in umbilicis foliaceis C. B. Pin. pag. 427. *Ornus* Trag. Kyber. in Trag. fol. 1109. Lon. deutsch fol. 49. *Betulus* Lob. ic. pag. 190. *Carpinus* Bauh. in Matth. fol. 135. Tab. Lib. 3. fol. 682. Dod. Lateinisch fol. 841. Lob. Observ. fol. 607. Öse Theophrasti Clus. hist. lib. 1. fol. 55. *Ostrya Cordi*, *ornus* Tragi. Thal. pag. 83. *Fagus sepium*, Gesn. hort. fol. 258. Haubüchen oder Hagen-Büchen Kyber. in Trag. Haubüchen oder Buchäschern Lon. Spindel-Baum Tab. Hahn-Buch Nostratibus: Totæ sylvæ passim.

DXXI. *Papaver erraticum majus*: *polas* Dioscoridi Theophr. Plinio C. B. Pin. 171. *Papaver erraticum*, Bauh. in Matth. fol. 745. Dod. Lateinisch fol. 447. Tab. Lib. 2. fol. 276. Cord. in Diosc. fol. 66. Gesn. hort. fol. 270. Cas. lib. 15. Cap. 10. pag. 571. Lon. deutsch fol. 112. *Papaver erraticum rubrum* Eystett. *Papaver Rhœas*, sive caducô flore puniceô *papaver*, Lob. ic. pag. 275. *Papaver rubrum* Brunf. Lateinisch Tom. 3. fol. 52. *Papaver erraticum primum* Fuchsl. fol. 515. Klapper-Rosen Tab. Klapper- oder Korn-Rosen Matth. Feldmagsahnen/Hirnschaal und Grindt-Magen vulgö. Wilder Rohn Nostratibus. Am Rneiphöfischen Wall. Item inrer segetes passim.

DXXII. *Pastinaca sylvestris tenuifolia* Dod. Lateinisch fol. 679. *Pastinaca tenuifolia sylvestris* Dioscoridis vel *Daucus officinarum* C. B. Pin. 151. *Daucus vulgaris* Clus. hist. lib. 6. fol. 198. *Pastinaca sylvestris* Matth. Bauh.

in Matth. fol. 549. Staphylinus sylvestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 348. Pastinaca erratica Fuchf. fol. 684. Cord. in Diosc. fol. 54. Tab. lib. 1. fol. 239. Daucum usitatus officinarum **Wilde dünnblättrichte Möhren.** Pastinaca sylvestris genuina Diosc. Lob. ic. pag. 722. **Wilde Pastenach** Tab. Matth. **Wilde Rüben** Sebitz. in Trag. **Wilde Pastaney** Fuchf. **Wilde Möhren/ Vogels-Nest und Esels-Möhren** vulgò. Calfacit & siccatur ordine tertio Tab. præsertim semen, quod radice calidius. Urinam pellit, calculos exterit & mulierculis ab utero suffocatis auxiliò est. **Hinter der Schackischen Kirchen/ prædium versùs Melchioris á Rappen.** Item in monte Apollinis bey **Nwednau.** Item bey **Gesau am Wege.** Item bey **Wolffshöffen.**

DXXIII. Pastinaca sylvestris tenuifolia altera. Joh. Læf. **Wilde Pastenach die andere.** Hæc foliis est diversissimis à priore. Gestat namque folia majora & latiora nec ita incisa, quemadmodum in Dauco videre est. 2. Varietas est in umbellâ, quæ subtus foliis latis & acuminatis fulcitur, cum Dauci umbella foliis Nigellæ in modum incisus sustentetur. 3. Thyrsuli umbellæ in hac distractæ nonnihil, in Dauco conjunctiores, & ad nidamentum aptiores. Semen gustandum & radix ubi recens; fortè & in his discrimen à Dauco. In monte Apollinis **hinter Nwednau.** Item bey **Selnicken** inter Coryleta.

DXXIV. Pastinaca sylvestris Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 346. **Breitblättriger wilder Pastenach** Gesn. hort. fol. 271. Cam. hort. p. 118. Pastinaca sylvestris Cord. Thal. p. 84. Pastinaca Brunf. Lateinisch Tom. 3. f. 172. Elaphoboscum Bauh. Matth. f. 568. Elaphoboscum Erraticum, Branca Leonina Tab. ic. pag. 77. Siser sylvestre Fuchf. fol. 753. Baucia, Pastinaca

sylvestris Arabum, an Elaphoboscum? Adv. Lob. fol. 317. Pastinaca sylvestris latifolia Dod. Lateinisch fol. 681. C. B. Pin. pag. 155. Wild Hirs Pastenach/ wild Morellen Tab. Bestenau Brunf. Wild Möhren Fuchf. Potentior est horrensi, urinas & menses provocat cum herbâ tum maximè semine & radice, Gal. 8. simpl. c. de Staphil. Semen officinis usitatum venenis adversatur, & in calceos mingentes strenuè in Venerem agit. Im Roß Garten bey der Altstättischen Ziegelscheune. Item zu Jerusalem am Berge.

DXXV. Pedicularis pratensis lutea, vel crista galli C. B. Pin. pag. 163. Pedicularia lutea Tab. Lib. 2. fol. 470. Crista galli Herbariorum Lob. ic. pag. 529. Crista Galli, seu Alektorolophos lutea Thal. pag. 33. Crista galli, Dod. Lateinisch fol. 556. Crista simplici caule Cas. Lib. 8. cap. 37. pag. 341. Pedicularis pratensis secunda Trag. Sebitz, in Trag. deutsch fol. 201. Crista gallinacea Clus. Hist. Lib. 5. fol. 211. Geel Läuse-Kraut Sebitz, in Trag. Geel Rödel Tab. Nannen-Kamm quibusdam. Klapper Nostratibus. Semenejus fecali mistum atrum reddit panem. In pratis præsertim editioribus, item inter segetes copiosè.

DXXVI. Pedicularis pratensis purpurea C. B. Pin. pag. 163. Pedicularis Lob. ic. pag. 748. Tab. Lib. 2. fol. 470. Pedicularis altera Lon. deutsch fol. 182. Pedicularis campestris prior, Trag. Sebitz, in Trag. deutsch fol. 201. Fistularia Dod. Lateinisch fol. 556. Alektorolophus tertius, Clus. Pann. pag. 709. Alektorolophi tertii alterum genus, Clus. hist. lib. 6. fol. 211. Alektorolophus Dodonæi prima, seu Fistularia, Thal. pag. 7. Läuse-Kraut mit Purpurfarben Blumen. Rödel-Kraut Tab. Braun Läuse-Kraut/ oder Rödel Lon. Braun Wiesen-Läuse-Kraut Sebitz, in Trag.

Trag. Fistulas ac sinuosa ulcera sanat: menses & sanguinem undecunque fluentem sistit, vino austero decocta; In pratis riguis passim.

DXXVII. Pedicularis pratensis candida. Joh. Læf. Leuse-Kraut mit weißen Blumen. Purpureæ facie prorsus est assimilis dempto flore niveo. Esitata jumentis phthiasin accersit. In pratis bey m Bretter-Krüge.

DXXVIII. Persicaria urens, seu Hydropiper, C. B. Pin. pag. 102. Persicaria prima, sive Hydropiper, Tab. ic. pag. 857. Persicariæ primum genus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 71. Hydropiper, Fuchf. fol. 845. Cord. in Diosc. fol. 47. Cæf. lib. 4. cap. 35. pag. 168. Hydropiper, sive Persicaria, Bauh. in Matth. fol. Hydropeperi Dod. Lateinisch fol. 607. Hydropiperi. Persicaria Hydropiper, Lob. ic. pag. 351. Persicaria mordax, seu Hydropiper, Thal. p. 85. Pulicaria mascula, Brunf. Lateinisch tom. 2. f. 14. Persicaria mas, Lon. deutsch fol. 198. Scharff Flöhe-Kraut/ Flöh-Kraut/ Wasser-Pfeffer Tab. Matth. Flöh-Kraut Männlein Brunf. Groß Persing-Kraut/ oder Persing-Kraut Männlein/ Lon. Wasser-Pfeffer/ Schmerzen/ Cord. in Diosc. Mücken-Kraut quibusdam. In locis palustribus & ad rivulorum margines passim.

DXXIX. Persicaria mitis maculosa & non maculosa, C. B. Pin. pag. 102. Persicaria altera, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 71. Tab. lib. 2. fol. 528. Persicaria mitis maculosa, Lob. ic. pag. 315. Persicaria Fuchf. fol. 630. Dod. Lateinisch fol. 608. Pulicaria foemina, Lon. deutsch fol. 197. Gelind Flöh-Kraut. Das ander Flöh-Kraut Tab. Sebitz. in Trag. Matth. Flöh-Kraut Weiblein/ Brunf. Persing-Kraut Weiblein/ Lon. Folia quandoque sunt maculata, quandoque non. Persicaria hæc lateres inter ignitos tosta,

& imposita, dolores sistit arthriticos certo experimento. Sunt, qui ulceribus inveteratis solidam & citam curationem. Persicariâ hâc promittunt. Eam Lunâ decrecente partibus ulceratis alligant, & spatio XXIV. horarum elapsô, recentem apponunt, applicatione in dies continuatâ, usque dum Luna juvenescere seu iterum crescere incipit. Remotam ab ulcere sterquilinio committunt, putredine consumendam. Consumpta ulcus curatum ostendit. Persicaria in frigidam conjecta, foris maxillæ affirmata, ut incalescat prorsus, mox fimo commissâ, ut tota putrescat, dentium dolores mitigat. De Persicariâ vide plura in Marci Marci Philosoph. Veterum restitutâ pag. m. 495. *Auff dem Thaum nach dem Bretter Krüge zu.* Sub elevatione poli 46. 47. 48. 49. Jumentis radix porrigitur, à viscerum ægritudine tumidis. Folia legenda Sole 15. ny ingresso: flores. Sole 8. & occupante: semen Sole & deferente.

DXXX. Persicaria minor, C.B. Pin. pag. 102. Persicaria pumila, Tab. lib. 2. fol. 528. Persicaria pusilla repens, Lob. ic. pag. 316. *Klein Flöh Kraut* Tab. In fossis hinter dem Friedländschen Thor nach dem Penartischen Walde zu.

DXXXI. Petasites major & vulgaris C.B. Pin. pag. 167. *Große gemeine Pestilenz Wurß.* Petasites, Trag. Kyber. in Trag. pag. 415. Dod. Lateinisch fol. 597. Cord. hist. fol. 123. Fuchs, fol. 644. Gesn. hort. fol. 271. Lob. ic. pag. 591. Adv. Lob. fol. 254. Observ. Lob. fol. 321. Lon. deutsch fol. 254. Tab. lib. 2. fol. 421. Cæs. lib. 12. cap. 20. p. 489. Petasites florens & sine flore Clus. Hist. lib. 5. fol. 116. Petasites flore punicante Thal. pag. 91. Tussilago major, Bauh. in Matth. fol. 615. Petasites mas, Cam. hort. pag. 122. *Pestilenz Wurß* Tab. Kyber. in Trag. Matth. Fuchs. Lon.

Lon. Neunkrafft Nostratibus. Vulgus radices offert vaccis die pro festo Joh. Baptista, quò præcavere student, ne lac vaccis detrahatur. Flos punicans est & odoratus. Bey der Neuhäusischen Mühl.

DXXXII. Petasites minor C. B. Pin. pag. 197. Kleine Pestilenz-Wurz. Petasites albo flore Cam. hort. pag. 122. Clus. hist. lib. 5. fol. 116. Petasites flore candido, Thal. pag. 91. Petasites foemina & Leucanthemos, Cam. hort. pag. 122. Am frischen Hase copiosè. Flos ex candido subflavus est, & inodorus ferè. Radix resinam fundit copiosam, in peste salutaris existens. Cum Zedoariâ & Angelicâ præstans est remedium in uteri strangulatu. Cam. in hort. pag. 122.

DXXXIII. Phalangium non ramosum Dod. Lateinisch fol. 106. Tab. lib. 1. fol. 685. Phalangium non ramosum, Liliago Cordi, Lob. ic. pag. 48. Phalangium parvo flore non ramosum C. B. Pin. pag. 29. Liliago, Asphodelus Germanica, Phalangium, Cord. hist. fol. 150. Phalangium cauliculis simplicibus Cæs. lib. 10. cap. 27. pag. 416. Dhnästiges Erd-Spinnen-Kraut/ Tab. Groß-Lilgen vulgò. Hinter Brandenburg/ inter ericeta & aspera. Folia, flores ac semina scorpionum & phalangiorum ictibus succurrunt, ac tormina passos juvant. Diosc.

DXXXIV. Pilosella major erecta, C. B. Pin. pag. 262. Pilosella major altera Tab. lib. 1. fol. 626. Groß gerades Mäus-/Dehrlein / In der Hollen-Grund. Item bey Lauten-Mühl iner fruticeta.

DXXXV. Pilosella major repens hirsuta, C. B. Pin. pag. 262. Pilosella, Matth. deutsch fol. 405. Pilosella prima Tab. lib. 1. fol. 625. Pilosella, auricula muris, Adv. Lob. fol.

200. *Pilosella*, & *Holostium Lacunæ*, Lob. ic. pag. 479. *Auricula muris*, Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 119. *Auricula muris minor*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 278. Lon. deutsch fol. 126. *Pilosella major*, Fuchf. fol. 605. Dod. Lateinisch fol. 67. *Pilosella media*, Thäl. pag. 83. Kriechendes rauhes Mäus Dehlein. Mäus Dehlein Tab. Klein Mäus Dhr / Nagel Kraut Lon. Mäus Dehlein Brunf. Amaro- & acredine quantillâ hepatis, lienis & mesenterii infarctus expedit, crassâ tenuat, resolvit, educitque bilem: in utero, hydropē ac tabe salutaris. Matthiolo siccatur, refrigerat, vehementer adstringit, solidat, glutinat, tenuat, & abstergit: in sputo sanguinis, dysenteria, diarrhœa, ac puerorum herniis perutilis, vi suâ vulneraria. Chalybs candens succo ejus sæpiusculè extinctus, tantam contrahit duritiem, ut lapides ferrumque atterat. Vi etiam est presentissima ad calculum, Lob. Passim in incultis.

DXXXVI. *Pilosella major repens minus hirsuta*, C. B. Pin. pag. 162. *Auricula muris minor secunda*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 221. *Lactucella sylvestris repens*, Cam. hort. pag. 82. *Pilosella vulgō*, Cas. lib. 13. cap. 18. pag. 514. Das ander Mäus Dhr / Sebitz. in Trag. In collibus hinter dem Altstättischen Walle nach der Hollen-Grund zu.

DXXXVII. *Pimpinella saxifraga major umbellâ candidâ*, C. B. Pin. pag. 159. *Pimpinella* Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 28. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 370. Gesn. hort. fol. 272. *Pimpinella major* Fuchf. fol. 608. *Pimpinella major* Fuchf., Lob. ic. pag. 720. *Pimpinella saxifraga* Bauh. in Matth. f. 729. *Pimpinella saxifraga major*, Cam. hort. pag. 125. *Tragoselinum majus*. *Pimpinella major*,

major, Tab. ic. p. 88. Saxifraga magna, Dod. Lateinisch f. 315. Bipinella Saxifraga major, Adv. Lob. f. 321. Pimpinella nostras communis major, Thal. p. 87. Saxifraga vulgaris major, Clus. Pann. p. 697. Groß Bibernel/ Fuchf. Tab. Sebitz. in Trag. Bibernel Matth. Brunf. Groß Bocks Peterlein vulgò. In umbellâ hujus Pimpinellæ saxifragæ, semina inter visuntur quandoque orbiculares, capsæ virides, pediculis inhærentes, quæ diffractæ eruculam ostentant coccinei coloris. Radicibus quandoq; adnascuntur cocca rubra, quibus tinctorum utuntur ad colorem carmesinum rebus inducendum. Inter coryleta bey Bladau passim. Radix pimpinellæ colligatur Sole & deferente: folia, Sole in & commorante: semen, Sole in 1. & existente.

DXXXVIII. Pimpinella saxifraga minor, C. B. Pin. pag. 160. Cam. hort. pag. 125. Pimpinella nostras communis minor, Thal. pag. 87. Pimpinella minor, Fuchf. fol. 609. Tragoselinum petraeum, Tab. lib. 1. fol. 316. Bipinella, Saxifraga hircina, Adv. Lob. f. 321. Bipinella, Saxifraga minor Lob. ic. p. 719. Saxifraga parva, Dod. Lateinisch fol. 315. Pimpinellæ tertia species, Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 370. Daucus Selioides, Cord. hist. fol. 154. Saxifraga hircina minor, Gesn. hort. fol. 279. Tragium, Column. in Phytobas pag. 76. Saxifraga, Pimpinella Germanica minor. Clus. hist. lib. 6. fol. 197. Saxifraga, sive Pimpinella Germanica minor, Clus. pann. pag. 697. Saxifraga altera Cæs. lib. 7. cap. 57. Stein Bibernel/ Tab. Klein Bibernel/ Fuchf. Die dritte Bibernel/ Sebitz. in Trag. Stein Peterlein/ Mauer Peterlein und Krauß Bibernel vulgò. Vicem petroselini Macedonici sustinere potest, si illud deficiat.

DXXXIX. Pimpinella sangvisorba major, C. B. Pin. pag. 160. Sangvisorba major, Fuchf. fol. 788, Cam. hort.

125. Tab. lib. 1. fol. 391. Cord. hist. fol. 143. Sangvisorba altera major, sive Pimpinella, Lob. ic. pag. 719. Adv. Lob. f. 320. Pimpinella Italica major sangvisorba Clus. hist. lib. 6. f. 197. Thal. pag. 87. Pimpinella, sive sangvisorba major, Bauh. Matth. fol. 729. Pimpinellæ Italicæ secundum genus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 373. Sideritis secunda Dioscoridis. Colum. min. cogn. stirp. & rar. part. 1. pag. 125. Groß Sperben-Kraut/ Große Welsche Bibernell / Tab. Herr-Gotts-Bärtlein/ Welsche Bibenel Matth. Sebitz. in Trag. Groß Kölbls-Kraut/ Fuchsl. Groß Blut-Kraut/ Groß Blut-Tropfflein/ und Wurm-Wurz vulgò. Braun Leber-Blum Nostratibus. Refrigerat radix, siccat & adstringit. Fluores alvi, & sangvinem undecunque fluentem efficacissimè sistit, ac intestinorum exulcerationes sanat. Flos siccatus & ex vinò rubrò sumptus, dysentericos juvat. In pratis aridioribus & graminosis locis.

DXL. Pinus sylvestris, C. B. Pin. pag. 491. Matth. deutsch f. 24. Pinus sylvestris sive Pinaster, Dod. Lateinisch f. 860. Pinus sylvestris montana, Tab. lib. 3. fol. 638. Pinaster, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. f. 238. Lob. ic. pag. 226. O. Gesn. hort. f. 272. Thal. pag. 90. Pinus sponte proveniens. Cord. in Diosc. f. 15. Wilder Fichten-Baum Matth. Wilder Berg-Zirbel-Baum Tab. Harz-Baum / Kien-Holz. Kiefer-Holz vulgò. Fichten Nostratibus. Gabata. Totæ Sylvæ passim. Pinus eas inter arbores refertur, quæ cariem vetustatemque haut sentiunt. Cupressus ac pinus, inquit Vitruvius lib. 2. c. 9. in vetustatem sine vitiis conservantur: quod is liquor, qui inest penitus in corporibus earum, habet amarum saporem; qui propter acritudinem non pati-

patitur penetrare cariem, neque eas bestiolas, quæ sunt nocentes. Ideoque quæ ex his generibus opera constituuntur, permanent ad æternam diuturnitatem. Pinus in Isthmicis ludis primum prius erat coronamentum, post apium. Notandum, pinea tigna, abiegna, querna, & consimilia, ædificiis struendis destinata, ubi exasciantur, facilitè hiscere, ac rimas agere; contra per meditullium ferrâ dissecta tale quid haud pati. Sic asseres ferratos ac siccatos meditullium versùs curvari advertes, ob fibras ex peripheriâ ad centrum concurrentes, non contrâ. Ferunt, & fissos asseres non ita incurvari, ac qui ferrâ sunt defecti.

DXLI. Pisum marinum. Joh. Lœf. Wilde Seescho-
ten. Radix flavescens, & longius sub arenâ incedens, sarmenta excludit angulosa, striata, foliis uncialibus, binis semper ex intervallo sarmenta ambientibus, è quorum meditullio exoritur ala, novem aut decem foliorum contrario & alterno situ nascentium, cujus extremitas in capreolos tandem exit. Flores aut siliquas cujus indolis producat, mihi hactenus observare non licuit. *Muff den See-Bergen nacher Runken zu.*

DXLII. Plantago latifolia sinuata, C. B. Pin. pag. 189. Plantago major, Matth. Bauh. in Matth. fol. 375. Fuch. f. 38. Dod. Lateinisch. f. 107. Gesn. hort. fol. 273. Cam. hort. f. 273. Cam. hort. pag. 128. Tab. lib. 2. f. 402. Arnoglossa, Plantago latifolia lævis, Lob. ic. pag. 303. Adv. Lob. fol. 127. Plantago rubra Brunf. Lateinisch tom. 1. f. 25. Plantago latifolia Cord. in Diosc. fol. 44. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 180. Lon. deutsch f. 172. Plantago πολύεννη major sive rubra Thal. pag. 86. Plantago & centinervia Cas. lib. 8. cap. 16. pag. 327. Großer Wegrich. Tab. No-

ther Begrich Sebitz. in Trag. Lon. Brunf. Breit Wege-
rich Fuchf. Weg. Blätter Nostratibus. Adstringit, abster-
git ac digerit: jecoris obstructions solvit, renum ac vesicæ
ulcera sanat, dysentericos, sanguinis eruptiones & alvi pro-
fluvia sistit, tum foliò, tum semine. Folia vel integra ulceribus
inducta saniem extergunt: succus ulcerum malignitatem cor-
rigit, expurgataque ad cicatricem ducit, Secus vias copiosè.

DXLIII. *Plantago angustifolia major*, C. B. Pin. pag.
189. *Plantago quinquenervia*, sive *Lanceola* Lob. ic. pag.
305. Adv. Lob. fol. 128. *Plantago* $\pi\epsilon\lambda\lambda\acute{\alpha}\nu\epsilon\upsilon\phi$ \odot major, Thal.
pag. 86. *Plantago lanceolata*, Tab. lib. 2. f. 406. Trag. Se-
bitz. in Trag. deutsch fol. 180. *Plantago minor* Brunf. Latei-
nisch Tom. I. f. 24. Fuchf. f. 39. Lon. deutsch. f. 174. Dod. Latei-
nisch f. 107. Gefn. hort. fol. 273. *Lanceola*, Cæs. lib. 8. cap.
17. pag. 328. *Spizher Begrich* Sebitz. in Trag. Tab. Fuchf.
Brunf. *Spiz oder klein Begrich* / Lon. Roskripp quibus-
dam. In pratis præsertim editioribus passim, spicâ reper-
ta bey Lauten-Mühl geminâ. Sub elevatione poli 45.
46. 47. 48. 49. Radix colligenda Sole in Π versante:
flores, Sole in \odot : Semen, Sole in \triangle constituto.

DXLIV. *Plantago angustifolia minor* C. B. Pin. pag.
189. Tab. lib. 2. fol. 402. *Plantago* $\pi\epsilon\lambda\lambda\acute{\alpha}\nu\epsilon\upsilon\phi$ \odot minor, Thal.
pag. 86. *Lanceola minor*, Cæs. lib. 8. cap. 17. pag. 328. Klei-
ner spiziger Begrich / Tab. Hinter dem Rneiphöfischen
Walle in sabuletis. Majore viribus imbecillior est.

DXLV. *Plantago latifolia glabra minor*, C. B. Pin.
pag. 189. *Plantago latifolia minor*, Tab. lib. 2. fol. 402.
Kleiner breiter Begrich.

DXLVI. *Plantago latifolia incana*, C. B. Pin. pag. 189.
Plantago major incana, Lob. ic. pag. 304. Clus. hist. lib. 5.
f. 109.

f. 109. *Plantago major*, Matth. deutsch f. 169. Cam. hort. pag. 128. Brunf. Lateinisch tom. 1. f. 23. Lon. deutsch f. 172. *Plantago media*, Dod. Lateinisch fol. 107. Gesn. hort. f. 273. *Plantago media Dodonæi*, Thal. pag. 86. *Plantago latifolia*, vel *media & secunda*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 180. *Plantago minor Dioscoridis*, Tab. Schaafs Zunge/ Tab. Breiter Wegrich/ Brunf. Lon. Sebitz. in Trag. Bey Bircken-Feld in incultis copiosè. Item bey Lauten-Mühl secus viam.

DXLVII. *Plantago aquatica latifolia*, C. B. Pin. pag. 191. *Plantago aquatica* Brunf. Lateinisch tom. 1. fol. 27. Matth. deutsch f. 170. Tab. lib. 2. f. 405. Fuchf. f. 42. Dod. Lateinisch f. 606. Gesn. hort. fol. 273. Thal. pag. 86. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 181. Cæs. lib. 14. cap. 15. pag. 552. Lon. deutsch f. 174. *Plantago aquatica*, foliis *Betæ* aut *Plantaginis*, flore *Gallii albi*, Lob. ic. pag. 300. Breitblättriger Wasser-Wegrich Tab. Matth. Fuchf. Wasser-Wegrich/ oder Frosch-Löffel-Kraut/ Lon. Frosch-Wegerich quibusdam. In paludibus passim.

DXLVIII. **Plantago aquatica* λεπτομακρόφυλλος. Joh. Lœseli. Radix est capillacea, albula partim, partim rufula, caules nonnunquam tricubitales, erectos, rotundos, ex intervallo brachiatos, in altum mittens, quorum cacuminibus flosculi innascuntur albi, & vanescentibus his exigua capitula, minutum semen asservantia. Folia promit radix numerosa, digitum transversum lata, bicubitalia, & longius excurrentia. Wasser Wegrich mit schmalen langen Blättern. Im Pregel passim bey der Hospital-Wiese.

DXLIX. *Polygala vulgaris*, C. B. Pin. pag. 215. *Polygala* Lon. deutsch. f. 217. *Polygala vulgaris minor*, Clus. hist.

lib. 3. f. 325. Polygalon Trag. Kyber, in Trag. p. 571. Polygala recentiorum, Adv. Lob. f. 179. Polygala recentiorum rubeis & albis floribus, Lob. ic. p. 416. 417. Polygalon flore rubro purpurascente: & flore cæruleo, Eystett. Polygala Tragi, Thal. pag. 88. Cam. hort. Polygala cærulea, purpurea, alba, Tab. lib. 2. fol. 501. Flos Ambarvalis, Dod. Lateinisch fol. 253. Blau/ braun und weiß Kreuz-Blümlein / Tab. Ransel/ Kreuz-Blum/ Lon. Kyber. in Trag. Milch-Blum quibusdam. Zwischen Lauten-Mühl und Bladau in locis herbosis.

DL. Polygonatum latifolium vulgare, C. B. Pin. pag. 303. Polygonatum Bauh. Matth. fol. 678. Lob. ic. pag. 637. Cord. hist. fol. 113. Cord. in Diosc. fol. 61. Polygonatum vulgare, Cam. hort. pag. 129. Pplygonatum vulgatus, Eystett. Polygonatum majus, Lon. deutsch/ fol. 206. Polygonum majus, Adv. Lob. f. 283. Polygonatum majus, seu vulgare, aut latifolium, Thal. pag. 85. Polygonatum latifolium, Fuchf. fol. 585. Dod. Lateinisch f. 346. Tab. lib. 2. fol. 755. Sigillum Salomonis, Brunf. Lateinisch tom. 3. f. 92. Gefn. hort. fol. 281. Sigillum Salomonis latifolium, Trag. Sebitz, in Trag. deutsch fol. 316. Frassinella, Cæs. lib. 5. c. 32. pag. 224. Breitblättrige gemeine Weiß-Wurz/ Weiß-Wurz / Matth. Fuchf. Brunf. Weiß-Wurz/ Männlein/ Tab. Große Weiß-Wurz/ Lon. Weiß-Wurz/ Gelenck-Weisz/ Cord. hist. Polygonatum latifolium baccis nigris. Inter tetanophra, quæ Plinio sunt medicamenta cutem erugantia, habetur Cataplasma antipodagricum quorundam. R. rad. Sigill. Salom. Libr. I. Smegm. Venet. libram I. Croc. drachm. 3. Coq. in mensurâ vini adusti, ad cataplasmatismatis consist. In der Hollen-Grund/ und Penartschen Walde in umbrosis.

DLI. Polygonatum angustifolium non ramosum, C. B. Pin. pag. 303. *Unästige/ schmalblättrige Weiß-Wurz.* Polygonatum angustifolium, Fuchf. fol. 586. Eysett. Clus. Pann. pag. 263. Polygonatum angustifolium primum, Tab. lib. 2. fol. 431. Polygonatum quintum, sive angustifolium primum, Clus. hist. lib. 2. fol. 277. Polygonatum alterum, Dod. Lateinisch f. 345. Polygonatum tenuifolium, Cord. hist. f. 113. Polygonatum erectum, Gesn. hort. f. 273. Sigillum Salomonis angustifolium, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 316. Polygonatum minus Lob. ic. pag. 805. Lon. deutsch f. 206. Polygonatum minus, rubris foliis, ambitu stellato, Adv. Lob. f. 358. Polygonatum tenuifolium majus, Thal. pag. 85. Polygonato similis in Alpibus, Cæs. lib. 5. c. 33. pag. 224. *Weiß-Wurz-Weiblein/ Tab. Schmale Weiß-Wurz/ Fuchf. Kleine Weiß-Wurz/* Lon. Sebitz. in Trag. Flosculus provenit albidis. *Bev Birckenfeld hinter der Ziegel-Scheune.*

DLII. Polygonon latifolium, C. B. Pin. pag. 281. Centumnodia, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 128. Polygonum-mas, Matth. Bauh. in Matth. fol. 676. Dod. Lateinisch fol. 113. Fuchf. fol. 614. Thal. pag. 87. Cæs. lib. 4. cap. 36. p. 168. & 169. Polygonum mas vulgare, Sangvinaria, Centumnodia, Lob. ic. pag. 419. Adv. Lob. f. 179. Polygonon masculum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 391. Polygonum vulgare, Cam. hort. pag. 130. Polygonus mas, Gesn. hort. f. 273. Polygonum majus Tab. lib. 2. fol. 502. polygonum majus seu mas, Lon. deutsch f. 204. *Groß-Weg-Gras Tab. Große Wege-Tritt/ Matth. Weg-Gras / Brunf. Fuchf. Wege-Tritt/ oder Weg-Gras. Lon. Denn-Gras / und Blut-Kraut quibusdam. Jungfer-Tritt Nostratibus. Secus vias ac semitas copiose.*

DLIII. *Polygonum oblongo angusto folio*, C. B. pin. pag. 281. *Polygonum tertium*, Tab. lib. 2. fol. 503. *Weg-Tritt mit langen schmalen Blättern. Blutt-Kraut.* Refrigerat gradu secundo, siccatur & adstringit. Sangvinaria nomen ab effectu obtinuit, quippe eo sive integro, sive tussu, stillanti parti inducto, sanguis coit, & in grumos concrevit. Collectionibus fervidis & ignibus sacris auxiliatur. *Weg-Juden-Kirch* secus viam. Colligenda herba Sole 1. & ingresso.

DLIV. *Polygonum minus*, seu *Millegrana major*, C. B. pin. pag. 281. *Polygonum minus* Matth. deutsch. fol. 677. *Herniaria*, Gesn. hort. f. 261. Cam. hort. pag. 74. Thal. pag. 56. Tab. lib. 2. fol. 507. *Empetron*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 527. Lon. deutsch. fol. 249. *Herba Turca*, sive *Herniaria*, Lob. ic. pag. 421. *Herba Turca*, *Herniaria multigrana serpilli facie*, Adv. Lob. fol. 180. *Millegrana*, Cord. hist. fol. 98. *Harn-Kraut* Tab. Brunf. Kleiner *Weg-Tritt* / Matth. *Harn-Kraut* / *Stein-Kraut* / Lon. *Bruch-Kraut* / oder *Groß Tausend-Korn* vulgò. *Jungfer-Gras* Fœmellis. *Dürr-Kraut* Rusticis. In incultis bey Brandenburg. Item hinter dem *Kneiphöfischen Wall* in petrosis.

DLV. *Polygonum minimum*, seu *Millegrana minima*, C. B. pin. 282. *Millegrana minima*, Lob. ic. p. 424. *Herniaria altera*, Thal. pag. 57. *Das aller kleinste Tausend-Korn.* Plantula est exilis polycavlos, ramulosa, folia disposita habens Alines instar multicaulis, sed minuscula. Thyrsulorum bifurcationes fermè singulas binis foliolis comitatas, rotundiusculum excipit capitellum, seu granulum; Cacumina verò numerosiora hujusmodi occupant granula.

nula. Radix longiuscula, & sæpè contortula, Im Dorff
Gartau.

DLVI. Polygonum minus polycarpum, Tab. lib. 2.
f. 530. Hund-Würzel. Polygonum minus, seu foemina,
Lon. deutsch fol. 205. Saxifraga Anglica, fortè Alsines mi-
nimum genus, Cynanche, Dalechampii Lob. ic. pag. 428.
Saxifraga Anglica Adv. Lob. fol. 183. Polygonon Germa-
nis Knäuel/ Trag. Kyber. in Trag. pag. 393. Polygonum
angustissimo & acuto, vel gramineo folio minus repens,
C. B. pin. 281. Knäuel/ Dod. Lateinisch fol. 115. Klein
fruchtbahrer Weg-Tritt/ Tab. In incultis; item inter se-
getes passim. In Poloniâ polygonum quoque reperitur
cocciferum, Kosmaczek dictum, cujus radiculis cocca ele-
gantissimo rubore commendata innascuntur. Provenit
idem polygonum propè Rostochium in locis arenosis, cu-
jus cocca pueri die Profesto Johannis Baptistæ colligunt,
vocantque Johannis-Wurmlein. Collegit ipse eadem
Læselius Rostochii vivens, & advertit paulò pòst muscas è
coccis exeuntes, & avolantes. Succo Sericum tingi posset,
quæ tinctura ελόβηρ i. e. tota vera salutanda haud est,
utpote quæ Imperatoribus olim debebatur l. auratas. C. de
vestibus holoberis.

DLVII. *Polygonum foliis gramineis Spergulæ ca-
pitibus. Joh. Læf. Weg-Tritt mit kleinen Köpfchen/ und
gar zarten Blättern. Radice nititur longiusculâ, subflavâ,
& villosâ nonnihil, quæ cauliculos edit exiles, numerosos,
ἐπικλινεσέρας, in terram circum circa procumbentes, nodo-
sos, in summitate ramosos. Singulis geniculis folia præ-
sunt tenuia & angusta, magnitudine suâ variantiâ, modò
plura, modò pauciora, paleaceis & niveis quibusdam mem-
branulis

branulis fulta: flosculis est in summo cauliculorum dilutè purpureis, quos vanescentes parva, ac quinis foliolis conclusa subsequuntur vascula, rotunda, & in acumen vergentia, Spergulæ capitulis similia, in quibus minusculum seminum. Hinter Juden-Kirch am Wege nach Selnicken zu. Item secus viam, quâ itur nach Neuhausen.

DLVIII. *Polygonum foliis gramineis alterum. Joh. Lœf. Anderer Weg-Tritt mit gar zarten Blättern. Thyrsulis est exiguis, rotundis, geniculatis, quincuncialibus sapè: Initiò perbreuibz aliquot ad quævis genicula foliis, concursu suò veluti fructum aliquem referentibus, quæ ætatis tractû elongantur, & graminea fiunt: flosculos habet niveos, & his deciduis vascula nana, acuminata, exile semen servantia. Radicula paucis fibris donata est. Am Bollwerck beym Zoll-Haus.

DLIX. Polypodium, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 430. Fuchf. fol. 588. Cord. in Diosc. fol. 76. Cord. hist. fol. 171. Gesn. hort. fol. 273. Tab. lib. 2. fol. 478. Cas. lib. 16. cap. 6. pag. 593. Cam. hort. pag. 130. Lon. deutsch/ fol. 251. Filicula, seu Polypodium, Bauh. Matth. fol. 87. Polypodium vulgare, C. B. Pin. pag. 359. Engelsfuß / Brunf. deutsch/ fol. 307. Polypodium, Filicula, Herba Radioli Apuleji Lob. ic. pag. 814. Polypodium majus Dod. Lateinisch/ fol. 464 Engelsfuß/ Tab. Fuchf. Lon. Sebitz. in Trag. Süßfarn/ Süß-Wurzel / Baumnfarn / Tropffen-Wurz vulgò. In petris muscosis zu Neuhausen. Im See-Gebirg zwischen Sackau und Lattenwalde copiosè. Nonnunquam vetustis arboribus innascitur, bey Wiesdehlen im Walde.

DLX. Populus nigra, C. B. Pin. pag. 429. Matth. deutsch/ fol. 41. Dod. Lateinisch/ fol. 836. Lob. ic. p. 194. o. Cord.

Cord. in Diosc. fol. 18. Tab. lib. 3. fol. 687. Cæs. lib. 3. cap. 45. pag. 120. Populus alba, Lon. deutsch fol. 42. Trag. Kyber. in Trag. pag. 1080. Schwarzer Pappel-Baum/ Tab. Matth. Bollen/ Pappel-Baum Lon. Schwarz Albeer-Baum/ Sar-Baum quibusdam. In pagis passim.

DLXI. Populus tremula, C. B. Pin. pag. 429. Populus Lybica, Matth. deutsch fol. 41. Lob. ic. pag. 194. o. Tab. lib. 3. f. 687. Dod. Lateinisch fol. 836. populus nigra, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 859. Lon. deutsch f. 43. Populo nigrae similis in Alpibus, Cæs. lib. 3. cap. 45. pag. 120. Populi tertia species, Cord. in Diosc. fol. 17. Aspen/ oder Poppel-Weiden/ Lon. Lybischer Pappel-Baum/ Tab. Aspen und Bellen-Baum Trag. Esphen Nostratibus. Cortex nigrae & albæ populi particulatim cæsus, & sulcis stercoratis mandatus, omni anni tempore edules fungos profert, Diosc. In sylvis copiosè.

DLXII. Potamogeton rotundifolium, C. B. Pin. pag. 193. Potamogeton, Trag. Kyber. in Trag. pag. 688. Matth. deutsch/ fol. 496. Lon. deutsch fol. 211. Tab. lib. 2. fol. 411. Fuchf. fol. 651. Cæs. lib. 8. cap. 22. pag. 332. Potamogetoni similis rotundiore folio, Cord. in Diosc. fol. 69. Potamogeton λειόφυλλον, Thal. pag. 85. Rund-blättriges Saam-Kraut Tab. Matth. Lon. Fuchf. In aquis stagnantibus passim.

DLXIII. *Potamogeton rotundifolium alterum Joh. Lœfel. Under rundblättriges Saam-Kraut. Folium unum æquo ferè intervallo ab altero distat, ubi verò novus exurgit ramulus, bina concurrunt folia, exortum ejus quasi firmantia. Am Pregel.

DLXIV. Potamogeton Salicis folio C. B. Pin. p. 193. Symal-blätterig Saam-Kraut. Potamogeton, Dod.

Lateinisch fol. 582. *Potamogeton angustifolium*, Tab. lib. 2. fol. 411. *Phyllitis lacustris*, Cord. hist. fol. 150. *Potamogeton* sive *Fontalis*, & *spicata*, Adv. Lob. f. 129. *Potamogeton* ἰτεόφυλλον, Thal. pag. 86. Spizig Saam-Kraut Tab. In aquis stagnantibus bey Königsberg passim.

DLXV. *Potamogeton* foliis latis splendentibus. Saam-Kraut mit weichen breiten glänzenden Blättern. C. B. Pin. p. 193. *Potamogeton altera*, Dod. Lateinisch fol. 582. *Potamogeton* μαλακόφυλλον, Thal. p. 86. Am Frisching.

DLXVI. *Potamogeton* foliis crispis, sive *Lactuca ranarum*, C. B. Pin. 193. Saam-Kraut mit krausen Blättern. *Fontilapathum pusillum*, Lob. ic. pag. 286. Adv. Lob. fol. 117. *Potamogeton* ἐλόφυλλον, seu *crispum*, aut *fimbriatum*, Thal. pag. 86. *Tribulus aquaticus minor*, Clus. hist. lib. 6. fol. 252. Clus. Pann. pag. 714. *Alga secunda*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 545. Das ander Saam-Kraut. Sebitz. in Trag. Kleiner Brunn- oder Frosch-Lattich quibusdam. In lacunis hinter dem Altstädtischen Walle nach der Hollen-Grund zu. Foliis provenit crispis, quæ majora ac longiora sunt, quàm in *Fontilapatho* pusillo, Lob. Crispitudo tamen foliorum minor est.

DLXVII. **Potamogeton gramineum latifolium*. Johan. Lœf. Klein großächtiges breites Saam-Kraut. Im Graben beyh. Bretter-Krüge.

DLXVIII. **Potamogeton gramineum tenuifolium*, Joh. Lœf. Klein großächtiges schmales Saam-Kraut. Plantula est ramosa, ac foliis crescit gramineis, longiusculis, atrovirentibus: in summitate caulis spica seu capitulum visitur exile, flosculis minutis exornatū. Im Graben beyh. Bretter-Krüge.

DLXIX. *Potentilla*, Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 45. Bauh.

Bauh. Matth. f. 718. Lon. deutsch f. 268. Cæs. lib. 14. cap. 23. pag. 557. Fuchf. fol. 619. Thal. pag. 91. Argentina Dod. Niederländisch fol. 948. Argentilla, Potentilla, Lob. ic. pag. 693. Anserina, Tab. lib. 1. fol. 425. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 382. Argemone altera, Gesn. Hort. f. 248. Genserich Tab. Matth. Lon. Fuchf. Grensch/ Grensing/ und Genserich/ Sebitz. in Trag. Gänskraut/ Grinsig/ Grunsing und Silberkraut vulgò. Plantula est in jus euntibus à Sagis commendatissima. Hanc statò tempore lectam rabula supersticiosus calceis immittit, ne causà cadat. Verùm præstant *διαγομαί*, nummorum aut sportularum elargitio. In Glossario: *διαγομή χρυσός*, *διαγομή ἀργύρος*, sportulæ. Restituenda hæc vox Plinio & Trajano epistolis 117. 118. ubi diamones scriptum pro dianomes: Sportulas explicat ipse Trajanus. De his donariis, à rabulâ elargitis, verè Cyprianus: Quantis hic sordibus emit, ut fulgeat? Circa vias & semitas passim. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. graduum nata, vulgò efficax. Radix effodienda, Sole primum arietis gradum obsidente: folia colligenda, Sole 15. Arietis inhabitante: flores, Sole in I. & constituto.

DLXX. Potentilla repens hirsutie incanâ, Johan. Lœf. Kriechender Gänserich mit raugen grauen Blättern. Bey Neuendorff am Wege.

DLXXI. Potentilla erecta major hirsutie incana, Großer gerader Gränsing mit raugen grauen Blättern. Spithamas duas longitudine planta, tota hirsutie incana, superat. Foliis profundè incisis, pronâ parte viridè pallentibus, supinâ albicantibus. Am Wege nacher Neuendorff.

DLXXII. Prunus sylvestris, C. B. Pin. pag. 444. Brunf.

Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 186. Matth. deutsch fol. 103. Dod. Lateinisch fol. 753. Fuchf. fol. 404. Lon. deutsch fol. 68. Cord. in Diosc. fol. 25. Gesn. hort. fol. 174. Lob. ic. pag. 176. σ. Tab. lib. 3. fol. 700. Cæs. lib. 2. cap. 15. pag. 48. *Prunus sylvestris vulgaris*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 796. **Wilder Schlehen-Baum**/ Tab. **Schlehen-Dorn** Matth. Lon. **Schlehen**/ Brunf. Fuchf. Sebitz. in Trag. Refrigerat, siccatur, & adstringit, maximè fructus. Ejus succus Acacia est officinarum, sed non vera. Aqua ex floribus cum vino destillata, in laterum doloribus, & cordis compressionibus magni est usus, Trag. Vinum pendulum octidui spatio restituunt pruna immatura adhuc, contusa & immissa. Exsiccata & contusa efficaciter idem agunt, Trag. & Tab. Folia & radices faucium ulcera sanant, & fluxiones avertunt gargarisatu. In der Hollen-Gründt copiosè. Item hinter Brandenburg nach dem Lenzken-Berg zu.

DLXXIII. *Prunella*, Fuchf. f. 621. Tab. lib. 2. f. 256. Cæs. lib. 11. cap. 37. pag. 453. *Brunella major* folio non dissecto, C. B. Pin. pag. 260. *Brunella*, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 26. Dod. Lateinisch fol. 136. *Symphytum petraeum*, *Consolida minor*, Matth. Lob. ic. pag. 474. *Symphytum petraeum*, Cord. in Diosc. fol. 62. *Consolida minor*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 684. *Consolida minima*, sive *Prunella flore purpureo vulgaris*, Cam. hort. 45. *Prunella* aut potius *Brunella Officinarum*, Eystett. *Prunella vulgaris*, vel sexta, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 245. **Braunellen**/ Tab. Brunf. Fuchf. Sebitz. in Trag. Gottheil und S. Antonii Kraut vulgò. Vulneribus medetur, grumos sanguinis dissolvit, & pulmone exulcerato aliisque faucibus partibus auxilio est. In asperis passim. Bey Naths Hoff/ zu
Stein

Stein-Bäck &c. Brevissimâ spicâ reperta est in der Oster-
rodischen Heide.

DLXXIV. *Prunella flore albo.* Joh. Lœf. Brunel mit
weißer Blüth. Bey Fischhausen hinter der Ziegel Scheune.
Item bey Hoppenbruch in Districtu Balgensf.

DLXXV. *Pulsatilla vulgaris*, Lob. ic. pag. 281. *Pul-*
satilla recentiorum, Cæs. lib. 14. cap. 11. pag. 550. *Pulsatilla*
communis, Cam. hort. pag. 134. *Pulsatilla folio crassiore*
& *majore flore*, C. B. pin. pag. 177. *Pulsatilla*, Bauh. Matth.
fol. 462. Dod. Lateinisch fol. 433. Gesn. hort. fol. 274. *Pul-*
satilla prima, Tab. lib. 1. fol. 97. *Pulsatilla vulgaris dilutio-*
re flore, Clus. hist. lib. 2. fol. 246. Clus. Pann. pag. 385.
Rüchenschell/ Brunf. deutsch fol. 143. *Herba Venti*, Trag.
Kyb. in Trag. p. 413. Lon. deutsch fol. 113. *Anemones species*,
Thal. pag. 15. *Rüchen-Schellen*/ Tab. Lon. Matth. Kyber.
in Trag. *Rüheschell* / *Nackel-Kraut* / *Schlotten-Bluhm*
vulgò. *Aqua Pulsatillæ verno tempore extracta*, experi-
mento certo, febrifuga est, unciarum trium pondere sumpta.
Vomitum movet acri sapore. Cæruleo colore destillata pro-
dit. Vide suprà *marrubium cardiaca dictum.* Bey Bran-
denburg und Frauenburg in siccioribus copiosè. Item in
der Wormditschen Heide.

DLXXVI. *Pulsatilla folio Anemones secundæ sive sub-*
rotundo: quæ 5. in prodr. C. B. pag. 94. Bey Lauten-Mühl
in collibus arenosis. Hinter der kleinen Schleuß jenseit des
Thames auff dem Berge copiosissimè. Aprili & Majo floret.

DLXXVII. *Pyrola rotundifolia major*, C. B. pin. p.
191. Groß rundblättriges Winter-Grün. *Pyrola*, Brunf. La-
teinisch/ tom. 3. fol. 8. Matth. deutsch fol. 411. Eystett. Tab.
lib. 2. fol. 432. Dod. Lateinisch fol. 138. *Pirola*, Gesn. hort.
fol.

fol. 272. *Pyrola à Pyri folio*, Lob. ic. pag. 294. Adv. Lob.
 fol. 122. *Pyrola major*, seu *Beta sylvestris* Thal. pag. 84.
Pyrola & Limonium sylvestre, Lon. deutsch fol. 219. *Pyrola*
vulgatior, Clus. hist. lib. 5. fol. 116. Antholog. magn. fol.
 104. *Pirola alia in campestribus*, Cas. lib. 8. cap. 32. p. 338.
Limonium, Fuchf. fol. 467. *Limonium sylvestre*, Trag. Ky-
 ber. in Trag. Winter-Grün/ Tab. Matth. Kyber. in Trag.
 Fuchf. Brunf. Wald-Mangolt/ Wald-Kohl/ Holz-Mang-
 golt vulgò, wilde Bete Nostratibus. In opacis & muscosis
 bey Schwanis und Neuhausen.

DLXXVIII. *Pyrola rotundifolia minor*, C. B. pin.
 pag. 191. Klein rundblätterig Winter-Grün. *pyrola quarta*
minima Clus. hist. lib. 5. fol. 118. Clus. pann. pag. 509. *Py-*
rola minima, Eystett. Anthol. mag. fol. 104. Inter *ericeta*
 bey Runzen und Bladau.

DLXXIX. **Pyrola acutifolia polyanthos radice ge-*
niculatâ. Joh. Lœf. Spiz-blättericht Winter-Grün mit
 vielen weißen Blümlein. *Radix alba ac nodosa cauliculo*
subservit viridi, rotundo, hirsuto, geniculato, pedem alto, sæ-
pè productiori, cui proximè terram folia adstant octo, fre-
quentiùs pauciora, virentia, ex oblongo mucronata: sin-
gulis porrò geniculis, cacumen versùs, foliolum exile & a-
cutum, caulem velut in vaginulâ servans, jungitur: tandem
subseqvuntur numerosi flosculi, à calyculis suis foliolo tenu-
issimo fultis, prodeuntes & albicantes. In der Fischhäus-
 schen Heide. Item hinter Latten-Walde.

DLXXX. *Pyrola folio mucronato serrato*, C. B.
 Pin. pag. 191. Winter-Grün mit gespizten und zerkerbten
 Blättern. *Pyrola minor* Thal. pag. 85. *Pyrola secunda*
tenerior, Clus. hist. lib. 5. fol. 117. Clus. Pann. pag. 505. *Py-*
rola

rola Pannonica secunda, Cam. hort. 134. In der Fischhäusschen Heyde.

DLXXXI. *Pyrola frutescens arbuti folio*, C. B. Pin. pag. 191. Staudechtiges Wintergrün mit zerkerbten langleichten Blättern. *Pyrola tertia vel fruticans*, Clus. Pann. pag. 505. Clus. hist. lib. 5. fol. 117. In der Fischhäusschen Heyde.

DLXXXII. *Pyrola alpine flore Europæa*, C. B. Pin. pag. 191. Wintergrün mit Hünerdarms Blut, Alsinanthemon, Thal. pag. 15. *Alysine alpina*, Schwenck. lib. 1. stirp. pag. 17. Im Penartischen und Löbznichtischen Walde.

DLXXXIII. *Pyrus sylvestris* C. B. Pin. pag. 439. Wilder Birn-Baum. *Pyra sylvestria*, Tab. lib. 3. fol. 720. *Pyra sylvestria majora*, Tab. lib. 3. f. 720. Holz-Birn / große Holz-Birn / Tab. Kirschen Borussia. *Junonis vetustissimum simulachrum* è *pyro sylvestri fabricatum* memoratur Pausaniæ lib. 2. Vide quoque Eusebium de Præparat. Evangelica c. 8.

DLXXXIV. *Quercus*, Trag. Kyb. in Trag. pag. 1102. Matth. deutsch fol. 69. Lon. deutsch / fol. 48. Tab. lib. 3. fol. 669. Fuchf. fol. 229. *Quercus cum longo pediculo*, C. B. Pin. pag. 420. *Quercus vulgaris*, Lob. ic. pag. 154. O. *Quercus vulgaris*, Hemeris, Cord. in Diosc. fol. 21. *Quercus Pannonica latifolia*, rectius *Cerrus*, Cam. hort. pag. 135. Eichen-Baum / Tab. Matth. Lon. Fuchf. Eichen vulgò. * *Flosculos habet elegantissimos, longius ab arbore pendentes. Ramulis assunt nonnunquam rotundiuscula corpora, squamea primum, mox villosa, Bedegvaris ferè effigie. Galla seu fructus quercus, quæ nunc Dioseoridi, insecta aliquando intus alit. Ex Gallis majoribus diffractis, nunc pestilitatem, nunc bellum, nunc annonæ caritatem, prælagus colligit vul-*

gus, & quidem hōc modō: araneum si cōtineat Galla, pestem & malignas febres: muscam si alat, bella: eruculam si concludat, famem incolis pōtendit. Sant alii, prognosticum augurale ita constituentes: Auctumnō effractā gallā, araneus annum inauspicatum: musca tolerabilem: acarus frugiferum spondet. Cassa verō si sit galla, & nihil horum contineat, funera indicit. Præcoces & uberrimæ circa Festum Michaëlis gallæ, hyemem signant temporius adventuram & niviosam. Adstringit cortice, folio, glande & gallâ. Juvat sanguinem tussientes, egerentes, foriolos, & genituræ profluvio laborantes. Emplastrum ex quercu Lœselii ita paratur: R. corticum teneriorum quercûs, radicum quercûs, turionum quercûs, florum quercûs, rasuræ ligni qvernî ana libr. semis. olei veteris libr. III. coquantur, ac in infusione commorentur aliquot dies, post colaturæ adde lithargyrii aurei triti ac creti libr. $1\frac{1}{2}$. coquantur aliquvandiu, & inter coquendum affundantur succi foliorum quercûs, aquæ foliorum quercûs ana libr. $1\frac{1}{2}$ tandem ubi bullæ volantes in auras assurgunt, & consistentia debita adest, per incerniculum insperge pulveris foliorum quercûs, florum quercûs ana linc. 3. corticum quercûs linc. 2. visci querc. cum foliis, gallarum, cupularum, glandium, granorum chermes ana linc. $1\frac{1}{2}$. agitentur omnia quercinâ radiculâ, fiatque l. a. emplastrum sine cerâ. Ulsus: validè adstringit, siccatur, repellit, intercipit, discutit, & glutinat. Herniosos ergò, vomitores, foriolos, sanguinem sputantes, vel per alvum, aliaque loca egerentes, juvat, & abortationes prægnantium præcavet. Sacros ignes, & consimiles ferventias, mulcet, tumores discutit, & arthriticos sistit dolores. Ulcera adhæc ichoribus fatigata solidat, & ossa fracta ferruminat. In Borussia propè Welaviam in pago

pago Oppen reperta est olim quercus, cujus perimenter viginti septem ferebatur in ulnas. Annosa & cava jam quercus equitem equo ephippiato insidentem, ac intus tumultuantem, ultrò admisit, quod tentaverat etiam divus Albertus, primus Borussiae Dux, ejusque Filius Albertus Fridericus. Tale quidpiam legimus etiam de Platano, auctore Plinio Lib. XII. c. 1. quæ in Lyciâ nata, ac cavata, specum intus habuit in circuitu octuaginta & unius pedum. In hac specû Lucinius Mutianus ter COS. cum octodecim aliis viris, saliare in morem epulatus est. Perdurat autem annos sæpè trecentos & multò plures ipsa quercus. Seculum crescendo, seculum vigorem servando, ac denique seculum marcescendo insumere creditur vulgò. In Vaticano ilex vetustior erat urbe Româ, teste Plinio Lib. XVI. c. 44. ubi simul tradit, Romæ in arcâ Lucinæ lotum fuisse arborem CCCCL. tunc circiter annorum. Sunt, qui de quercu numen faciunt, de Numine $\phi\phi$. ut loquitur Buchananus in Franciscano. Hinc Sacra olim erat quercus idololatrie Borussiae ob Gorcho, esculentorum & potulentorum Deastrum, quem sedem in quercu, ubi locorum nunc est oppidum Heiligenbeil/ seu Hieropolis, habuisse ferunt. Huic Gorcho perpetuus servabatur ignis, & omnis generis primitiæ offerebantur, v. gr. frumenti, farinæ, mellis, lactis, captorum piscium, aliorumque eduliorum, oblataeque Mulcibero igni tradebantur. Quercum hanc post unâ cum idolo Anshelmus primus Ermlandiae Episcopus correptâ bipenni excidit, & in cineres redegit. Alia quercus latissima & trifida habebat Rickojothi in medio Natangensis tractus, in qua triplex colebatur idolum, Potollo, Perkunoš, & Potrympo. Potollo sacrificii loco immolabantur capita extinctorum hominum ac pecorum. Deaster hic sæpissimè domos infestabat ditiorum maximè, ubi è vivis quòdam sub-

latò pauciores essent in victimis offerendis. Tùm enim noctu homines adortus, crebrius illis faceſſebat negotium. Solemnibus diebus huic in honorem ſebum in ollis cremabatur. Perkunos alter erat Deaſter, cui fovebatur ignis ex lignis quercinis, iisque aridis accenſis, perpetuò flagrans, ſacrificiis cremandis deſtinatus: eò extinctò ſacrificulus incurrebat diſcrimen vitæ. Potrympo tertius erat Deaſter, cui à ſacrificulo angvis lacte enutritus ac frumento cooperatus conſecrabatur. Ejus in honorem infantes necabantur, thus ac cera cremabantur. Quercus hæcidolis inſtructa, foliorum virorem nunquam amiſſiſſe, ſed perpetuò, etiam brumali tempore, eundem ſervâſſe perhibetur. Huic arbori decus & Autoritatem Ancus Marcius, Rex Romanus, addidit, qui uſu æris nondum repertò, primas leges Romanas, & priſcos qualescunque ritus, in quercinas tabulas incidit. Proverbium eſt apud Græcos & Noſtrates, loqui à quercu, & ad quercum. Senſus eſt, omni poſitò metù, cum omni ſecuritate verba facere. Quercus enim cùm ſit arbor Jovis, ad hanc quiquis confugiebat, in tuto credebatur uſque, & ſub tutelâ Numinis. In congreſſu venereo coles ne maſculeſcat ſcincus remita diſturbant: Quernus ramulus, ſuſum rectâ pullulans, ſolem verſus acuitur, ac reſecatur: poſt acumine ſuo terræ deſigitur, quam lotio paulò ante perpluit ſcincandus. Deſixus ita ramulus, ac proculcatus, impotentiam creat, donec eruatur. ſcincum hoc ſolvunt ſcopæ betulinx inverſæ, lotio in ſummitatem diſfuſam immiſſo. Quò largior glandium proventus, eò frumentorum eſt parior. Ante fruges cognitæ Arcadibus, & in univerſum gentibus priſcis, glandes fuère frumenti locò: Sicut pyra Argæis & Tirynthiis. Virgilius 1. Georgic.

Concussaq; famem in sylvis solabere quercû. Sed deinde
Quernaq; glans victa est utiliore cibò. Ovid. lib. i. Fast.
 Hinc post esum sequebantur ructus. Juvenal. Satyr. 6. v. 10.

- - - *Glandem ructante marito.*

Iberi in Symposiis glandes in secundis mensis apponebant. Cuivis olim glandem suam, in alienum fundum procidentem, tollere licuit in alieno. Ita cautum est, lege XII. tabularum, auctore Pliniô lib. XVI. c. 5. Idque attestatur Jurisconsultus in l. unica ff. de glande legendâ. Sed & tu interim vide I. Julianus §. 2. ff. ad exhib. Extemporaneum atramentum scriptorium si expetas, succò ex gallis expressò pulvisculum vitrioli ammisce, addito, ne situm contrahat, pauillo salis vel gummi Arabici. Quercus inter duas laurus plantata olim erat Romæ ante Palatium Imperatorium, tacitè innuens, Heroicâ virtute ac fortitudine Principum niti Rempublicam. Quercus namque signum est conservati Civis: Laurus verò victoriæ ac triumphî. Hinc Cæsares bello victores in Capitolum ducebantur lauro redimiti, milites verò, qui pro Civium salute fortissimè omnium steterant, quernâ cingebantur coronâ, unde & hæc corona, ex quernâ fronde scilicet, civica olim dicebatur, cui & aurea cessit. Hujus coronæ proprium erat, ut illâ donatis perpetuò eam gestare liceret. Tradebatur militibus ab Imperatore vel Duce exercitûs. Graminea verò seu obsidionalis corona, ex illo fiebat gramine, ubi cives obsidione liberabantur, & dabatur servatori ab universo exercitu. Hæc æstimatione immensâ cæteris coronis longè præcellere credita est. De quercu adhuc notabile id est: Saxum aliquod ingentis molis, obstaculo existens, ubi in frustra redigere animo habes, fac struem circumcirca segminum quercino-

cinorum, quâ accensâ candescat saxum, pōst ferreī malleī impetuosō, ac fervidē iteratō concussu, saxum aliquoties terre, in frustra mox dissiliendum, & loco amovendum. Hoc artificio diffRACTUM novi saxum, duodecim molares lapides portionibus suppeditans suis. Nemirare, verum est, molitores seu moletrinae si consulueris artifices, vel potius experientiam ipsam.

DLXXXV. *Quercus marina*, Lob. ic. pag. 255. o. Tab. lib. 3. fol. 670. Clus. Hisp. pag. 25. Clus. hist. lib. 1. fol. 21. *Fucus maritimus*, vel *Quercus maritima* vesiculas habens, C. B. Pin. pag. 365. Meer- oder See-Eich/ Tab. See-Eich mit Blasen. Chamarum testis & lapidibus ferrumine quasi quōdam affirmatur, radice destitutâ. Folia ejus atrō sunt virore, recenter ē mari expulsa; siccata nigrescunt, & glutinis instar splendent. Succus est ferruginei & stiptici. Im Germauschen und hinter Runzen. Copiosius in littoris glessaria ejecta, succini parum promittit legentibus. Fucus verō marini quō plus egeritur, eō uberior glessi seges.

DLXXXVI. *Quinquefolium majus repens*, C. B. Pin. pag. 325. *Quinquefolium vulgare quartum*, Tab. lib. 1. fol. 436. *Quinquefolium majus luteum*, Fuchs. fol. 624. *Quinquefolium*, Matth. Bauh. In Matth. fol. 719. Cord. in Diosc. fol. 64. Cæs. lib. 14. cap. 19. pag. 554. *Quinquefolium*, sive *Pentaphyllum vulgare*, Lob. observ. fol. 393. *Quinquefolium majus*, Dod. Lateinisch/ fol. 116. *Pentaphyllum*, Gesn. hort. fol. 271. *Pentaphyllum repens*, Cam. hort. p. 119. *Pentaphyllum primum & secundum*, Lon. Deutsch/ fol. 242. *Pentaphyllum minus* Brunf. Lateinisch/ tom. 2. fol. 34. *Pentaphyllum vulgare*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 505. Pen-

Pentaphyllum majus, Thal. pag. 88. Gemein Fünff Finger Kraut / Tab. Groß Fünff Finger Kraut / Fuchsl. Fünff Blatt / Fünff Finger Kraut / Matth. Klein Fünff Finger Kraut / Brunf. Groß gemein kriechend Fünff Finger Kraut. Radice est oblongâ, foris nigricante, intus subrubente: Cauliculis rotundis virentibus, quaquà versum humi reptantibus fragariæ instar, & latè se diffundentibus: foliis quinis, viridibus, oblongis, serratis, pediculis longiusculis: floribus Anserinæ luteis, itidem longis petiolis instructis. Reliqua inter quinquefolia efficacissimum, & officinis usuale. Radices, folia & flores vehementer sed citra morsum ac manifestum calorem adstringunt, & siccant tertio recessu, venenis ac pesti resistunt, & sangvinem undecunque fluentem cohibent. Radix decocta, ac triginta dies pota epilepsiæ medetur. Pluss dem Tragheimischen Kirchhoffe. Item Bey der Schwanischen Weühl. Quinquefolium optimum sub elevatione poli graduum 45. 46. 47. 48. 49. natum, ac effosum Sole primum Arietis gradum inhabitante.

DLXXXVII. Quinquefolium minus repens luteum, C. B. Pin. pag. 325. Klein kriechend Fünff Finger Kraut. Quinquefolii minimum genus, vel primum, Trag. Kyber. in Trag. 505. Pentaphyllum minus luteum, Adv. Lob. fol. 307. In locis arenosis passim bey S. Albrecht.

DLXXXVIII. Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum, C. B. Pin. pag. 325. Pentaphyllum sive Quinquefolium minus, Tab. ic. pag. 123. Quinquefolii quarti flavo flore prima species, Clus. hist. lib. Quinquefolii quarti secunda species, Clus. Pann. pag. 429. Klein kriechend Fünff Finger Kraut unten mit Aschfarben Blättern. Gemein Klein Fünff Finger Kraut / Tab. Foliis est supra viridibus, infra

infra cinereis; flosculis croceis. Radix & folia cum adstri-
ctione siccant. In saxosis passim bey Königsberg.

DLXXXIX. *Quinquefolium erectum luteum* dor-
so foliorum incano. Joh. Lœf. Stehend Fünff Finger
Kraut/ dessen Blätter auff einer Seiten ganz weiß. Ra-
dice est longiusculâ, ex atro rufescente, & fibrosâ: caulicu-
lis erectis cubitalibus, rufulis, lanugine candidâ, fastigium
versus pubescentibus, & in ramulos abeuntibus: Foliis infe-
rioribus longissimo albicante & hirsuto pediculo innitenti-
bus, qui in reliquis brevior. Dividuntur autem folia in
quinque lacinias, ex angusto ampliatas, per ambitum pro-
fundius incisas, superiore parte virescentes, dorso incanas.
Flores habet croceos, quinquefolios, staminulis aureis, quos
insequitur minutissimum semen, Bey der Kneiphöfischen
Wind-Mühl in arenosis.

DXC. **Quinquefolium hirsutum luteum* pauciori-
bus laciniiis. Joh. Lœf. Gelb raug Fünff Finger Kraut
mit wenigern Blättern. Radix foris ex pullo ruffa, intus albi-
cans & lignosa, longis fibris, cauliculos edit cubitales, sæpè
& majores, rotundos, virides, hirsutos, multifariam brachia-
tos ac humi procumbentes, quibus folia adnascuntur oblon-
ga, in tres tantum lacinias divisa, longis suffulta pediculis,
pronâ parte virentia, dorso pallido, hirsutie villosâ, per o-
ras incisa, duobus aliis ad exortum pediculorum foliolis in-
structa, ex quibus novi subinde se emergunt thyrsuli. Ca-
cumina horum luteis exornantur flosculis, foliolis sustentatis
suis, quibus succedit capitulum exile, frago haud absimile, in
minutissima & facile diffluentia semina transiens. Am Alt-
stârtschen Ball nicht weit vom Baum.

DXCI. *Quinquefolium palustre rubrum*, C. B. Pin.
pag.

pag. 178. Lob. ic. pag. 674. Tab. lib. I. fol. 132. Gelbe
Wald-Violett. *Ranunculus phragmites* flore luteo, Gefn.
hort. fol. 246. *Ranunculi sylvestris* alterum genus, Trag.
Kyber. in Trag. p. 97. *Ranunculi* quarta species lutea, Fuchf.
fol. 162. *Anemone sexta*, Dod. Lat. fol. 435. *Ranunculus*
nonus, Lon. deutsch fol. 199. *Ranunculi* tertia species,
Cord. hist. fol. 120. *Ranunculus nemorosus* flore luteo,
Adv. Lob. fol. 300. Eystett. *Anemone montana* colore lu-
teo, Cas. lib. 14. c. 10. pag. 549. Ein unbekant Wald-
Kraut. Brunf. deutsch fol. III. *Herba sylvestris ignoti no-*
minis, Brunf. Lateinisch/ tom. 2. fol. 80. Geel Aprillen-
Blumen. Geel Wald-Händlein. Tab. Lon. Fuchf. Geele
Hasel-Blumen quibusdam. Vis ei exulcerans, Bey Lau-
ten-Mühl in fruticetis.

DXCIII. *Ranunculus nemorosus albus*, Tab. lib. I.
fol. 132. *Ranunculus nemorosus*, Lob. ic. pag. 673. *Ra-*
nunculus candidus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 74.
Ranunculi quarta species lactea, Fuchf. fol. 161. *Ranunculi*
quarta species, Cord. hist. fol. 120. *Ranunculus sylvarum*,
Clus. hist. lib. 2. fol. 247. *Anemone quinta*, Dod. Lateinisch
fol. 435. *Anemone sylvestris vulgaris* flore niveo, Clus.
Pann. pag. 385. *Ranunculus octavus*, Lon. deutsch/ f. 199.
Ranunculus phragmites flore albô, Adv. Lob. fol. 300.
Anemone montana colore candido, Cas. lib. 14. cap. 10.
pag. 549. *Ranunculi* tertii, tertium & quartum genus, Thal.
pag. 96. & 97. *Anemone nemorosa* flore majore, C. B.
Pin. pag. 176. Weiß Aprillen-Blumen / Sebitz. in Trag.
Weiß Wald-Händlein/ Tab. Fuchf. Lon. Augen-Wurz/
und weiß Mergen-Blum quibusdam. Weiße Violett Borus-
sis. *πυραϊνός* est, linguam acredine vellicans. Succus ver-
rucas aufert illitu. Ternos ejus flores, intuitu primo, verno

tempore notatos ac totidem Hepaticæ nobilis, supersticiosa plebs ingerit adversus febrim, quam metuit. In sylvis & frutetis passim. Vere primo.

DXCIV. *Ranunculus nemorosus* Muscatellina dictus, C. B. Pin. pag. 178. *Aristolochia rotunda* concava similis herbula, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 608. Moschatella, Cord. hist. fol. 172. Moschatella Cordi, Thal. pag. 78. Moscatella, Cam. hort. pag. 103. *Fumaria bulbosa* seu tuberosa minima, Tab. ic. p. 39. *Ranunculus minimus* Septentrionalium herbido musco flore & Muscatella Cordi, Lob. ic. p. 674. Biesem Hanen-Fuß. Kleineste Hollwurz/ Biesem Kraut/ Tab. Acris est & moschum olet. In der Hollen-Grund passim.

DXCV. * *Ranunculus nemorosus hirsutus* foliis Caryophyllatæ. Joh. Lœf. Rauher Bald-Hanen-Fuß mit Benedikten-Wurz-Blättern. Radix è filamentis longiusculis constituta caulem emittit hirsutū in summate ramosum, cui alternatim assistūt folia, profundis & minüs profundis incisuris, hirsuta, thyrsulis longis insistentia, quorum inferiora in latiore solo nonnunquam tam grandia, ut digitis expansis peripheria vix exhauriri possit. Sæpius tertiam partem ejus granditatis haut sunt, & subsequētia folia longè minora. Cauliculos ubi promit caulis in exortu, ternariis committit folia, mox cacuminibus eorum flosculos indulget aureos, foliolis quinque constantes, semine post in capitulis congesto. Floret Mense Majo. Bey Selnicken in fruticetis. Item im Penartischen Walde/ und in der Hollen-Grund.

DXCVI. *Ranunculus pratensis erectus* acris, C. B. Pin. pag. 178. *Ranunculus luteus*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 73. *Ranunculus pratensis* surrectis cauliculis, Lob.

Lob. ic. p. 665. *Ranunculus sylvestris* & secundus, Tab. lib. 1. fol. 131. *Ranunculus hortensis* secundus, Dod. Lateinisch / fol. 426. *Ranunculus polyanthemus maculatus*, Thal. pag. 98. *Bluffgericht stehend scharffer Wiesen-Nanenfuss* / *wilder Nanenfuss*. Tab. Gelb *Nanenfuss*. Sebitz. in Trag. *Acker-Nanenfuss* quibusdam. *Folia Persicariae* instar nonnunquam maculantur, & tùm vehementiùs urunt. In pratis passim.

DXCVII. *Ranunculus pratensis* repens hirsutus, C. B. Pin. p. 179. *Ranunculus pratensis* etiàmq; *hortensis*, reptante cauliculo, Lob. ic. p. 664. *Ranunculus hortensis* primus, Dod. Lateinisch / fol. 425. *Ranunculus vinealis*, *Batrachium vineale*, Tab. ic. pag. 54. *Kriechender Wiesen-Nanenfuss* / *Weingart-Nanenfuss* / *Weihen-Fuss* / Tab. In hortis proveniens latioribus est foliis, in pratis minoribus. Calidis & exurens est. In arvis passim.

DXCVIII. *Ranunculus pratensis* radice verticilli modo rotunda, C. B. Pin. pag. 197. *Crus galli*, Brunf. Lateinisch / tom. 1. fol. 145. *Ranunculus bulbosus*, Lob. ic. p. 667. Thal. pag. 96. *Ranunculus radice bulbosâ*, Cam. hort. pag. 136. *Ranunculus tuberosus*, vulgò *Rapum D. Antonii*, Dod. Lateinisch / fol. 431. *Ranunculus exiguus* & primus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / fol. 73. *Ranunculi* tertia species, Fuchs. fol. 160. *Ranunculus minor*, *flammula*, seu *Ranunculi nona species*, Cord. hist. fol. 121. *Ranunculus minor*, Tab. lib. 1. fol. 131. *Ranunculus quintus*, Bauh. Matth. fol. 459. Lon. deutsch fol. 199. *Ranunculus flammula dictus*, Gesn. hort. fol. 275. *Ranunculus lanuginosus* primus, Cæs. lib. 14. c. 2. p. 544. Vulgò *Rapum Divi Antonii*, Dod. Lateinisch / fol. 431. *Brenn-Kraut* / *Nanenfuss*
Ec 2

Fuß mit runder Wurzel. Kleiner Hanen-Fuß/ Tab. Brunk. Fuchf. Der kleine und schalckhafftige Hanen-Fuß/ Sebitz. in Trag. Drüß-Wurß/ Tauben-Fuß/ Lon. Hanen-Fuß oder Gleiß-Blumen die fünffte/ Matth. Rüben- Hanen-Fuß vulgö. Gehöflete Gleiß-Blümlein/ Helvet. Gefn. hort. In locis saxosis minor est, in hortis altiör, in pratis medioximus. Radix quotannis nova exoritur, veteri deorsum missä. Pesti correptorum juxta Tragum eadem cum sale tusa femori aut brachio utiliter affirmatur, virus evocandi causä: Locum quippe celerrimè exulcerat, vesicä inductä. Bey Königsberg passim. Nach der Lauten-Mühl zu.

DXCIX. *Ranunculus arvensis echinatus*, C. B. Pin. pag. 179. *Ranunculus arborum* Lob. ic. pag. 665. *Ranunculus arvensis angustifolius* sive *decimus quartus*, Tab. lib. I. fol. 134. *Ranunculus arvensis*, Gefn. hort. fol. 275. *Ranunculus sylvestris tertius*, Dod. Lateinisch fol. 427. *Ranunculi hortensis simplicis prima species*, Fuchf. fol. 157. *Ranunculus sativus*, Fuchf. ic. pag. 86. *Ranunculus arvensis sive quinta species*, Cord. hist. fol. 120. Acker-Hanen-Fuß mit stachlichten Köpfen. Acker-Hanen-Fuß/ Tab. ungefüllter Garten-Hanen-Fuß/ Fuchf. Flosculus provenit luteis, quibus semen succedit spinis horrens. Am Weisseltamme / ubi trajectus pontone Dantisco Elbingam versus.

DC. *Ranunculus palustris Apii folio levis*, C. B. Pin. pag. 180. Glatte Eppichblättriger Wasser-Hanen-Fuß. *Apium aquaticum*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 93. *Ranunculus palustris rotundiore folio*, Lob. ic. pag. 669. *Apiastrum primum*, Cord. in Diosc. fol. 57. *Ranunculus palustris* Cord. hist. fol. 119. Thal. pag. 99. *Ranunculus palustris folio Apii*, Cam. hort. pag. 136. *Ranunculus palustris sive tertius*, Tab. lib. I. fol. 131. *Ranunculus primus*, Bauh. Matth.

Matth. fol. 457. Ranunculi primum genus, Gesn. hort. fol. 275. Ranunculus tertius, Lon. deutsch fol. 198. Wasser-Nanzen-Fuß / Tab. Lon. Wasser-Epff / Brunf. Lon. Frosch-Pfeffer / Feig-Blattern-Eppich / vulgò. In locis uliginosis passim.

DCI. Ranunculus palustris Apii folio lanuginosus, C. B. Pin. pag. 180. Ranunculi secunda species, vel Sardous Ranunculus Cord. hist. fol. 119. Ranunculus secundus, Bauh. Matth. fol. 458. Rauher Eppich / blätterichter Nanzen-Fuß. Nanzen-Fuß oder Gleiß-Blum die andere / Matth. Lanuginosus est, & plusculis foliorum incisuris. In incultis & arenosis passim bey Königsberg.

DCII. Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo, C. B. Pin. pag. 180. Wasser-Nanzen-Fuß theils mit runden / theils mit haarächtigen Blättern. Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie, Lob. ic. pag. 75. o. Ranunculus fluviatilis, Tab. lib. I. fol. 144. Ranunculus aquatilis, Dod. Lateinisch / fol. 587. Wasser-Nänlein / Tab. Fluß-Nänlein / Fluß-Nanzen-Fuß / Wasser-Leber-Kraut / Fluß-Leber-Kraut und Wasser-Leber-Blümlein vulgò. In lacunis auß der Alt-städtischen Schlapper-Wiesen.

DCIII. Ranunculus longifolius palustris major, C. B. Pin. pag. 180. Ranunculus lanceatus major, Tab. lib. I. fol. 135. Ranunculus *μακρόφυλλος*, Thal. p. 100. Groß lang Wasser-Nanzen-Fuß / Tab. Großer Speer-Nanzen-Fuß vulgò. Circa radicem, quæ ex filamentis constituitur, cauliculi concavi ac geniculati notantur iique repentes, à Tabern. omitti, quorum singulis geniculis additæ sunt fibræ, radicationi destinatæ. Filamentis illis tenaciter affirmari conspiciet corpuscula quædam oblonga ac nigricantia, ex quibus

tractu temporis prodeunt muscæ subvirides, ac velut auratæ, alas sub velamentis gestantes, quæ circa finem mensis Augusti avolant, nidulis suis post se relictis. Accidit hoc in Museo meo, ubi, postquam ranunculum quatuordecim ferè dies servâssem, ac corpusculum unum, jam nonnihil lacerum, aperuisssem, exiit musca lento gressu, quæ apricitate diei excitata paulò post avolabat, me spectante. Provenit in der Hollen Grund. Item hinter Fischhausen in pratis uliginosis.

DCIV. Ranunculus palustris serratus, C.B. Pin. p. 180. Ranunculus aquatilis angustifolius serratus, Lob. ic. pag. 670. Flammula Ranunculus folio serrato, Dod. Lateinisch/ fol. 432. Ranunculus lanceatus serratus, sive decimus nonus, Tab. lib. I. fol. 135. Langer Wasser-Nanens-Fuß Tab. Ge-kerfft Speer-Kraut/ und gekerffet langer Wasser-Nanens-Fuß vulgò. In humidis & riguis passim. Radix denti eroso inserta, excidium ei parat. In affectu febrili rustici hóc utuntur Ranunculò. Ranunculi hujus folia manuum carpis, ubi arteriæ subfultim ludunt, paroxysmo ingruente, affirmata, die naturali elapso remota, ac flammis cremata, quartanam febrim expugnant, vicibus tribus ante paroxysmum re institutâ. Flammulam ranunculum ab ullo unquam ore assumptum fuisse, nuspiam invenio apud Botanicos. Verùm ex vulgo sunt, qui eundem in scorbuto præsentissimum esse præsidium clamitant, ac multos eo restitutos dictitant. Capiunt autem succi libram unam, commiscent vini Francici libras duas, maceraturi tempus benè longum miscellam, Post dimidium cochlear porrigunt scorbuticum malum vel metuentibus, vel nutrientibus. Acredinem medicamenti in ventriculo si sentiunt assumptes, indicium est, satis fuisse assumptum, sin minus, cochlear totum ingerendum præbent. Ra-

nun-

nunculi folia colligenda, Sole in & hærente: flores Sole 15. & inhabitante.

DCV. *Ranunculus montanus Aconiti folio flore globofo*, C.B. Pin. p. 182. *Hanen-Fuß mit Wolfs- wurtz Blättern/ und Kugelrunden Blumen.* *Ranunculus alpinus luteus*, si- ve undecimus, Tab. lib. 1. fol. 133. *Trollius flos*, Gesn. in monte fracto. *Trollius flos ampliore flore & aureo*, Clus. Pann. pag. 372. *Ranunculus sextus*, Bauh. Matth. fol. 459. *Anemone montana quædam*, Gesn. hort. fol. 247. *Ranunculus flore globofo*, Dod. Lateinisch. fol. 430. Eystett. *Ranunculus montanus alpinus glomeratus*, Lob. ic. pag. 675. *Ranunculus globosus siue montanus*, Cam. hort. pag. 137. *Alphanen-Fuß*. Tab. *Troll-Blum/ Glocken-Blum* quibusdam. Ad pratorum margines bey m Penartischen Walde.

DCVI. **Ranunculus aconitifolius folio rotundo ad radicem præstolante*. Joh. Lœf. *Hanen-Fuß mit Wolfs- wurtzhafftigen Blättern/ da ein rundes Blat an der Wurzel sitzt.* *Radix ex filamentis albidis exstructa*, caulem edit cubitallem, rotundum, viridem, fastigium versùs brachiatum & geniculatum: imo geniculo folium undecim laciniis circumferratis & virentibus superbiens, reliquis geniculis folia paucioribus divisuris assident, quæ subfervit aliud degener folium, orbiculatum & crenatum, petiolum longum à radice mutuans: flosculis est croceis in caulium summo hæsitantibus. In Districtu Elbingensi, & quidem in cavâ valle, juxta tramitem *Pfaffen-Steig*/ quâ itur à pago *Lenzen* ad pagum *Dörbeck*. Item bey *Lauten-Mühl*. Mense Majo.

DCVII. *Raphanus sylvestris*, Fuchf. fol. 660. *Thlaspi alterum*, Diosc. lib. 2. c. 186. *παράρις ἀγρία*, Diosc. lib.

lib 2. c. 138. Raphanus major, Trag. Seb. in Trag. Deutsch f. 84. Gesn. hort. fol. 275. Raphanus vulgaris seu rusticus, Bauh. Matth. f. 350. Thlaspi majus, Cord. in Diosc. f. 46. Lon. Deutsch fol. 196. Thlaspi magnum. Cæs. lib. 8. cap. 78. pag. 367. Raphanus rusticus, C. B. Pin. pag. 96. Raphanus rusticus crassâ radice, Lapathii folio, Lob. ic. pag. 320. Raphanus rusticus, Cam. hort. pag. 138. Raphanus magna, Radicula magna, aut rusticana, Dod. Lateinisch/ 677. Raphanus marinus Tab. lib. 2. fol. 124. Raphanus agrestis sive Armoracia, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 197. Meerrettich/ Tab. Fuchsf. Sebitz. in Trag. Lon. Green/ Matth. Merrieh oder Bauren-Senff quibusdam. Calidus tertio, siccus secundo; tum radice, tum semine, crassâ incidit, obstructa aperit, renes expurgat, urinas mensesque ciet, calculos comminuit, & scorbuticos juvat. Folia decocta & cum oleo in cataplasma aptata, jecoris ac lienis durities molliunt, & urinæ stillicidio auxiliantur, Dod. In prato beyrn Mühlen-Fluß zu Schwanis. Semen nullum fert, Autore Gesnero in Hort. fol. 196. Raphanus pœna olim erat adulterorum. In Attide qui alterius vitiâset uxorem, raphano per obscœna afficiebatur, ut eâ ignominiâ notatus, à contagio alienæ uxoris abstineret. Apud Cumæos contra adultera asino imposita traducebatur, dicebaturque ὀφθαλμός, teste Plutarcho in Quaestionibus Græcis. Pœna autem raphano illata παρὰ Davidis, h. e. raphani in pedicem impulsio, dicebatur Atheniensibus, unde παρὰ Davidis, qui tali pœnâ excruciabantur: quemadmodum παρὰ γυναικός, quibus vibrissæ è naribus, & pili è pudendis, ob adulterium, evellebantur. Insignem verò dolorem ex raphanidosi patiebantur mæchi, majorem ex mugili, omnium sævissimum ex scorpio pisc. Juvenalis:

- - - quosdam Mæchos & mugilis intrat.

Horat.

Hunc perminxerunt calones, quin etiam illud

Accidit, ut cuidam testes caudamque salacem

Demeteret ferrum, jure omnes: Galba negabat.

DCVIII. *Raphanus aquaticus* foliis in profundas
lacinias divisis, C. B. Pin. pag. 97. *Radicula sylvestris*.
Dod. Lateinisch/ fol. 677. *Raphanus sylvestris officinarum*
aquaticus, Lob. ic. pag. 319. *Raphanus aquaticus* Tab. lib.
2. fol. 123. *Sisymbrium sylvestre*, Cæs. lib. 8. cap. 69. pag.
362. *Wasserrettich mit tieff zerschnittenen Blättern/ Wasser-*
rettich/ Tab. Wilder Rettich vulgò. Foliis est nunc bre-
vioribus & angustioribus, quorum ambitus quandoque est
ferratus, quandoque profundè incisus: nanis flosculis luteis,
ramusculos caulium exornantibus, & in minutas siliquas de-
sinientibus: radice gustû acri & mordace. In lacunis bey
der neuen Brück.

DCIX. Raphanus aquaticus alter, C. B. Pin. pag. 97.
cujus icon in Prod. pag. 38. Rapiſtrum aquaticum, Tab. lib.
2, fol. 118. Waſer-Nederich/ Tab. Radix copioſiſſimis fila-
F f mentis

mentis caules promit, inferius magnis & latis instructos foliis, quæ cacumina versùs sensim angustantur, acuminantur & inciduntur. Caulium summitates flosculis candidis, stellatis exornantur. Im Dangker Berder milliare dimidium ab urbe circa fossam.

DCX. Rapisstrum flore luteo, C.B. Pin. pag. 95. Rapisstrum, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 159. Dod. Lateinisch fol. 675. Gesn. hort. fol. 275. Sinapis agrestis alterum genus Trag. Kyber. in Trag. pag. 100. Lamplana, Bauh. Matth. fol. 356. Lon. deutsch/ fol. 225. Lamplana flore melino, Tab. lib. 2. fol. 118. Rapisstrum arborum, Lob. ic. 198. Raphani altera species in arvis proveniens, Cord. in Diosc. fol. 44. Radix sylvestris, Cæs. lib. 8. cap. 55. pag. 353. & 354. Hederich/ Brunf. Nostrates vetulæ olera decocturæ his plerumque ammiscent folia tenella rapistri lutei, commendata sapore toties. Hederich/ oder Heiden-Rettich/ Lon. Acker-Kohl mit bleichgelben Blumen/ Tab. Rüdig Nostratibus. In arvis passim. Foliis est nunc incisis, & sinuatis, nunc integris.

DCXI. Rapunculus spicatus, C.B. Pin. pag. 92. Grofse Rapungel mit einer Fuchs-Schwanz-Aehr. Rapunculum sylvestre, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 576. Lon. deutsch fol. 224. Rapunculus quintus, sive nemorosus primus, Tab. lib. 2. fol. 120. Rapunculum alopecuron, Dod. Lateinisch fol. 165. Rapunculus sylvestris spicatus albens, Thal. pag. 94. Phyteuma foliis rapunculi, Cæs. lib. 9. cap. 30. pag. 386. Rapuntium majus Alopecuri comoso flore, Lob. ic. pag. 329. Adv. Lob. fol. 140. Rapunculus flore spicato albo, Cam. hort. pag. 138. Rapunculus alopecuroides longiore spicâ Clus. hist. lib. 5. fol. 173. Wald-Rapungel/

Hel/ Tab. Sebitz. in Trag. Lon. In umbrosis bey Bladau.
Item im Penartischen Walde.

DCXII. *Rapunculus scabiosæ capitulo cœruleo*, C. B. Pin. pag. 92. *Rapunzel mit blauen scabiosen Röpfflein.* *Scabiosa minor*, Dod. Lateinisch/ fol. 122. *Scabiosa sylvestris minor cœrulea*, Eystett. *Rapuntium montanum capitatum Leptophyllum*, Column. min. cogn. stirp. & rar. part. I. pag. 227. *Scabiosa media*, Lob. ic. p. 536. *Scabiosa media serrato angustifolio flore globulariæ*, Adv. Lob. fol. 232. *Schaaf-Grind-Kraut / Apostemen-Kraut mit hochblauer Bluhm.* *Folia modò lævia sunt, modò hirsuta.* *Icones apud Lob. & Dod. etiam crenas foliis assignant, quas observare in nostrate hactenus non licuit.* In incultis præsertim siccioribus passim.

DCXIII. **Rapunculus scabiosæ capitulo candido.* Joh. Lœf. *Schaaf-Grind-Kraut / Apostemen-Kraut mit weißer Bluhm.* *Foliis est angustis, tenuibus, lino æmulis, leviter crispatis, ac hirsutis, quæ circa radicem numerosissima.* *Thyrfulis protensis, rotundis, viridibus, quorum intermedius mediâ suâ parte nudus.* *Summitati eorum flosculus insidet, albus, conglomeratus, figurâ conglobatâ, qui paulatim pressior dilatatur.* *Radix villosa albicat.* *Beym Löbnichtscheyn Walde in incultis.*

DCXIV. *Rapunculus persicifolius magno flore.* C. B. Pin. pag. 93. *Pärschen-blätterig Rapunzel mit grofsen blauen Glocken-Blumen.* *Campanula persicifolia nostras*, Lob. ic. pag. 327. *Campanula persicæ folio*, Clus. hist. lib. 5. fol. 171. *Phyteuma*, Bauh. Matth. fol. 827. *Phyteuma Matthioli*, Cam. hort. pag. 125. *Campanula angustifolia*, Tab. lib. 2. fol. 33. *Campanula media*, Dod. Lateinisch/ fol. 166. *Rapunculus campanulatus Nerii folius pri-*

mus, Thal. pag. 95. Campanula alba & cœrulea, Eystett. Klein Blöcklein/ Tab. Blaue Glocken quibusdam. Flore conspicitur modò cœruleo, modò albo, hinter Latten-Walde im See-Gebirge; item bey Rumânnen in umbrosis.

DCXV. Rhamnus catharticus, C. B. Pin. pag. 478. Purgierende Stechdorn oder Creuß-Beer. Spina cervina vulgò dicta Italis, Gesn. hort. fol. 282. Spina alba Lon. deutsch fol. 59. Spina infectoria, Bauh. Matth. fol. 144. Lob. ic. pag. 181. o. Spina infectoria pumila prima, Clus. hist. lib. 1. fol. 111. NB. vid. Bauh. loc. cit. sub No. IX. Rhamni alia species, Trag. Kyber. in Trag. pag. 979. Cervispina, Cord. hist. fol. 175. Rhamnus solutivus, Dod. Lateinisch/ fol. 756. Spina cervicalis vulgò, Cas. lib. 3. cap. 17. pag. 101. Creuß-Beer/ Lon. Wegdorn-Beer/ Kyber. in Trag. Creuß-Holz Nostratibus; Folia refrigerant & siccant. Baccæ gustû amaræ & nonnihil adstringentes, calidæ & siccæ sunt ordine secundo, humores serofos, biliosos ac pituiteos purgant, pollinis drachmâ 1. sumptâ. Syrupus ex succo baccarum, qui domesticus nominatur in arthritide cachexiâ, hydrope, & paralyfi commendabilis est. Baccæ virides ac immaturæ croceum præbent colorem: nigræ verò ac maturæ cum modico aluminis in mortario pistilli circumactu tritæ, saturatè viridem, quem Safft-grün nominant. Suppeditant & puniceum colorem, circa festum Martini ab arbore lectæ. In der Hollen-Grund; Item bey Lauten-Mühl inter fruticeta.

DCXVI. Rhamnus salicis folio angusto, fructu flavescente, C. B. Pin. 477. Schmäler Weiden-blättriger Stechdorn. Rhamnus secundus, Matth. deutsch fol. 48. Dod. Lateinisch fol. 755. Lon. deutsch fol. 76. Clus. hist. lib.

lib. 1. fol. 110. Clus. Hisp. pag. 67. Rhamnus primus Dioscoridis creditus, Lob. ic. pag. 180. o. Oleaster Germanicus, Cord. hist. fol. 186. Rhamnus quorundam, Cam. hort. pag. 139. Stechdorn der ander. Matth. Lon. Rothe Schlehenn Borussis. Ad litus maris passim. Bey Dirschheim. Item bey der Balga am Hase. Rhamni alterum genus Casl.

DCXVII. Ros solis folio rotundo, C. B. Pin. pag. 357. Rundblättriger Sonnen-Thau. Ros solis, Dod. Lateinisch/ fol. 474. Cam. hort. pag. 142. Lon. deutsch fol. 304. Rorella minor prima, Tab. lib. 2. fol. 490. Rorella sive ros solis, Eystett. Rorida sive Ros solis major. Lob. ic. pag. 811. Salsirora, seu sponsa solis, Thal. pag. 116. Sonnen-Thau/ Lon. Kleiner Sonnen-Thau der erste / Tab. Sindau und Sonnen-Löffel quibusdam. Hinter dem Kranzkrüge dießseits den Sand-Bergen nach der Sackau zu copiosissimè. Item bey Schwanis in muscosis. Item bey Schreitlacken im Gebrüch. Planta hæc ipsâ meridie guttata est, guttulis se rorans, unde nomen herbæ. Mirabilius est, in Insula Ferro, ex Canariis unâ, omnis pluvix, rivorum ac fluminum experte, arborem dari cottidie foliis suis aquam stillantem lymphidam, ac gustu sævem, ad quam hauriendam homines ac cœteræ animantes ex totâ cursim currunt Insulâ sitis pellendæ causâ. Foliis crescit nucis juglandis, fructus fert quercûs. In Itinerariis passim.

DCXVIII. Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato, C. B. Pin. 483. Wilde Fleischfarbe riechende Nahnubotten oder Feld-Rosen. Cynosbatus Dioscoridis, Lon. deutsch. fol. 61. Rosa sylvestris, Bauh. Matth. fol. 166. Tab. lib. 3. fol. 788. Gesn. hort. fol. 276: Dod. Lateinisch/

fol. 186. *Rosa sylvestris odorata incarnato flore*. Eystett. *Rosa sylvestris primum genus*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 773. *Rosa canina odorata, & sylvestris Rosa*, Lob. ic. pag. 210. o. *Cynosbatos*, sive *Cynorrhodos procerior*, Cord. in Diosc. fol. 19. *Rosa canina*, Cam. hort. pag. 146. *Rosa sylvestris altior*, Cæs. lib. 3. cap. 10. pag. 97. *Cynorrhodos seu Rosa canina*, Thal. pag. 35. Heck-Rosen/ Tab. Sebitz. in Trag. Hanbitten oder Han-Rosen/ Lon. Feld-Rosen/ Frauen-Rose/ Marien-Dorn/ Korn-Rose/ Haber-Rose/ Hunds-Rosen/ Büttel-Rosen/ Heyd-Rose vulgò. In der Hollen-Grund inter fruticeta passim. Item bey Sünicken alibique. *Spongiola aliquando adnascitur*. Vid. Dod. loc. cit.

DCXIX. *Rubus vulgaris*, sive *Rubus fructu nigro*, C. B. Pin. pag. 479. Schwarze Brom-Beeren. *Rubus*, Brunf. Lateinisch/ tom. 2. fol. 186. Matth. deutsch fol. 427. Lob. ic. pag. 211. o. Lon. deutsch/ fol. 57. Fuchf. fol. 152. Dod. Lateinisch fol. 742. *Rubus primus*, Cæs. lib. 3. c. II. pag. 28. *Rubus arvensis*, Tab. lib. 2. fol. 587. *Rubus grandis & secundus*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 660. *Rubus Batis*, Adv. Lob. fol. 446. *Rubus vulgaris*, Gesn. hort. fol. 277. Thal. pag. 102. Brombeeren/ Brunf. Fuchf. Lon. Tab. Brombeer/ Bremen/ Matth. Bey der Altstädtischen Ziegelscheune. Item bey Fischhausen im Rosen-Pusch copiosè, qui locus veriùs rubetum dici posset. *Rubus* hic virgultis grandioribus retrorsùm reflexis ad terram inclinat, reptatu propagationem acqvirens, foliis est hirtis aculeatis, ac vegetis, deciduis tùm demùm, ubi novella pululant folia. Fructus niger est, sapore dulcis, cum acore grato. Refrigerat & siccatur. Aut. Diosc. Galeno turiones aquez

aqueæ sunt substantiæ cum modicâ adstrictione. Fructus maturus temperatus est dulcedine suâ, & nonnihil adstringens: immaturus acerbus, vehementiùs siccans & adstringens. Folia decocta foriolos juvant, dysentericos ac mulieres nimio menstruum fluxu discruciatas. Salmonius apud Athenæum rubi fructum appellat Batium. Rubus *βαῖος* est, inde vox *βαῖον*. Rudimentum fructus rubi, vel mori, olim spica vocabatur, quia spicæ simile. Sophocles:

Primum quidem cernēs candidam quæ floret spicam,

Deinde teres atq; puniceum morum.

Succo mororum acidorum olim mulieres faciem fucabant, ac inde *ὑωπιασμέναι* vocabantur. Pugnis eò nomine à maritis exceptæ, veriùs *ὑωπιασμέναι* dici possent, à livore oculos & faciem sugillante.

DCXX. Rubus repens fructu cæsius, C. B. Pin. pag. 479. Rubus minor, Dod. Lateinisch fol. 742. Rubus humilis Belgicus, Clus. Pann. pag. 115. Clus. hist. lib. 1. fol. 118. Rubus humilis & primus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 660. Rubi alterum genus, Cas. lib. 3. cap. 11. pag. 98. Rubus reptans, Adv. Lob. fol. 446. Rubus hic cæsius fructu virgultis suis spinosis terræ se insinuat, ac novis radiculis impetratis sui generationem uberius promovet, agros sæpè totos occupando. Fructus cœruleus sapore est dulci. *Blanc Kragel Beeren* Nostratibus. In arvis passim.

DCXXI. Rubus idæus spinosus, C. B. Pin. pag. 479. *Rothe Hind-Beeren*. Rubus idæus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 660. Matth. deutsch f. 428. Lob. ic. pag. 212. o. Gesn. hort. fol. 277. Thal. p. 102. Dod. Lateinisch fol. 743. Rubus idæus Dioscoridis, Lon. deutsch/ fol. 58. Rubus idæus vulgaris Clus. hist. lib. 1. fol. 117. Rubus idæus exhibus
spi-

spinis, Cord. in Diosc. fol. 63. Rubus rertius montibus proprius, Cæs. lib. 3. cap. 11. pag. 98. *Hindt / Beeren.* Matth. *Nimbeern.* Sebitz. in Trag. Lon. *In der Hollen-Grund.* Item auff dem *Leusken-Berge.*

DCXXII. Rubus saxatilis alpinus, Clus. hist. lib. 1. fol. 118. *Kleine Stein-Beeren /* Clus. Pann. pag. 115. *Chamarubus saxatilis,* C. B. Pin. pag. 479. Rubus parvus saxatilis alpinus Cam. hort. pag. 149. Rubus alpinus humilis, Gesn. hort fol. 277. Rubus minimus, Thal. pag. 102. *Stein-Beer /* Thal. *Brunitschken /* Accolis maris Balthici. *Fluss der Curländischen Nahrung in den See-Gebirgen* passim, hinter *Latten-Walde.* Item bey *Bladau* in umbrosis. Antiscorbutica planta est.

DCXXIII. * Sagitta aquatica foliis variis. Joh. Lœf. Radice est albidis, rotundis & articulosis filamentis, foliis bicubitalibus effigie suâ evariantibus: quorum nonnulla crassiuscula & triangula ferè, intus spongiosa, & in summitate sagittifera sunt: alia latiuscula, nervosa & minus crassa, subacuminantur: alia vel hastulæ in modum effigiantur, vel sagittalis formæ aliquantillum adsciscunt. Caulis est rotundus, lævis, juncea intus substantiâ, qui in ramulis flosculos gerit albicantes, tribus foliolis, staminibus ex luteo purpurascentibus. His succedit fructus capitosus, uti in vulgari. *Groß Pfeil-Kraut mit mancherley Blättern.* Im *Pregel* passim.

DCXXIV. Sagitta aquatica minor latifolia, C. B. Pin. pag. 194. Sagitta, seu sagittalis, Cord. hist. fol. 86. Sagitta minor, Bauh. Matth. fol. 797. Dod. Lateinisch fol. 588. Tab. lib. 2. fol. 415. Adv. Lob. fol. 127. Sagittaria minor, Lob. ic. pag. 302. *Klein breitblätterig Pfeil-Kraut /* Tab. Matth.

Kleine

Kleine Otter-Zung quibusdam. In undis stagnantibus passim. Beym Philosophischen Gang.

DCXXV. Sagitta aquatica minor angustifolia, C. B. Pin. 149. Sagitta minor angustifolia, Tab. lib. 2. fol. 416. *Klein schmalblättrig spitzig Pfeil-Kraut* / Tab. Fœmellis sterilitatem detestantibus salutaris. Am Pregel hinter dem Bretter Krüge.

DCXXVI. Salix prima, vel procera, Dod. Lateinisch fol. 842. Salix perticalis, Cord. in Diosc. fol. 21. Salicis quantum genus, Lon. Deutsch fol. 42. Salix Dioscoridis, Lob. ic. pag. 136. Salix vulgaris alba arborescens, C. B. Pin. pag. 473. *Große Salwenblättrichte Rappweide*. Foliis est oblongis in acutiem tendentibus, superiore parte virentibus ac glabris, aversâ molli & albâ, lanugine obsitis, in ambitu exigue, ac desultoriâ quasi operâ incis. Ramusculorum cortex albidus & lanosus ut plurimum est. Perticæ ac pali ex hac sæpiusculè fiunt. Folia, flores & cortices salicum refrigerant citra morsum, siccant & adstringunt, cruentum vulnus glutinant, ac inflammationi resistunt. Flores cum lanugine naribus inserti, vel in pollinem acti, & calamo sursum efflati, hæmorrhagiæ medentur. Aqua nucamentorum adversus *ἀναισθησιον, διάπερον καὶ πῆξιον* vasorum, efficax est. Corticum cinis aceto mistus, verrucas & clavos aufert. Folia recentia somnum acersunt, lotionibus addita. In pagis passim. *Bey Bladau*. Salix rusticis, sagis ac veneficis, virgulas promittit, quas Francones *Alp-Nutten* nominant. Alpen Dæmones esse credunt, in pascuis & uliginosis locis oberrantes, cum quibus fœdera ferunt, ut nocentiores sint pecudum, vel etiam hominum generi. Ægritudinem armentis vel hominibus Dæmonum horum ope illatam, Germani *Elben* vocant.

Unde locutiones: Das Vieh oder der Mensch hat die Elben. It: Es sind dahin und dahin so viel Elben ins Leib gezaubert. Sciscitanti quid Elben sint, respondent, vermes esse minutos, rubellis capitulis, man^o ac pedes frequentissimè occupantes, qui non nisi magicis remediis enecantur. Aliàs licèt cultello excindantur, de integro tamen dictis in locis generantur. Simile quid veneficæ apud nos agunt Dæmonibus subterraneis, quos Unter-Erdtschen appellant. Ut autem scias, quid sint illæ virgulæ, Alsprutten dictæ, rem ita habe: Salices, rubris maximè corticibus vestitæ, pullulos quandoque geminos è simplici excludunt gemmâ, firmissimè invicem connatos, ac cortice communi tectos, effigie digitorum duorum, glutine junctorum. Usus: Germen dictum rustici ante Solis exortum ab arbore refecant, eoque plagosum pecus, malo hoc discruciatum, sæpius flagellant, plagis integrum triduum, ante ortum & occasum Solis, morbido pecori impositis. Sunt, qui obsessos & fascinosos hoc remedio in integrum restitutum iri dictitant. Hippia tri equos (die den rittenden Wurm haben) hoc præsidio fuisse adjutos, seriò attestantur.

DCXXXVII. *Salix caprea rotundifolia*, Tab. lib. 3. fol. 745. *Salix lato folio*, Gefn. hort. f. 278. *Salix latifolia rotunda* C. B. Pin. p. 474. *Salix latifolia*, Cam. hort. p. 151. *Salix Platiphyllus*. Adv. Lob. p. 423. *Salix platiphyllus alia*, Thal. p. 112. Runde breite Seyl-Weiden/ Tab. Salweyden/ Gefn. hort. Folia crenis destituta supernè virent, infernè canescunt; florem edit luteolum, odoratum, apibus gratum, cui longum succedit nucamentum, cum semine in pappos abiens. Im Domnauschen Walde & aliis saltibus nemorosis.

DCXXXVIII. *Salix vulgaris rubens*, C. B. Pin. p. 473. *Salicis* primum genus, Lon. deutsch fol. 41. *Salicis* tertium genus,

genus, Fuchs. fol. 336. Salix Sabina, seu Amerina, Thal. p. 112. Salix minor, viminalis & Gallica, Dod. Lateinisch f. 843. Band-Weiden und rothe Weiden/ Lon. Gold-Weide. Cortex insigniter ex fusco splendet. Folia gerit viridia & serrata. Lentitiæ est sequacis, calathis, eistellis ac canistris aptissima. Bey Lauten-Nühl.

DCXXIX. Salix caprea latifolia, Tab. lib. 3. fol. 745. Salix folio ex rotunditate acuminato, C. B. Pin. 474. Breitblättrige gespizte Seil-Weide. In sylvis hinc & inde. Scythæ ex salignis virgis, humi constratis, futura prædicebant, Auctore Herodoto lib. 4. Herniæ remedium: Succosior salix Lunâ decrescente, cultro deorsum impresso, incidatur aliquousque, mox assula excidatur, loco affecto affirmetur, & aliquantisper gestetur, donec sordidula gestamine existat: tandem in locum gentilitium delata, ligno prius avulso recreata, ac debite, ut concreascit, deligata, ægrum herniosum firmat ac restituit.

Podagræ auxilium: Lunâ extra pisces constitutâ, & quidem postridiæ, quàm ultimam adiit quadram, saligna stirps, terræ desacranda, miscellæ lotii & sanguinis ægrotantis (locus affectus dicto superius tempore scarificetur, & lotio, spatium bidui reddito, ammisceatur) aliquandiu maceranda committatur: mox tertio ante novilunium die fossula efformetur, stirpi inferendæ apta, in quam & priorem miscellam & salicem transferas: mense abhinc elapso, tertio ante novilunium die, locum circa affectum, de integro scarificetur æger, sanguis lotio confundatur: idem labor, quatuor hebdomadarum spatium exacto, iteretur, sic felicissimè averruncaturus es crucium podagræ malum.

DCXXX. Salix sylvestris latifolia, Tab. lib. 3. fol. 744.

Salix, Bauh. Matth. fol. 175. Breite Seil-Weide / Tab. Spitzblättrichte Kamp-Weide. Foliis est crenatis, oblongis, acuminatis, supra viridibus, infra modò exalbidis, modò virentibus, quorum exortibus alæ duæ adpositæ sunt. Corbibus pabulatoriis, messoriis, fiscellis ac nassis parandis expetita. Virgultum tenerum hanc in rem Majo & Julio mensibus demitur. Majo resectum das May-Holz / Julio verò S. Jacobs Holz artificibus nominatur. In riguis in der Hollen-Grund.

DCXXXI. Salix sylvestris angustifolia, Tab. lib. 3. fol. 744. Salicis alterum genus. Fuchsl. fol. 335. Lon. deutsch fol. 41. Salix sativa lutea folio crenato. C. B. Pin. pag. 473. Salix tertia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / fol. 855. Cæs. lib. 3. cap. 46. pag. 125. Salix vitellina, Cord. in Diosc. fol. 21. Schmal Seil-Weiden / Tab. Gele Weiden / Bach-Weiden / Lon. Gelbe Weiden und Dotter-Weiden / Cord. in Diosc. Gelbe Haar-Weiden quibusdam. Folia habet crenata, supernè ex virore splendentia, infernè candicantia, quæ nunc majora, nunc minora. In der Hollen-Grund.

DCXXXII. Salix fragilis latifolia. Joh. Læf. Bruch-Weide mit breiten Blättern. Salix fragilis, C. B. Pin. p. 474. Salicis tertium genus & salix alba. Lon. deutsch fol. 42. Salix secunda candido cortice, Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 855. Bruch-Weide und weisse Weide / Lon. Albicant folia, hirsutie molli, crenis in ambitu vix conspicuis. Foliis quandoque innascuntur vesiculæ oblongæ, eruculis gravidæ. Virgulta ejus levi manu franguntur. Auffm Tham nach der neuen Brücken.

DCXXXIII. Salix fragilis tenuifolia. Joh. Læf. Bruch-Weide mit schmalen langen Blättern. Zur Robbel-Bude in Truchsen Walde am Ufer des Frischings.

DCXXXIV. *Salix rubra* obtuso latiore folio. *Roths Sprock-Weide* mit breiten stumffhen Blättern. *Caulis* habet teretes, ac rubentes: folia latiora, obtusa, crenata, pronâ parte atrovirentia, supinâ cinerea, alis duabus in exortu stipata. *Adcorbes inutilis.* In riguis in der *Hollen-Grund.*

DCXXXV. *Salix oblongo Salviæ folio.* *Joh. Lœf. Kleine Salwenblättrichte Ramp-Weide.* *Cauliculis* est ramosis, incanis: foliis oblongis, *Salviæ æmulis*, in ambitu crenatis, supernè atrovirentibus, infernè candidis & lanuginosis, quorum exortibus alæ duæ appositæ. *Corbulis* deservit texendis. *Passim.*

DCXXXVI. *Salix humilis angustiore oblongo folio.* *Joh. Lœf. Haar-Weide* mit schmallen länglichten Blättern. *Cauliculis* est numerosis, nunc rubentibus, nunc viridibus: foliis oblongis & angustis, nonnihil crenatis, suprâ viridibus, infrâ exalbidis, quibus vesiculæ subrubentes baphico cocco assimiles, sæpè innascuntur. *In der Sackau. It. Bey der Robbel-Bude am Frisching.*

DCXXXVII. *Salix pumila angustifolia prima,* *Clus. hist. lib. 1. fol. 86.* *Salix pumila angustifolia altera.* *Clus. hist. Pann. pag. 103.* *Salix pumila brevi angustoque folio incano.* *C. B. Pin. 474.* *Kleine schmalblättrichte kurze Haar-Weide.* *Dorso* canescunt folia, pronâ parte virent, ac vesiculas sæpè habent. *Lentitiæ* est insignis. *Im Gebrüch bey Lauten-Neühl.* *Salix* olim rusticis coronamenta dabat. *Scopo* huic fervebat maximè *salix Amerina*, quæ ad nexus aliàs & vitilia fuit idonea. *Megisthes*, vir humanus & affabilis, totos decem menses *Amerinâ* salice redimitus erat. *Esu* corticum salicis, alni, & consimilium arborum, mirè delectatur

Castor, qui, cū sit animal horrendō morsū, arbōrēs retas olim dictas, juxta flumina dentibus suis crocēis ceu ferro cædit, hominesque ad retanda flumina cogit. De his antiquum exstat edictum, quod servavit nobis Gellius Lib. XI. cap. 17. Qui flumina retanda publicè redempta habent, si quis eorum ad me adductus fuerit, qui dicatur, quod cū ex lege locationis facere oportuerit, non fecisse. Ubi ex Gavio dicit retas esse arbōres, quæ aut ex ripis fluminum eminent, aut in alveis eorum exstant, appellatasque esse, quod prætereuntes naves impediunt, & quasi irretiant: Ideoque retanda flumina locari solita esse, id est, purgandum, ne quid moræ, aut periculi navibus, in ea virgulta incidentibus, fieret. Hæc obiter.

DCXXXVIII. Sambucus, Brunf. Lateinisch / tom. 3. fol. 181. Bauh. Matth. fol. 873. Dod. Lateinisch / fol. 845. Fuchf. fol. 64. Lon. Deutsch / fol. 64. Lob. ic. pag. 161. o. Gesn. hort. fol. 278. Tab. lib. 3. fol. 731. Sambuci primum genus, Cord. in Diosc. fol. 75. Cæs. lib. 3. cap. 4. pag. 91. Sambucus fructū in umbella nigrō, C. B. Pin. pag. 456. Sambucus vulgaris, Trag. Sebitz, in Trag. Deutsch / fol. 782. Thal. pag. 111. Sambucus campestris, sive vulgaris, Cam. hort. pag. 152. Holunder / Matth. Lon. Sebitz. in Trag. Holder. Baum / Tab. Holder / Brunf. Fuchf. Alhorn Nostratibus, Siccantis estinaturæ, aquas ducit, sudores movet, venenis resistit, calculos atterit, ac menstrua citat, Galeno 6. simpl. actetum arboreā, tum herbaceā, siccatur, glutinat, & modicè digerit. Cortex interior Sambuci, nigro exteriore dempto, cultello sursum apices versus ramusculorum rufus, & condylomatibus inflatis impositus, dolores etiam gravissimos anestet. Rasura calfacta abjiciatur, & nova sæpius imponatur. Experimentum fuit illustris cujusdam Matronæ, quæ à partu crucio

crucio hoc malo infestata ocissime hoc remediò fuerat restituta. Sarmatis arbor Sambucus domicilium credebatur *Putschati*, tutelariorum quondam Numinis lucorum & sacrarum arborum. Huic rustici pane, cerevisiâ, cibisque variis, sub arbore hac superstitiosè locatis, olim litare consueverant à *Putschato* unâ contendentibus, quò placatum efficeret *Mar-coppolum*, Deum Magnatum & Nobilium, ne posthac graviore servitute à Dominis premerentur suis. *Barstuccas* etiam, seu subterraneos, quos Germani *Erd-Männlein* vocant, *Putschati* auxilio ad se sollicitabant, quippe ob Dæmones hos *συνοίκα* se fortunatiores futuros persuasissimum habebant. His, vespèrâ ingruente, mensam in horreo mappâ sternere solebant, caseos, panes, butyrum & cerevisiam addentes, nec dubitabant de fortunarum accessione, si manè viderint cibum illic absumptum. Si verò intactus remanserit in mensâ, animò vehementer angebantur. Venerabantur etiam Deos quosdam visibiles, (obiter ut hoc dicam,) qui Græcis *κόβαλοι*, Russis Colky, Germanis *Robold* dicebantur. Hos omni ciborum genere alebant, eò, quòd furtiva afferrent frumenta aliunde ex horreis petita. Dæmones hi domicilium occupaturi sæpe nocturno tempore lignorum segmina in domo congregabant, & mulctas lacte plenas stercoribus spurcabant. Segmina illa, si Paterfamilias indissecta servaverit, & lac stercore frustulentum cum familiâ comederit, Dæmones statim, ut gratissimi hic hospites futuri, & apparuere & permansere. Vermes notandi, quos sub Sambuco sepeliunt Sagæ. Bimulus sambuci cortex, sursum versum abrasus, lacte decoctus, ac potus, vomitu purgat: aliò versum verò seu deorsum rasus, per alvum, seu gutturem inferiorem (cum Plauto loquar,) dejicit noxia. Remedium odontalgiae transplan-

plantans certum est in sambuco: Sambucum teneram; occidentem versùs, cultro deorsum impresso, fanciet aliquis, vultù in orientem misso, ac corticem cum subjecto ligno aliquousque avellat: paulò pòst assulâ, ex meditullio arboris excisâ, dentes ita fodiat, quò cruentetur: cruentatam ac madidam adhuc cruore, in pristinum ac natalem locum deferat, ac avulsam prius arboris partem mox superinducat, partibus faucis filo cannabino crudo, studiosè in orbem collecto, benè firmatis. Vulnerata hòc modò, deligata, ac spontali coalitù restituta arbor, qverqveræ ὀδονταλγίας certa existit salus. Eandem & salix pollicetur vim, debite dicto superius modo tractata. Frustrula baculi sambuci, Sole & ingresso, ab arbore resecta, filo in orbem collecta, ac in pari numero collo suspensa, epilepsiam fugant. Dememinisse interim haud oportet, ligneola Solis die esse comparanda, tam diu gestanda, donec filo rupto sponte decidua fiant, demum in profluentem esse mittenda. Suppeditat sambucus remedia baccis, acinis baccarum, floribus, turionibus, foliis, cortice mediano flavo, radice, medullâ, & spongiolis seu auriculis Judæ. 1. Bilem, pituitam, & inprimis serum expurgat. 2. menses evocat, juvatque mulieres ab utero præfocatas. 3. urinam ducit, sudorem provocat, & calculum expellit. 4. malignitati resistit. 5. dolores quarumcunque partium compefcit, cutim rarefaciendo, ac vapores digerendo. Medulla sambuci globulos suppeditat Chirurgis, quos sæpiusculè fontanellis immittunt. Medulla hæc Græcis μήτρα nominatur. De voce μήτρα qværit Ulpianus Tyrius apud Athenæum, μήτρα πῆ κείται, ubi legitur pro eduli cibo? Mos erat Ulpiano, inter epulas nihil cibi gustare, priusquam dixisset πῆ πῆ κείται, hoc ubi exstat? Hinc & κειτ᾽ κειτ᾽ elegantissimè

tissimè appellatus est. Notat autem μήτρα vulvam suillam, olim in deliciis habitam, uterum, & medullam arborum. Sambucus glirario infensissima est odore, quippe ramuli sambucei succosi ac odorati, circumcirca scolymum in terram defixi, eum tuentur à gliribus, anhelò gutture scolymum aliàs depascentibus. Idem ebulus præstat, quem horreis immittunt rustici ad fugandos mures.

DCXXXIX. Sambucus humilis, sive Ebulus, C. B. Pin. pag. 456. Ebulus, Brunf. Lateinisch / tom. 3. fol. 65. Matth. Deutsch fol. 562. Fuchf. fol. 65. Tab. lib. 2. fol. 451. Dod. Lateinisch / fol. 381. Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch fol. 628. Lob. ic. pag. 164. o. Cæs. lib. 5. cap. 13. pag. 209. Sambuci alterum genus, sive Ebulus, Lon. Deutsch fol. 64. Ebulus, sive parva Sambucus, Cord. in Diosc. fol. 75. Utrich / Matth. Tab. Brunf. Fuchf. Utrich / oder niedriger Hölzder / Lon. Hydropicorum aquas ἀνὰ καὶ κατὰ ducit. Fer. 5. m. m. Im Dorff Lopännen an der See. Item zu Abschwängen ad hortorum sepes. In pago Lügenen im Lochstädtchen copiosè. Ebularadix, Augusto decresciente Lunâ effossa, in ulceribus sordidis, ac vermiculationibus infantum, extollitur; etiam collo appensa. Cæterum oleum corticum radices ebuli efficacissimum in lumbricis excludendis: circa Jacobi diem, Lunâ in decrementis constitutâ; cortices radicum ebuli, non ablutarum, contundantur, contusò corticum minutali oleum affundatur, in Sole paulò post apricaturo. Olei hujus cochlear unum vel alterum ingeratur, & abdomen linteo stringatur.

DCXL. Sambucus aquatica florè simplici, C. B. Pin. pag. 456. Wasser-Hollunder mit schlechter Blüth. Sambucus aquatica, Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch / fol. 786. Tab. lib.

lib. 3. fol. 732. Bauh. in Matth. fol. 874. Lob. ic. pag. 201. o. Thal. pag. 111. Sambucus palustris, Dod. *Niederländisch*/ fol. 1323. Cæs. lib. 3. cap. 4. pag. 91. & 92. *Lycostaphylon foemina*, Cord. hist. fol. 174. *Schwelcken*. Sebitz. in Trag. *Schwelcken-Baum*/ Tab. Arbor Nostratibus dicitur *Raninchen-Baum*; Fructus verò *Raninchen*. Baccas fert rubicundas, vomitum excitant devoratae. Succo vis est absterforia, hinc ex eodem Syrupus conficitur, è baccis cuniculorum, malè officinis dictus, in affectibus faucium salutaris. Loca amat rigua. *Beym Penartischen Walde*. Item. in der *Hollen-Grund*.

DCXLI. *Sanicula officinarum*, C. B. Pin. pag. 319. *Heil-Kraut*. *Sanicula*, Trag. Sebitz. in Trag. *deutsch*/ fol. 405. Dod. *Lateinisch*/ fol. 140. Eystett. Lon. *deutsch*/ fol. 244. Tab. lib. 1. fol. 302. Cam. hort. pag. 152. Thal. pag. 111. Cæs. lib. 14. cap. 22. pag. 556. *Sanicula & Diapensia*, Brunf. *Lateinisch*/ tom. 1. fol. 80. & 81. Lob. ic. pag. 663. *Diapensia*, Bauh. Matth. fol. 720. *Sanicula mas*, Fuchf. fol. 671. *Sanickel*/ Matth. Tab. Lon. Brunf. *Sanickel-Männlein*/ Fuchf. *Schernäckel* *Vetulis*. Bey *Birckensfeld* in umbrosis copiosè. Item bey *Bladau* am Berge.

DCXLII. *Saponaria major lævis*, C. B. Pin. p. 206. *Groß glatt Seiffen-Kraut*. *Saponaria*, Trag. Kyb. in Trag. p. 900. Dod. *Lat.* f. 179. Eystett. Tab. lib. 2. f. 409. Lob. ic. p. 214. *Saponaria prima*, Cæs. lib. 6. c. 48. p. 256. *Saponaria vulgaris*, Cam. hort. p. 153. *Struthium*, Fuchf. f. 780. Thal. p. 117. *Struthium primum*, Lon. *deutsch*/ fol. 109. *Seiffen-Kraut* Tab. Lon. Fuchf. *Speichel-Wurz* oder *Seiffen-Kraut*/ Kyber. in Trag. Amara est, acris, abstergens & aperiens. In lue Gallicâ, quæ optima etiam remedia eluserat, efficacissima existi-

existit. Inventorem habuit Zapatam, Empiricum Hispanum. Herba adhuc succida, manibus comminuta, eas smegmatis instar mundat. In cœmeterio pagi Neuhausen. Item dießseits dem hohen Krüge in arenosis copiosè. Flores in umbellâ modò albi, modò rubicundi, modò copiosiores, modò pauciores.

DCXLIII. *Satureja hortensis*, sive *Cunila fativa*, Plinii C. B. Pin, pag. 218. *Satureja* Trag, Kyber, in Trag. p. 45. Dod. Lateinisch f. 289, Lon, deutsch fol. 150. Tab. lib. 2. fol. 74. Cam. hort. pag. 153. *Hyssopus agrestis*, Brunf. Lateinisch/ tom 3. fol. 164. *Satureja hortensis*, Lob. ic, pag. 426, Adv. Lob. fol. 182. *Satureja hortensis*, & *Thymbra vera*, Gesn. hort. fol. 279. & 284. *Satureja fativa*, Fuchf. fol. 304. *Satureja domestica*, Eystett. *Satureja*, sive *Thymbra fativa*, Cord. in Diosc. fol. 53. Cord. hist. fol. 145. *Wilder Hyssop/ Kirch-Hyssop*. Brunf. *Satureja oder Garten-Hyssop/ Kyber*. in Trag. *Sedeney/ oder Saturay/ Lon*. *Gemeine Saturay/ Tab*. *Joseplen/ oder Saturon/ Fuchf*. *Kalbs-Hyop/ Zwiebel-Hyop/ Hüner-Füll/ Sergen-Kraut*. *Pfeffer-Kraut* Nostratibus. Calfacit, siccatur tenaces humores acredine suâ incidit, menses citat, ac thoracis vitiis medetur ab infarctu crasso. An der Lauten-Mühl auff der Mauer.

DCXLIV. *Saxifraga rotundifolia alba*, C. B. Pin pag. 309. *Rundblättriger weißer Steinbrech*. *Saxifraga alba*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 525. Dod. Lateinisch/ fol. 316. Gesn. hort. fol. 279. Cam. hort. pag. 154. Thal. pag. 106. Tab. lib. 2. fol. 510. *Saxifraga alba*, *Saxifraga minor*, Fuchf. ic. pag. 427. *Saxifraga quarta*, Bauh. Matth. fol. 694. *Saxifraga alba*, Lon. deutsch/ fol. 248. *Saxifraga alba Chelidonioides*, Lob. ic. pag. 612. *Saxifraga* Brunf. Lateinisch tom. 1.

fol. 185. Saxifraga major, seu alba, Fuchf. fol. 747. Saxifraga alba tuberosâ radice, Clus. hist. lib. 3. fol. 308. Thelygonio affinis herba, Cæs. lib. 8. cap. 31. pag. 338. Weißer Steinbrech/ Tab. Kyb. in Trag. Hoher Steinbrech/ Fuchf. Nuss dem Nasen-Garten in montosis.

DCXLV. Saxifraga rotundifolia aurea, C. B. Pin. pag. 309. Chrysolplenion, vel Saxifraga aurea, Tab. lib. 2. fol. 512. Saxifraga aurea, Dod. Lateinisch/ fol. 316. Gesn. hort. fol. 279. Saxifraga aurea Lichenis facie & natalitiis, Lob. ic. p. 612. Saxifraga aurea Dodonæi, Cam. hort. pag. 154. Thal. pag. 106. Hepatica palustris, Eystett. Gûlden Mîlz-Kraut/ Tab. Gûlden Steinbrech. Infarctum jecoris ac lienis expedit, & à vaccis comesta butyro flavedinem confert. Viribus est Hepaticæ vel Lichenis. Ad rivulos, scaturigines, & loca uliginosa passim mense Aprili.

DCXLVI. Scabiosa major squamatis capitulis C. B. Pin. pag. 269. Scabiosa major, Matth. deutsch fol. 405. Scabios/ Bruns. deutsch fol. 92. Scabiosa major flore purpureo, sive prima, Tab. lib. 1. fol. 546. Scabiosa major Matthioli, Cam. hort. pag. 154. Cyanus sylvestris major arvensis, Thal. pag. 29. Groß braun Scabiosen/ Tab. Calefacit, siccatur, incidit, abstergit & expurgat. Secus vias & salebrosa passim.

DCXLVII. Scabiosa major squamatis capitulis, flosculis candidissimis, Groß weiß Scabiosen. Folii provenit profundissimè incisus, effigiem scabiosæ majoris, Matth. ferè exprimentibus. Caules gerit teretes, striatos ac subvirescentes: flosculos in squamosis capitulis niveos, quorum si evulseris unum, in quatuor filamenta eundem supernè diremptum conspicias. Capitula ex compactili squamarum serie

con-

constant abeuntque squamæ in acutiem, parvulis utrinque aculeis, iisque nigricantibus armatæ. Radice nititur lignosa, tereti, ac filamentis exornatâ, quæ insipida penè: foris sub-nigra est, intus candida. In pago Sackau hinter dem fordersten Krüge. Item bey Holland secus viam Elbingam versùs.

DCXLVIII. Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum C. B. Pin. pag. 269. Scabiosa altera campestris, sive Segetum & Satorum, Lob. ic. pag. 537. Scabiosa major flore ex cœruleo purpureo, Tab. lib. 1. fol. 546. Scabiosæ primum genus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 194. Scabiosa vulgaris, Eystett. Scabiosa, Lon. deutsch fol. 179. Fuchf. 716. Scabiosa dissectifolia major, Thal. pag. 108. Groß Scabiosen/ Tab. Apostem Kraut/ Fuchf. Pastemen Kraut/ oder Scabiosen/ Lon. Groß Purpur-blau Scabiosen/ vulgò. Hæc nostrates officinæ non utuntur, sed alterâ illâ, quæ C. B. Scabiosa major squamatis capitulis, dicitur. In arvis & pratis nonnihil riguis passim.

DCXLIX. Scabiosa multifido folio, flore flavescente, C. B. Pin. pag. 270. Scabiosa ἀχρολευκῇ flore sive septima, Clus. hist. lib. 4. fol. 3. Scabiosa tertia, Clus. Pann. pag. 538. Scabiosa Pannonica flore albo, Eystett. Scabiosa tenuifolia candida seu major, Thal. pag. 109. Scabiosa major floribus luteis, Cam. hort. pag. 154. Gelblicht Scabiosen mit sehr zerschnittenen Blättern. Aufm Berge gegen dem Nasen-Garten über. Item bey Lauten Mühl und Sackau passim. Gelblichte Scabiosen mit viel zerschnittenen Blättern.

DCL. Scordium, C. B. Pin. pag. 247. Trag. Kyber. in
H h 3 Trag.

Trag. pag. 885. Dod. Lateinisch fol. 126. Matth. deutsch/ fol. 340. Tab. lib. 2. fol. 437. Cam. hort. pag. 156. Eystett. Lon. deutsch fol. 231. Scordium, sive Trixago palustris, Adv. Lob. ic. pag. 497. Scordium verum, Gesn. hort. fol. 279. Wasserbathenig/ Lachen-Knoblauch/ Matth. Tab. Lachen-Knoblauch/ Kyber. in Trag. Lon. Wasser-Knoblauch quibusdam. Variat magnitudine: hinc majus & minus. Bicubitale ferme proceritate suâ semel observavi. Acri, amarâ, exsalfactoriâ & facultate alliâtâ, omnium viscerum, in primis pectoris & pulmonum, crassos ac viscosos humores extenuat, virulentos detergit & expurgat: tineas necat, menses & urinas dueit, foru potuque partum accelerat: Vetera ulcera purgat, siccât & cicatrice obducit: Venenis adversatur, ac putredini mirum quantum obsistit. Chirurghi gangranam formidantes ex lixivio parant fomentum, in quo Scordium decoctum. Post fomentationem cataplasma sæpiusculè imponunt, ex farina lupinorum, pulvere Scordii, oxymelite simplici, & modico lixivio. Auf der Wiese am Fluß zu Bladau.

DCLI. Scorzonera foliis nervosis, C. B. Pin. p. 275. Scorfonera altera Lob. ic. pag. 551. Scorzonera Germanica angustifolia, Tab. lib. 2. fol. 299. Kleindeutsch Scorfonera, Tab. Schlangenmordt und Natter-Milch quibusdam. Beym Penartschen Waldt. In monte Apollinis hinter Quednau. Item bey Gerdauen in pratis nach dem alten Hofe und Drußsen zu. Floret mensē Majo.

DCLII. *Scrophularia aqvatica major caule fimbriato. Groß Wasser-Braunwurz. Fœmellis Creutz-Nessel. Radix quadrangula, fimbriata, nodosa, cubitalis, semiunciam crassa, atrovirens, concava, fibris longissimis copiosissimis

fissimis candidis & villosis instructa, caulem congeneris naturæ spargit angulosum, tricubitalem, fimbriatum, geniculatum, cavum, viridem, ad genicula brachiatum. Adstant autem singulis nodis ex adversum bini cauliculi, qui circa nodos subinde alios excludunt ramos, & hi rursùm teneriores, omnes quadratos & fimbriatos. Folia ex viridi nigricant, & serrata sunt: flores in caulium summo purpurascunt, & tandem in acuminata vascula, semen minutulum continentia, abeuntes. Gustu adstringens & subamara est, ac minus foetet. Vulneribus ulceribusque medetur sordidis. *Ben der Hollen Grund* in fossis. Vetulae in tineis seu lumbricis latis excludendis eam mirè extollunt. *Carrichter* phagedænam seu ulcus depascens sustulisse gloriatur his: Erat *Hagenoæ* ager, *Gabriel Heckher* nomine, cui lusus (ita vocat affectum) spatio XXVII. annorum sinistrum oculum, nasum dimidium, os, ac conterminas oris & maxillæ partes depascendo abstulerat, huic (1.) *Scrophulariæ* radices cottidiè potui addidit ordinario. (2.) omnibus eduliis pulverem radicum foliorumque lappæ minoris admiscuit, totamque herbam elixis incoqui iussit. (3.) pulvere cardui benedicti ac foliorum senæ, additis corrigenis, ægrum aliquoties purgavit. (4.) loca exulcerata & sordida aquæ *Scrophulariæ*, cardui benedicti, ac menthæ aquaticæ anaticæ miscellâ manè & vespèri abluit. (5.) oleum corticum betulae, geminas inter ollas exustum, ac tantundem aquæ cardui benedicti, cum melle decoctæ, ac despumatæ, linteis excepit, iisdemq; hiulca & comesa oplevit loca. (6.) pulverem herbæ *Antonianæ* (*Feder Kraut* dictam plantam exaudit,) ulceribus ultimò insperfit, sanationem *Θεός* qualem qualem affecutus. *Scrophulariæ* radicum tubera aliquot imparia, Lunâ de-

crescente effossa, filo collecta, ac statim collo suspenſa, nodos inveteratos, strumas, & omnis generis tumores discutiunt, præsertim si manè & vesperi semidrachma pulveris ingeratur, & radix potui immittatur.

DCLIII. *Scrophularia nodosa foetida*, C. B. Pin. pag. 235. *Scrophularia*, Bauh. Matth. fol. 791. Dod. Lateinisch/ fol. 50. *Ocimum alterum*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 184. *Scrophularia major*, Brunf. Lateinisch tom. 1. f. 215. Lob. ic. p. 533. Lon. Deutsch f. 164. Tab. lib. 2. f. 244. Cam. hort. p. 157. *Scrophularia major* Cæs. lib. 8. c. 49. p. 349. *Scrophularia major prima*, & *Clymenum mas*, Gesn. hort. fol. 280. & 254. *Galeopsis*, Fuchf. fol. 194. *Braunwurz* / Tab. Fuchf. Lon. Kyb. in Trag. *Sauwurz* / Brunf. *Seigwarzen* Kraut vulgò. Amara est, siccatur, tenuatur, abstergit, digeritur, ac partium tenuitate carcinomata, strumas, parotidas, panos, & consimiles durities disjicit, ac nomis medetur. Succus ex toto expressus & cum cerâ & olivo mistus, singularis est in auferendâ scabie, Trag. In cæco hæmorrhoidum dolore nihil efficacius *Scrophulariâ*, sive ipsa plantæ substantia sicca aut viridis, sive decoctum ejus assumatur. Henr. ab Heer. in Observ. Med. obs. 20. Semen lumbricos enecat Drachm. 1. pondere sumptum, Trag. & Tab. In der Hollen-Grund passim. Radix *scrophulariæ* colligenda, Sole 1. ☉ inhabitante. Bubonibus pestilentibus imposita radix contusa certo experimento venenum evocat. Caules legantur, Sole ultimum gradum ☿: folia verò 1. ☿. inhabitante.

DCLIV. *Securidaca dumetorum minor pallidè cærulea*, C. B. Pin. pag. 349. *Securidacæ secundæ altera species*, Clus. hist. lib. 6. fol. 237. Clus. Pann. pag. 749. *Siliquæ fasci coloris putatoriam falcem formâ exprimunt, & unicum semen*

semen ejusdem figuræ continent. Flos ex purpureo albescens est in nostrate. *Bei Holland* in incultis copiosissime.

DCLV. *Sedum majus vulgare*, C. B. pin. pag. 283. *Sedum majus*, Fuchf. fol. 32. Cord. in Diosc. fol. 68. Tab. lib. 2. fol. 512. *Sempervivum majus*, Bauh. Matth. fol. 785. *Sempervivum primum*, Lon. deutsch fol. 92. *Sedum vulgare*, Eystett. *Sedum*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch. fol. 298. *Sempervivum majus alterum*, sive *Jovis barba*, Dod. Lateinisch/ fol. 127. *Aizoon*, sive *Sempervivum majus*, Cam. hort. pag. 7. *Sedum seu sempervivum vulgare majus*, Gesn. hort. fol. 280. *Cotyledon altera prima*. *Sedum vulgare* Clus. hist. lib. 5. fol. 63. *Sempervivum majus sive Sedum majus crenatum Myrthifolium*, Lob. ic. pag. 373. *Große Haufswurz*/ Fuchf. Matth. Lon. *Haufswurz*/ Tab. *Groß Haufswurz*/ *Groß Donner-Kraut*/ *Groß Zimmer-Grün*/ *Hauf-Lauch*/ Cord. in Diosc. *Mauer-Pfeffer*/ vulgò. Refrigerat, humectat & leniter adstringit. *Zu Mühlhausen*; Item *zu Holland im Oberlande* in muris antiquis.

DCLVI. *Sempervivum minus vermiculatum acré*, C. B. Pin. pag. 283. *Sempervivum minimum*, Lob. ic. pag. 379. Bauh. in Matth. fol. 785. *Portulaca tertia*, Brunf. Lateinisch, tom. 3. fol. 102. *Illecebra sive sempervivum tertium*, Dod. Lateinisch fol. 129. *Sedum minus tertium & vermicularis*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 301. *Sedum minimum*, Tab. lib. 2. fol. 514. *Sedum minus*, seu *minimum causticum*, Eystett. *Sedum tertium Dioscoridis*, Gesn. hort. fol. 280. *Sedi tertium genus*, Fuchf. fol. 36. *Sedum minimum*, *Illecebra*, *Sedi tertium genus* non semper virens, Adv. Lob. fol. 162. *Sempervivum tertium minimum alterum*, Cæs. lib. 15. cap. 22. pag. 578. *Sempervivum secundum*

Lon. deutsch fol. 92. *Sedum minus octavum causticum*, Clus. hist. lib. 4. fol. 61. *Kleineste Ragen-Träublein*/ Tab. *Kleine Haufwurß*/ Lon. *Ragenträubel*/ Fuchf. Sebitz. in Trag. *Bladloß mulierculis*. In arenosis passim, sæpè etiam in subgrundiis & parietibus. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. *Radix effodiatur Sole 1. II occupante: cauliculi, Sole 15. Q habitante: folia, Sole 1. Y visitante: flores, Sole 1. II affecuto.*

DCLVII. *Sempervivum minus vermiculatum acre*, cauliculis repentibus. J.L. Radice nititur exili ac fibratâ, modò rubentis, modò albicantis coloris, quæ sub terrâ progrediens nova excludit germina. Cauliculi ejus reptantes, folia præter exigua, teretia & succulenta, fibras obtinent copiosas, quibus terræ leviter affirmantur. Inter reptandum novos constituunt pullulos seu ramulos. Flosculos habet luteolos, pediculis suis insistentes. *Hinter Sackau am See-Gebirge.*

DCLVIII. *Senecio minor vulgaris*, C. B. Pin. pag. 131. *Senecio vulgaris & prima*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 226. *Senecio*, Matth. deutsch fol. 494. Cord. in Diosc. fol. 69. Fuchf. fol. 286. Gesn. hort. fol. 280. Lon. deutsch/ fol. 128. *Verbena fœmina*, Brunf. Lat. Tom. I. 120. *Senecio seu Erygeron* Lob. ic. pag. 225. *Senecio prima*, Tab. lib. 1. fol. 572. *Creuzwurß*/ Matth. Tab. Seb. in Trag. Lon. Fuchf. *Eysen-Kraut*/ *Creuz-Kraut*/ *Eysen Kraut Weiblein*/ Brunf. *Grind-Kraut*/ *Creuz-Kraut*/ *Baldgreise* quibusdam. Passim obvia, præsertim in ruderibus circa macerias. Herba tusa, & inflammatis mammis imposita, experimentum est. Oculo ab apis ictû laeso, ac in tuber assurgenti, mirè profuisse senecionem, memini in quodam subjecto.

Scr-

DCLIX. Serpillum vulgare majus. C. B. Pin. p. 220. Serpillum album primum & secundum, Tab. lib. 2. f. 77. & 78. Serpillum majus flore purpureo; Cam. hort. pag. 159. Weisser Dwendel / Tab. Rünlein / Hüner-Kohl quibusdam. Feld-Rümmel Nostratibus. Flore est albo, est & purpureo. In montosis passim. Serpilli radix legenda, Sole 15. ☿ in-
habitante: cauliculi Sole in ♀ existente: flores Sole in ☿.

DCLX. Serpillum vulgare minus, C. B. Pin. pag. 220. Serpyllum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 31. Fuchf. fol. 251. Lon. deutsch. fol. 149. Gesn. hort. fol. 280. Cæs. l. II. cap. 54. pag. 465. Adv. Lob. fol. 180. Serpyllum sylvestre, sive alterum, Bauh. Matth. fol. 533. Serpillum sylvestre Cord. in Diosc. fol. 53. Serpillum minus flore albo & purpureo, Tab. lib. 2. fol. 78. Kleiner Dwendel mit weißen und braunen Blumen / Tab. Dwendel / Fuchf. Lon. In asperis & secus vias sæpissimè reperitur.

DCLXI. Serpillum minimum repens flore candido Ganz kleiner kriechender Dwendel mit weißer Blüth. Hinter dem Spittel Hofe am Wege nach der Fischhäusischen Heide zu.

DCLXII. Serratula, Bauh. Matth. fol. 671. Lob. ic. pag. 534. Dod. Lateinisch. fol. 42. Cam. hort. pag. 158. Serratula Matthioli, Clus. hist. Centauroidis, aut Centaurii majoris sylvestris Germanici prima species, Thal. pag. 26. Serratula tinctoris, Eystett. Serratula tinctoria prima, Tab. ic. pag. 156. Cerretta, sive Serretta prima, Cæs. lib. 13. cap. 53. pag. 539. Ferberscharten / Matth. Scharten-Kraut das erste / Tab. Beym Penartischen Walde.

DCLXIII. Seseli Æthiopicum, Matth. deutsch / fol. 309. b. Lon. deutsch / fol. 259. Seseli Æthiopicum & Libanotis alba,

Gesn. hort. f. 264. & 281. Sefeli *Æthiopicum* Matthioli, Clus. hist. lib. 6, fol. 194. Clus. Pann. pag. 693. Sefeli *Æthiopicum* herba, Dod. Lateinisch fol. 312. Dauci alterum genus, Fuchf. fol. 232. Libanotis Theophrasti, Lob. ic. pag. 704. Libanotis Theophrasti alba, sive secunda, Tab. lib. 1. fol. 387. Libanotis latifolia altera sive vulgatio, C. B. Pin. pag. 157. Libanotis Theophrasti altera. Thal. pag. 71. **Weisse Hirsch-
Wurz**/ Tab. Fuchf. **Äthiopischer Sesel**. Matth. Radix crasso est cortice, sapore initio dulci, deinde amaricante, supremo capite hirsuta: Foliorum alæ quina maximam partem habent folia, per ambitum serrata, supernè atrovirentia, infernè subcinerei quodammodo coloris. Flosculos habet caulibus in umbellis candidos, qui in oblongum, nigricans & angulosum abeunt semen, Cuminum aut Sileris montani semen odore & sapore referens. Calfacit, siccatur & abstergit. Radix alexipharmaca est, hinc jumentis, ovibus, porcis, pestilitate, vel aliò morbo correptis præsentis auxilio est. Folia pecoribus & nutriculis data, lac uberius pollicentur. Semen calculos atterit, & lotium citat. Ulcera consolidat radix cum melle rosato admota, Tab. In der Osterreichischen Heyde hinter dem Schilling/ lacus est duorum milliarium.

DCLXIV. Sideritis vulgaris hirsuta erecta, C. B. Pin. pag. 233. Sideritis prima, Fuchf. fol. 769. Cord. in Diosc. fol. 63. Thal. pag. 103. Gesn. hort. fol. 281. Clus. hist. lib. 4. fol. 39. Sideritis Heraclea, sive prima, Tab. lib. 1. fol. 457. Sideritis, sive ferruminatrix, Adv. Lob. fol. 223. Sideritis quarta, Lon. deutsch fol. 115. **Auffstehend Glied-Kraut** mit rauchen gefärbeten Blättern. **Glied-Kraut**/ Fuchf. **Glied-Kraut**/ **Zeiss-Kraut**/ Lon. Flores summum caulem verticillatim ambientes in spicam desinunt, galeati aliquantulum,

tulum, albidum, hiatum, sive rictum sanguineis notis conspersum habentes. Crenas habent folia, quas in suâ abesse tradit Lonic. Abstergentis, adstringentis, & frigida est virtutis. Vulnura sanguinem fundentia firmat, & conglutinat, Cam. Lon. Bey Holland in incultis.

DCLXV. *Sideritis arvensis latifolia glabra*, C. B. Pin. pag. 233. *Sideritis secunda*, Bauh. Matth. fol. 711. *Alyssum majus*, Tab. lib. 2. fol. 243. *Sideritis Herculea altera* Casl. lib. 11. c. 35. fol. 451. & 452. *Sideritis primæ arvensis species altera*, Thal. pag. 105. *Sideritis arvensis flore pallido*, Cam. hort. pag. 161. *Wilde Meliß Famellis*. Flosculis provenit albis. In sabulosis hinter dem Rneiphöfischen Walle.

DCLXVI. *Sideritis arvensis angustifolia rubra*, C. B. Pin. pag. 233. *Alyssum Galeni flore purpureo*, Tab. lib. 2. fol. 242. *Sideritis arvensis flore rubro*, Cam. hort. fol. 161. *Sideritidi primæ congener secunda*, Thal. pag. 104. Bey Lauten-Mühl ad agrorum margines. Item bey S. Albrecht in sabuletis.

DCLXVII. *Sion*, sive *Apium palustre foliis oblongis*, C. B. Pin. pag. 154. *Sium verum*, Bauh. Matth. fol. 377. *Sion odoratum*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 465. *Apium palustre*, Fuchl. fol. 270. Lon. deutsch fol. 264. *Sium Cord.* in Diosc. fol. 44. Gesn. hort. fol. 281. Dod. Lateinisch fol. 589. *Eleoselinum*, *Apium palustre*, Fuchl. icon. pag. 136. *Sium primum minus*, Tab. lib. 1. fol. 248. *Sium* sive *Laver Dioscoridis olusatri folio*, sive *Pastinaca aquatica*, Lob. ic. pag. 208. *Wasser-Epff* / *Wassermerck* / oder *Bauern-Epff* / Lon. *Brunnen-Peterlein* / Kyber. in Trag. *Wasser-Peterlein das erste* / Tab. *Wasser-Eppich* / Fuchl. *Frosch-Eppich*

Eppich quibusdam. Calfacit & siccatur, digeritur, infarctus renum expedit, calculos frangit, urinas mensesque citat. Odoratum est, ac gustu amarum. Radix hujus Sii folia sæpè tria facie diversissimâ excludit; quorum unum oblongum & in ambitu crenatum, Sio naturale, alterum profundius incisum & crenatum, tertium profundissimè ac tenerrimè dissectum, Phellandrii ferè modo. Voco illud * Sion, sive Apium palustre foliis variis. Im Land Graben hinter Sellnicken mense Majo.

DCLXVIII. Solanifolia *Circæa* dicta major, C. B. Pin. pag. 168. *Circæa* Lutetiana, Lob. ic. pag. 266. *Lappa sylvestris* Trag. Kyber. in Trag. pag. 843. *Circæa*, Eyttett. *Helxine sylvestris* sive fluvialis, Thal. p. 56. *Herba D. Stephani*, Tab. Icon. pag. 730. *Ocimum verrucarium*, Gefn. hort. fol. 269. *S. Steffens Kraut* Tab. Bey *Schwanis* in uliginosis. Item in der Gausst hinter Runkeln.

DCLXIX. *Solanum Officinarium* C. B. Pin. pag. 166. *Solanum Brunf.* Lateinisch tom. 2. pag. 29. Lon. deutsch fol. 107. *Solatrium vulgare*, Trag. Kyber. in Trag. fol. 303. *Solatrium minus*, Cæf. lib. 5. cap. 18. pag. 212. *Solanum* quod edendo est, Cord. in Diosc. fol. 67. *Solanum nigrum* Cord. hist. fol. 158. *Solanum hortense*, Matth. deutsch fol. 462. Dod. Lateinisch fol. 454. Gefn. hort. fol. 281. Fuchf. fol. 686. Cam. hort. pag. 162. *Solanum sativum*, Tab. lib. 2. fol. 281. *Solanum hortense*, *Circææ* aut *Phaseoli* folio, Lob. ic. fol. 262. *Nachtschatten* Tab. Matth. Fuchf. Kyber. in Trag. *Nachtschatt* oder *Sau-Kraut* Lon. Ad sepes hortorum passim.

DCLXX. *Solanum scandens*, seu *Dulcamara*, C. B. Pin.

Pin. pag. 167. Dulcamara, Dod. Lateinisch fol. 402. Dulcis amara, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 644. Amara dulcis, Tab. lib. 2. fol. 580. Lon. deutsch fol. 237. Solanum γλυκύπικρον, Thal. pag. 106. Dulcis amara flore cœruleo vulgator, Eystett. Vitis sylvestris, Bauh. Matth. fol. 881. Vitis sylvestris Matthioli, Cam. hort. pag. 128. Amara dulcis & solanum fruticosum Gefn. hort. fol. 246. & 282. Amara dulcis, Circæa, Lob. ic. pag. 269: Circæa Monspeliensium, Observ. Lob. fol. 136. Salicastrum Plinii, Cæs. lib. 5. cap. 10. pag. 207. Je länger je lieber Lon. Sebitz. in Trag. Hirsch Kraut Tab. Alffranc Nostratibus, Juxta fluenta im alten Hammer.

DCLXXI. Solanum quadrifolium bacciferum, C.B. Pin. pag. 167. Herba paris, Matth. deutsch/ fol. 471. Dod. Lateinisch fol. 444. Cæs. lib. 15. cap. 13. pag. 573. Eystett. Herba Paris, Uva lupina, Solanum τετραφύλλον, Thal. p. 57. Aconitum salutiferum, Tab. lib. 2. fol. 391. Solanum tetraphyllum, sive Herba Paris, Lob. ic. pag. 267. Ἀσηρ, sed non Atticus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 308. Aconitum Pardalianches, Fuchf. fol. 87. Aconitum monococcum, Cord. in Diosc. fol. 67. Cord. hist. fol. 152. Paris herba, Lon. deutsch fol. 180. Cam. hort. pag. 118. Solanum tetraphyllum, Gefn. hort. fol. 282. Einbeer/ Tab. Matth. Wolffs. Beer oder Stern Kraut/ Kyber. in Trag. Dollwurz/ Fuchf. Folii quandoque quinque vel sex apud nos provenit. Ben Lauten Mühl. Item im Penartischen Walde in umbrosis.

DCLXXII. *Sonchus asper laciniatus latifolius. Säu Diestel mit breiten zerschnittenen Blättern. Planta est bicubitalis, & altius assurgens, è radice lignosâ, flavescente, fibris instructa suis, thyrsus promens striatum, concavum,

vum, lævem, ad latera, & in summitate ramulosum, flosculis ornatum luteis, quibus vanescentibus succedit candidissima lanugo, semini minuto, anguloso & subnigro innitens. Caulem alternatim ambiunt folia atro-virentia, supinè pallida, aspera, proximè terram, & in caule ampla, & insigniter laciniata, in ramusculis laciniis ferè destituta, & oblonga. Inter segetes. *Bei den Huben.*

DCLXXIII. * *Sonchus asper laciniatus angustifolius.* *Sau-Diestel mit schmallen zerschnittenen Blättern.* Foliis duntaxat a priore differt, quæ in hoc angustiora, viridia, aversâ parte exalbida, & elegantius incisa spectantur. Unter dem Getreid nach Laffsen.

DCLXXIV. *Sonchus asper*, Tab. lib. I. fol. 615. Lon. Deutsch fol. 124. Gesn. hort. fol. 282. *Sonchus aspera*, Bauh. Matth. fol. 384. Fuchf. fol. 674. *Sonchus aspera vulgi*, flore Hieracii, foliis Dentis leonis, aliàs *Dipsaci* & *lactucæ*, Lob. ic. pag. 234. *Sonchus asper minor*, Cord. hist. fol. 157. *Sonchus*, Cord. in Diosc. fol. 45. *Sonchus lævis tenerior latifolia*, Lob. observ. fol. 118. *Sonchus asper laciniatus* & non laciniatus, C. B. Pin. pag. 124. *Sau-Diestel* / Tab. *Gänß-Diestel* / *Dudistel* / Lon. *Säumelcken Nasen-Kohl* / Cord. in Diosc. Solum squalidius Soncho huic folia concedit laciniosa Dentis Leonis: lætius verò non laciniata, *Dipsaci* aut *lactucæ*. Sapor ei amarus, aqueâ dulcedine temperatus: Semen dulce odore papaveris. Refrigerat & modicè adstringit. Diosc. Inter segetes.

DCLXXV. * *Sonchus lævis lanceatus acutifolius.* *Sonchen-Kraut mit spitzen absägigten Blättern.* Radix numerosis & crassis fibris, foris subflavis, intus candidis, gustu amaris, caulem effert tricubitalem, & procerius sæpè surgentem, rotundum, striatum, concavum, maximam partem lævem

folia viridia, supinè pallidula, spithamæ longitudinè, unciam lata, alternatim assistunt, proximè terram magis lanceata. His quæ succedunt, & lanceata, & semilanceata, & integra sunt, in acumen abeuntia. Caulis in summitate ramosus nonnihil, flosculos edit luteos in candidos pappos ætatis tractu mutatos. Zu Brandenburg am Frisching. Item hinter Fischhausen nach dem Hase zu. Foliis in ambitu exigua est asperitas.

DCLXXVI. *Sonchus lævis minor paucioribus laciniis*, C. B. Pin. pag. 124. *Sonchus lævis latifolius*, sive tertius, Tab. lib. 1. fol. 616. *Nasen-Kohl*/ Tab. *Breiter Nasen-Kohl*.

DCLXXVII. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*, C. B. Pin. pag. 124. *Sonchus lævis*, Bauh. Matth. fol. 385. Dod. Lateinisch fol. 643. *Sonchus non aspera*, Fuchs. fol. 675. *Sonchus lævis vulgaris foliis laciniosis Dentis leonis*, Lob. ic. 235. *Intybus sylvestris*, seu erratica tertia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 215. *Sonchus lenis seu lævis*, Cord. hist. fol. 157. *Sonchus lævis alter flore luteo*, Tab. lib. 1. fol. 616. *Nasen-Kohl*/ Tab. *Haasen-Kohl*/ Fuchs. Cum leni adstrictione refrigerat. Inter segetes passim.

DCLXXVIII. *Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus*. C. B. Pin. pag. 124. *Sonchus lævis altera*, Bauh. Matth. fol. 385. *Sonchus alter folio profundis laciniis sinuato hederaceo*, Lob. ic. 236. *Sonchus sylvaticus quartus*, Tab. lib. 1. fol. 618. *Wild Sonchen-Kraut das Bierdre*/ Tab. Im Penartischen Walde/ in umbrosis.

DCLXXIX. *Soncho affinis Lamproloma sylvatica*, C. B. Pin. pag. 125. *Sonchus sylvaticus secundus*, Tab. lib. 1.

fol. 617. Wild Sonchen-Kraut das andere/ Tab. Int Penartischen Walde.

DCLXXX. *Sorbus sylvestris foliis domesticæ similibus*, C. B. Pin. pag. 415. *Sorbus sylvestris*, Matth. deutsch/ fol. 101. Tab. lib. 2. fol. 721. *Sorbi quintum genus aucuparium*, Cord. in Diosc. fol. 25. *Sorbus aucuparia*, Clus. hist. lib. 1. fol. 9. Clus. Pann. pag. 8. Thal. pag. 107. *Ornus*, Dod. Lateinisch/ fol. 834. Ruell. fol. 212. *Fraxinea arbor Großer Nal-Baum*/ Trag. Kyber. in Trag. 1009. *Sorbus sylvestris Alpina*, Lob. ic. pag. 107. o. *Wilde Speer-Birn*/ Tab. *Wilder Speerwer-Baum*/ Matth. *Duitschel Beer* Cord. in Diosc. *Duitschen Prutenis*. *Fructus ejus Græcis ὄα vel ῥα adstringunt*. *Sorba sumus molles nimium durantia ventres*, ait Mart. *Rusticis apud nos usui sunt in calculo expellendo*. *Eorum septem & plura sæpè ingerunt cum euphoria*. *Novi quendam triduum ischuriâ laborantem*, qui viginti sorbis absumptis, & lotium copiosè reddidit, & lapillos unâ ejecit pluculos. In sylvis passim.

DCLXXXI. *Sparganium ramosum*, C. B. Pin. p. 15. Tab. ic. p. 246. *Sparganium*, Bauh. Matth. f. 702. Cord. in Diosc. fol. 63. Cæs. lib. 4. cap. 67. pag. 193. Eystett. Cam. hort. pag. 163. *Sparganion*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 677. Gesn. catalog. pag. 118. *Plantaria*, sive *Butomon*. Dod. Lateinisch/ fol. 601. *Plantanaria Dodonæi*, Thal. pag. 91. *Sparganium & Butomos Theophrasti*, Lob. ic. pag. 80. *Butomum*, Ruell. fol. 442. *Schwertel-Ried*/ *Igels-Knospen*. Tab. ic. *Groß-Ried*/ Matth. *Degen-Kraut*/ Cord. in Diosc. *Ein Kraut gleicht sich dem kleinen Schwertel* / Gesn. Catalog. *Desiccantis est facultatis*, Gal. 8. simpl. *Radix alexi-*

alexiteria est, ac tumores discutit. In fossis stagnantibus passim.

DCLXXXII. **Spergula bifolia* lini capitulis. Joh. Lœf. Zwenblättrige Spergel mit kleinen Flachsköpflein. E radice simplici, subalbicante, & nonnihil fibratâ cauliculi exoriantur modò una, modò plures, spithamæ longitudine, in summitate maximam partem ramosi, quorum geniculis bina foliola brevia assident. Flosculos fert albidos, in meditullio flavescentes, quibus succedunt vascula orbiculata, minutum semen, idq; flavum & in acutiem vergens, continentia. An caryophyllis hæc annumeranda? Bey Lautë-Mühl inter fruticeta.

DCLXXXIII. **Spergula perpusilla lanceatis foliolis*. Joh. Lœf. Ganz kleine Spergel mit Lanzächtigen Blättern. *Spergula* hæc admodum exilis radiculis est capillaceis, foliolis à radice tenuiter assurgentibus, quæ paulò post grandescunt ac lanceolæ in modum effigiantur; ita ut formam alicujus plantaginellæ angustifoliæ expriment. Flosculi nivei exiguis nituntur pediculis, ab ipsâ radice exortis, nec altè assurgentibus, quos vanescentes capsulæ excipiunt, semini gestando deservientes. Bey Sarkau zwischen dem Haff und der See in planitie.

DCLXXXIV. **Spina alba tomentosa latifolia sylvestris*, C. B. Pin. pag. 382. *Spina alba tertia*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 675. *Acanthium*, Bauh. Matth. fol. 499. Dod. Lateinisch/ fol. 721. Adv. Lob. fol. 365. *Spina alba sylvestris*, Fuchf. fol. 57. Lon. deutsch/ fol. 102. *Acanthium vulgare* flore purpureo. Tab. lib. 2. fol. 360. Weg-Diestel mit Purpurfarben Blumen. Est & flore albò, hinc Tab. Fuchf. & Lon. Weiße Weg-Diestel nominatur. Folia densâ lanugine obducuntur, ex quâ collectâ & netâ, veses bombycinis similes texi possunt, juxta Diosc. Calfacit

& siccat cum adstrictione. Radix & folia decocta Opisthotonis, & sanguinem sputantibus utilia. Bey der alten Pfund-Bude. Item zu Brandenburg am Schloß.

DCLXXXV. Spondylium vulgare hirsutum, C. B. Pin. pag. 157. Sphondylium, Bauh. Matth. fol. 577. Lon. deutsch. fol. 101. Cæs. lib. 7. c. 54. pag. 312. Sphondylium seu Spondylium, Gesn. hort. fol. 282. Sphondylium I. Tab. lib. 1. fol. 348. Branca ursina, Brunf. tom. 3. fol. 149. Trag. Kyber. in Trag. fol. 344. Spondylium, Adv. Lob. fol. 313. Dod. Lateinisch/ fol. 307. Acanthus Germanica, Fuchf. fol. 53. Beeren-Klaw/Tab. Brunf. deutsche Beeren-Klaw Fuchf. Lon. Matth. Beerentag quibusdam. Bartsch Nostratibus. Radix acrimoniam ferè radicis Angelicæ obtinet. In der Hollen-Grund copiosè. Exherba hâc quondam in Italiâ ammistò oleò & melle paratus clyster Polono, qui inversò usû clysterem ebibit, vesicam cum cannâ capiti imponens. Advenit Medicus sciscitans clysteris effectum, respondit Polonus, & benè clysterem à se epotum, & alvum egregiè indè solutam. Videns Medicus in vertice capitis exstantem cannâ, ac caput unguinosâ vesicâ cinctum, risit sinistrum medicaminis usum, his joculariter additis: prodesse enema ita usurpatum Polono, non Italo. Simile quid hic Regiomonti accidit, in Nauclero quodam Hollando, cui à Medico suppositorium & pillulæ ordinata. Quid fit? Invertit nauta medicaminum usum, glandem devorans, catapotia ano inferiùs committens. Paulò post inqvirenti Medico, quid effectus egerint præscripta pharmaca, rettulit æger, dat lange Dingschen schmackt mooge/ de kleinen Dingschen fullen herut.

DCLXXXVI. Succisa hirsuta cærulea. Joh. Læf. Succisa sive morsus Diaboli, Matth. deutsch f. 243. Dod. Lateinisch f.

124. Succisa, Fuchf. fol. 715. Morsus Diaboli, Trag. Kyber. in Trag. pag. 246. Adv. Lob. fol. 235. Tab. lib. 1. fol. 559. Gesn. hort. fol. 268. Lon. deutsch fol. 180. Cam. hort. pag. 103. Succisa glabra, C. B. Pin. pag. 269. Teuffels Abbiß Matth. Tab. Fuchf. Abbiß / Lon. Unbiß Kraut und Teuffels-Biß vulgò. Prorsus glabram non repperi, sed semper hirsutie quâdam instructam, quæ in foliis proximè terram notabilior. Amara est, calida & sicca gradû secundò intensò Antiquis. Incidit, abstergit, discutit, consolidat, grumos sanguinis dissolvit, tineas alvi necat, & sugillata illitu emendat. In epilepsiâ, lue Gallicâ, peste & malignis febribus salutaris. Tumores tonsillarum fauciumq; contumaces omnium efficacissimè sanat decoctum radice ore detentum, Dod. Minutal herbæ viridis ac radice impositum, carbunculos sanat pestiferos, præsentaneo remedio, Matth. Tota equis porrigitur pabulo mista, visu imbecilli, aut verme discruciat, Tab. In pratis passim. Radices quinque morsus Diaboli Lunâ decrescente effossæ, filo collectæ, collo suspensæ, ac quoad ejus facere poteris, gestatæ, oculorum dolores, cæcitatem minitantes, certò tollunt experimento. Diutulè amuletum hoc tolerandum, nam etiamsi initio parùm proffit, tractu tamen temporis mirificam ejus vim haud dubiè cognosces. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. efficax. Folia colligenda Sole 15. & ingresso: Flores, Sole 1. II obsidente.

DCLXXXVII. Succisa hirsuta candida. Joh. Lœf. Morsus Diaboli flore albo, Tab. lib. 1. fol. 559. Teuffels Abbiß mit weißen Blumen / Weißer Abbiß / Tab. Im Walde bey Selnicken.

DCLXXXVIII. Succisa hirsuta cærulea foliis incisiss
Kk 3 & la-

& laciniatis. Joh. Læf. Teuffels Abbis mit tieff zerschnittenen Blättern. Bey Sellnicken.

DCLXXXIX. *Symphytum consolida major*, C. B. Pin. pag. 259. *Consolida major*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 240. Thal. pag. 28. Cam. hort. pag. 45. *Symphytum Alum*, seu *Alus*, Lob. ic. pag. 583. *Symphytum*, Lon. deutsch fol. 178. *Symphytum majus*, *Consolida major*, Matthiol. deutsch fol. 400. *Symphytum alterum*, Cord. in Diosc. fol. 62. *Symphytum majus flore purpureo* & *albo*, Tab. lib. 2. fol. 261. *Symphytum majus flore purpureo, rubro* & *pallido*. Eystett. *Consolida vulgò*, Cæs. lib. II. cap. 7. pag. 434. Wall-Wurz/ Kyber. in Trag. Lon. Matth. Weiß und braun Wallwurz/ Beinwelle/ Schmeer-Wurz/ Schwarz-Wurz/ Lotwurz/ Cord. in Diosc. Inter fluminum ripas passim. Radix *consolidæ majoris* cum *συμβάλλον μέγος* conferat unguento hopliatrico, cujus autor Anshelmus, Italus Parmensis, qui post sanctus appellatus, operæ pretium esse duxi, ejus & confectionem, & verum addere usum: R. radic. consolid. maj. santal. rubri ana ũnc. 2. lapid. hæmatit. ũnc. 2. usnæ cranii hominis strangul. drachm. 3. pulv. lumbricor. terrestr. ũnc. semiss. axung. ursi masculi, apri, porci ana libr. semiss. Ex his in pollinem actis, & axungiis commissis, pauxillo vini interdato, fiat l. a. unguentum. Usus: in cæsuris oblidens ferrum (eò deficiente, terço ligneolo vulnus refricetur, cruentetur ac deligetur:) verpo inungat aliptes, à dorso aciem versùs progrediens: in puncturis, à capulo mucronem versùs. Ungvinosum post ferrum, linteo involvendum, ac cottidiè deligandum, nec ferventis, nec frigidibus committendum, ne querqverum quid agro attrahas. Interea temporis æger linteamine, aquâ limpidâ madido,

deor-

deorsum vulnus diligenter abstergat, eluat, & victus exactam habeat rationem. Vulnerati morituri τεκμήριον perhibentale: Telo blanditer ad ignem incalescenti, pauxillum miscellæ santali rubri, ac hæmatitæ lapidis inspersum, maculas in ferro si excitat sangvineas, agro exitium promittit. Aliàs vulnera non lethalia, seu cæsim seu punctim inflicta, sanantur, sauciente telo in pingvedinem anserum, vellardum porcinum misso. Consolidæ majoris succosa radix contusa, linteo inducta, & partibus affirmata cruciatus podagricos certo tollit præsidio. Flores consolidæ majoris colligendi, Sole 15. ὁ obsidente: semen, Sole 1. ☿ in-
habitante.

DCXC. Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia. C.B. Pin. 259. Pulmonaria Plinii, Gesn. hort. fol. 274. Pulmonaria altera, Bauh. Matth. fol. 733. Symphytum maculosum, Dod. Lateinisch fol. 135. Pulmonaria maculosa Lob. ic. pag. 586. Cam. hort. pag. 133. Eystett. Pulmonaria folio non maculoso, Clus. hist. lib. 5. fol. 169. Lungen-Kraut das ander/ Matth. Hirsch-Mangolt quibusdam. Im Penartischen Walde primo vere.

DCXCI. Tanacetum vulgare luteum. C.B. Pin. p. 132. Tanacetum, Matth. deutsch/ fol. 378. Dod. Lateinisch/ fol. 36. Gesn. hort. fol. 283. Cæs. lib. 12. cap. 8. pag. 479. Lon. deutsch/ fol. 187. Trag. Kyber. in Trag. pag. 158. Artemisia Dioscoridis, Tab. lib. 1. fol. 34. Tanacetum vulgare Eystett. Tanacetum citrinum, Thal. pag. 125. Tanacetum millefolii foliis, Lob. ic. pag. 749. Artemisia monoclona, Fuchf. fol. 46. Reinfarn/ Matth. Tab. Lon. Fuchf. Kyber. in Trag. Wurm-Kraut vulgò. Calefacit, siccatur, maturatur, & abstergit. In ulceribus antiquis celebratur

bratur à Tab. Helminthogon quoque est, hydroticum ac diureticum. In der Hollen-Grund. Item bey Schwanis fecus agrorum margines copiosè.

DCXCII. Tanacetum foliis crispis, C. B. Pin. p. 132. Tanacetum cristatum Anglicum. Lob. ic. 749. Krause gelbe Reinfahren/ bey Laptau.

DCXCIII. Taxus, Matth. deutsch/ fol. 474. Dod. Lateinisch fol. 859. Gesn. hort. fol. 283. Lon. deutsch/ fol. 39. Cam. hort. pag. 166. Thal. pag. 122. Cæs. lib. 3. cap. 54. p. 134. Taxus, Milos Theophrasti, Lob. ic. pag. 232. o. Eiben-Baum/ Matth. Lon. Bogen-Holz quibusdam. In cœmeterio pagi Trunß provenerat olim, quam eradicatam in hortum transtulit quidam. Arbuscula hæc facilè crescit transplantata, duratque ultra seculum. Baccæ ejus in Angliâ à pueris innoxie esitari, refert Pena. Rustici taxi lignum lacte decoctum, ejusque scobem, utilissimè porrigunt canibus rabidis, quibus in juventute sæpiusculè vermiculi sub lingvâ nascuntur, quælyssæ vel littæ. Scobs ligni experimentò vulgi contra morsum canis rabidi ingeritur. Folia taxi Roris-marini loco in coronamenta sumuntur à fœmellis, quæ auro incrustant, vel argento, sertæ & servias apparantes. Im Scapen bey der großen Glasshütt/ hinter Latten-Walde in umbrosis. Dießeyts Wulffsdorff. Bey Laufischken. Item: Bey Eylen im Ragnitschen/ & alibi.

DCXCIV. Telephium vulgare. C. B. Pin. pag. 287. Telephium primum, Tab. lib. 2. fol. 515. Telephium & Anacamperos, Gesn. hort. fol. 274. & 283. Telephium, Cam. hort. pag. 167. Crassula major: Cæs. lib. 15. cap. 26. p. 579. Thal. pag. 33. Scrophularia media vel tertia, Brunf. Lateinisch/ tom. 1. fol. 215. Faba inversa, sive Crassula, Lob. ic.

pag. 389. Acetabulum alterum. Cord. in Diosc. fol. 69. Telephium album, Fuchf. fol. 800. Cotyledon alterum Dioscoridis, Cymbalaria, Column. in Phytobas. min. cogn. stirp. & rar. Part. 1. pag. 307. Telephium vulgare, sive secundum, Clus. hist. lib. 4. f. 66. Telephium alterum, sive crassula, Dod. Lateinisch fol. 130. Wund-Kraut / Tab. Knaben-Kraut / S. Johannis-Kraut / Fohzwanck / Gauchheil / Fohzwein / Brunf. Wund-Kraut Weiblein / Fuchf. Fette Henne / Donner-Bonen / Cord. in Diosc. Bruch-Wurzel quibusdam. Wolffs-Bohnen Nostratibus. Die pro festo D. Johannis vulgus Telephium trabibus hypocausti submittit, ex marcidâ plantâ hujus vel illius obitum superstitiosè hariolans. In der Hollen-Grund. Item inter segetes passim.

DCXCV. Thalictrum majus filiquâ angulosâ aut striatâ. C. B. Pin. pag. 336. Ruta pratensis, Gesn. hort. fol. 286. Ruta pratensis Herbariorum, Adv. Lob. fol. 391. Thalictrum nigrum, Cord. hist. fol. 97. Thalictrum nigrum Cordi, Thal. pag. 121. Thalictrum, Cord. in Diosc. fol. 69. Thalictrum secundum, sive Germanicum, latifolium, Cam. hort. pag. 167. Thalielrum magnum, Dod. Lateinisch / fol. 58. Ruta sylvestris prima, Cæs. lib. 9. cap. 2. pag. 371. Heyl-Blatt / Cord. in Diosc. In monte Apollinis hinter Duednau; Item bey Neuhausen am Thier-Garten. *Θαλίητρον* vel (*η* in *κ* ex errore mutato) *Θαλικήτρον*, modicè calefacit, citra morsum exsiccat, & vetera ulcera cicatrice obducit.

DCXCVI. Thalictrum pratense angustifolium, C. B. Pin. pag. 337. Ruta pratensis major quinta, Tab. lib. 1. fol. 146. Thalictrum tertium angustifolium, Cam. hort. pag. 167. Große Wiesen-Kraut die fünffte / Tab. Bey Lauten-Mühl. Item bey Holland am Fluß copiosè.

DCXCVII. *Thalictrum pratense* angustissimo folio, C.B. quod 1. in Prodr. pag. 146. In pratis beyrn Penartschen Walde passim.

DCXCVIII. *Thlaspi arvense* filiquis latis, C.B. Pin. pag. 105. *Thlaspi secundum*, Bauh. Matth. fol. 427. *Thlaspi Dioscoridis* *Drabæ* & *Chamælinæ* folio, Lob. ic. pag. 212. Adv. Lob. fol. 73. *Thlaspi latius*, Dod. Lateinisch/ fol. 712. *Nasturtium quartum*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 65. *Thlaspi majus* Tab. ic. pag. 458. Bauren-Senff/ Tab. Klein Seckel- oder Täschel-Kraut. Inter segetes passim.

DCXCIX. *Thlaspi fruticosum incanum*, C.B. Pin. pag. 108. *Thlaspi incanum* Mechlinense, Lob. ic. pag. 216. *Thlaspi Machliniense*, Clus. Pann. pag. 470. *Thlaspi incanum* Machliniense, Clus. hist. lib. 5. fol. 132. In der Holten-Grund copiosè.

DCC. *Tilia fœmina* folio majore, C.B. Pin. pag. 426. *Tilia fœmina* Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 238. Fuchf. fol. 862. Tab. lib. 3. fol. 1692. Bauh. Matth. fol. 156. Gesn. hort. fol. 284. & 285. Cæs. lib. 2. cap. 10. pag. 41 & 42. *Tilia fœmina*, Theophrasti, Lob. ic. pag. 188. o. *Tilia*, Lon. deutsch/ fol. 50. Dod. Lateinisch/ fol. 838. *Tilia sativa*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 879. Linden / Lon. Linden-Baum/ Tab. Fuchf. Linde Germanis, ob ligni lenitatem & mollitiem. E *tiliæ* ligno, cujus materies teredinem non sentit, Auctore Plinio lib. XVI. c. 14. sculpta fuisse simulachra, ex Tertulliano de Idololatriâ constat. Qui de *tiliâ*, inquit, Martem exsculpfit, quantò citiùs armarium compingit? Succo glutinoso abundat, hinc & longæva est, & in primâ ætate flexuosa. Cortex suppeditat materiam, Bast/ Borusis dictam, ex quâ funes & alia parantur. Cortex & folia siccant,

siccant, adstringunt, glutinant, discutunt, ac repellunt. Flores λεπτομερεῖς ac odorati, calefaciunt & siccant. Cataplasma ex foliis pedum tumores discutit, & singulare contra spasmus flatulentum remedium est in gravidis. Scobs ligni tiliacei aurum extemplo & in ictu ferè oculi eliquat, sequentibus mista: R. nitri puriss. Unc. 2. sulphur. scob. lign. tiliac. aa Unc. semis. M. F. pulv. subtiliss. Beneficio hujus pulveris, florenum Hungaricum in volâ manus priùs emunitâ, putaminis nucis juglandis interventu, dictum factum liquo, strato superstrato instituto, & carbone accensô. Tilia arbor Borussis olim idololatrica erat, ad quam fanum exstructum, quod unâ cum Tilia summo in honore fuerat habitum: Ad hanc Tiliam, papalibus tenebris adhuc obrutus Divus Albertus, pedestes ac discalceatus Regiomonto peregrinationem semel instituerat. Post conversus diruto fano, & excisâ arbore, Idololatrias ad locum illum cultûs gratiâ devenientes, suspendio affecit. Ornant sæpè prædia (quæ Varroni à præstando: rectius prædia quasi proædia, loca ante ædes posita) tilieto elegantissimo Nobiles. In sylvis copiosè.

DCCI. Tithymalus helioscopius, C. B. Pin. p. 291. Matth. deutsch/ fol. 528. Dod. Lateinisch/ fol. 371. Fuchf. fol. 811. Cord. in Diosc. fol. 74. Gesn. hort. fol. 284. Lon. deutsch/ fol. 130. Cam. hort. pag. 169. & 170. Tab. lib. 2. fol. 292. Tithymalus helioscopius Dodonæi, Thal. pag. 127. Tithymalus helioscopius, sive solisequius Portulacifolius Lob. ic. pag. 356. Esula, Brunf. Lateinisch/ tom. 1. fol. 194. Esula vulgaris, Trag. Kyber. in Trag. pag. 294. Gemeine Wolffs-Milch/ Kyber. in Trag. Sonnenwendende Wolffs-Milch/ Matth. Lon. Tab. Fuchf. Wolffs-Milch/ Brunf. Hunds-Milch/ quibusdam. In fimetis passim.

DCCII. *Tormentilla sylvestris*, C. B. Pin. pag. 326. *Tormentilla*, Matth. deutsch/ fol. 436. Brunf. Lateinisch/ Tom. 1. fol. 85. Dod. Niederländisch/ fol. 118. Trag. Kyber. in Trag. pag. 503. Tab. lib. 1. fol. 446. Cord. hist. fol. 94. Eystett. Lon. deutsch/ fol. 243. *Tormentilla*, vel *Heptaphyllon*, Lob. ic. p. 696. *Heptaphyllum*, Fuchf. f. 260. Gesn. hort. f. 261. *Tormentill*/ Matth. Tab. Lon. Fuchf. *Tormentill*/ *Rothwurz*/ *Blutwurz* Brunf. *Herzwurz*/ *Feigwurz*/ *roht Gunkel*/ *roht Heylwurz*/ *Schür-Wurz*/ *Birckwurz* vulgò. *Heydeckern* Saxonibus. In umbrosis & muscosis passim obvia.

DCCIII. **Tragopogon luteum abortivum*. Geeler *breitstengelihter Bock's Bart*. Radix substantiâ prorsus candidâ, at flavescente tunicâ cincta, & villosa, caulem emiserat cubitalem, digitum ferè auricularem crassum, sed egregiè latum, latitudine ad radicem unciali, in progressu sesquiunciali, cujus summo sinuato, & in se reflexo, flos incumbens grandior, luteus, uncias quatuor latus, foliis virentibus acutis stipatus, qui manè pandendo se extulit, & à meridie contrahendo se abdedit, in pappos tandem senescendo vanaescens. Foliis erat numerosis, oblongis, angustis, acuminatis, in caule passim indiscriminatim exortis, & contortulis quandoque, anfractibus crenas quasi quasdam præsentantibus. Assistebant adhæc lato illi cauli pulluli thyrsulorum teretes, novellos in fastigio exituros simplices flores, velut in vulgari, promittentes. Floruit Mense Junio, bey'm Rneiphöfischen Walle.

DCCIV. *Tragopogon pratense luteum majus*, C. B. Pin. pag. 274. *Tragopogon*, sive *Barba hirci*, Bauh. Matth. fol. 410. *Tragopogon*, Fuchf. fol. 820. Lon. deutsch/ f. 127. Dod. Lateinisch/ fol. 256. *Tragopogon flore luteo*, Eystett.

Bar.

Barbula hirci, Trag. Kyber. in Trag. pag. 280. Tragopogon luteus communis, Thal. pag. 121. Hirci barba, Cord. in Diosc. fol. 46. Cord. hist. fol. 156. Tragopogon luteum, Lob. ic. p. 550. Tab. lib. 2. f. 297. Barba hirci flore luteo, Cam. hort. p. 27. Gelber Bocks-Bart/ Tab. Lon. Fuchs. Kyber. in Trag. Bocks-Bart/ Gauch-Brodt/ Matth. Morgenstern quibusdam. Am Kneiphöfischen Wall.

DCCV. Tribulus aquaticus, C. B. Pin. pag. 194. Matth. deutsch/ fol. 408. Dod. Niederländisch/ 922. Trag. Kyber. in Trag. pag. 841. Lob. ic. pag. 596. Adv. Lob. fol. 258. Cord. in Diosc. fol. 62. Lon. deutsch/ fol. 98. Gesn. hort. fol. 285. Cæs. lib. 4. cap. 27. pag. 162. Tribulus aquaticus major, Clus. Pann. pag. 713. Tribulus lacustris, Cord. hist. fol. 161. Wasser-Nuß/ Kyber. in Trag. Lon. Wasser-Nuß/ weicher Nuß/ See-Nuß/ Stachel-Nuß/ Spitz-Nuß/ Dod. Zu Uderwang im Mühlen-Teich; Item zu Domnau im Schloß-Teich. Olim Thraces ad Strymonem habitantes, foliis tribuli equos saginabant, ipsi nucleo vivebant, panem facientes prædulcem, & ventrem contrahentem. Effingebant tum pistorum panem in varias formas. Martialis lib. 14. epigramm. 69. Priapi siliginei meminit:

Si vis esse satur, nostrum potes esse Priapum;

Ipsa licet rodas ingruina, purus eris.

DCCVI. Trifolium palustre, C. B. Pin. p. 327. Cord. hist. fol. 96. Dod. Lateinisch/ fol. 580. Eystett. Trifolium fibrinum sive tertium, Tab. lib. 2. fol. 221. Trifolium palustre, seu Trifolium Castoris, Thal. pag. 125. Limonium, Cord. in Diosc. fol. 62. Limonium pratense, Trag. Kyber. in Trag. pag. 705. Trifolium paludosum, Lob. ic. pag. 330.

Ifopyron & Lotus palustris, Gesn. hort. fol. 263. & 265. *Wiber-Klee*/ Tab. *Wiesen-Mangolt*/ Kyb. in Trag. In locis uliginosis & palustribus passim bey Königsberg.

DCCVII. *Trifolium pratense purpureum*, C.B. Pin. pag. 327. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 467. Fuchsf. f. 817. Adv. Lob. fol. 380. *Trifolium pratense*, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 609. Dod. Lateinisch/ fol. 565. Lob. ic. pag. 29. 8. Tab. lib. 2. fol. 222. *Trifolium pratense rubrum*, Cam. hort. pag. 171. *Trifolium pratense vulgare*, flore rubro, Thal. pag. 123. *Braun Wiesen-Klee*/ Fuchsf. *Wiesen-Klee*/ Tab. Matth. *Braun Fleisch-Blume*/ vulgò. Siccantis est indolis. Decoctum ejus in fluore muliebri laudatissimum. In pratis passim.

DCCVIII. *Trifolium pratense album*, C. B. Pin. pag. 327. Fuchsf. fol. 818. Adv. Lob. fol. 380. Cam. hort. pag. 171. *Trifolium majus primum* Clus. hist. *Trifolium acutum*, Lon. deutsch/ fol. 135. *Trifolium pratense alterum*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 467. Bauh. Matth. fol. 609. *Trifolium pratense vulgare flore candido*, Thal. pag. 123. *Weiß Wiesen-Klee*/ Fuchsf. *Spiz-Klee*/ Matth. Lon. Refrigerat, siccant, & nonnihil adstringit. Albo muliebri profluvio mirifice confert, Fuchsf. Clyster ex decocto hujus & purpurei adjecto melle, intestinorum rosiones & dolores sedat, viscidos lentosque adhærentes intestinis humores educit. Præstantius & conducibilius album creditur purpureo, in pabulatione jumentorum. In pratis editioribus passim.

DCCIX. *Trifolium pratense luteum capitulo brevior*, C. B. Pin. 328. *Trifolium pratense luteum*, Fuchsf. f. 819. *Trifolium luteum primum capitulo breviori*, Thal. pag. 124. *Trifolium arvense* Tab. lib. 2. fol. 222. *Feld-Klee*

Klee mit geelen kleinen Köpfchen/ Feld-Klee/ Tab. Geeler Wiesen-Klee/ Fuchf. Tenuium est partium & exsiccat, In pratis aridioribus, & secus vias passim.

DCCX. *Trifolium pratense luteum capitulo lupuli, vel agrarium, C. B. Pin. 328. Lotus campestris, & Melilotus 8. Trag. Sebitz, in Trag. deutsch/ 472. Trifolium luteum alterum lupulinum, vulgò lupulus sylvaticus, Thal. pag. 124. Trifolium agrarium, Dod. Lateinisch/ fol. 576. Ragen-Klee oder Hasen-Pfötlein/ Sebitz, in Trag. Wilder Hopffen Fœmellis. Ad limites agrorum passim. Trifolium luteum minimum Lob. ic.*

DCCXI. *Trifolium montanum album, C. B. Pin. pag. 328. Trifolium majus albo flore, Clus. Pann. pag. 760. Trifolium majus primum, Clus. hist. lib. 6. fol. 245. Weiß spitziger Berg-Klee. Foliis est oblongis, angustis, duris, nervosis, incanis & in ambitu velut serratis. In monte Apollinis. Hinter Duednau.*

DCCXII. *Trifolium montanum purpureum majus, C. B. Pin. pag. 328. Trifolium aliud montanum majus, Thal. pag. 123. Trifolii altera species & major, Gesn. hort. fol. 285. Trifolium majus secundum, Clus. hist. lib. 6. fol. 245. In montosis passim.*

DCCXIII. *Trifolium montanum spicâ longissimâ rubente, C. B. Pin. pag. 328. Lagopus altera folio pinnato, Lob. ic. pag. 40. o. Cytisus, Trag. Kyber, in Trag. pag. 601. Cytisus Columellæ, Lon. deutsch/ fol. 137. Trifolii majoris tertii altera species, Clus. hist. lib. 6. fol. 246. Lagopus major Eystett. Lagopus major alter Dod. Lateinisch/ fol. 578. Trifolium spicatum, Thal. pag. 124. Grosser Weiß-Klee/ Kyber, in Trag. Dignum horto trifolium. Omni.*

Omnium herbarum, quæ lactis copiam pariunt, tam pecoribus quàm mulieribus, præstantissima est Cytisus. In der Osterreichischen Heyde copiosè.

DCCXIV. Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus, C. B. Pin. pag. 328. Lagopus sive pes leporis, Bauh. Matth. fol. 699. Lagopus; Dod. Lateinisch/ fol. 577. Adv. Lob. Fuchf. 494. Lagopus. Pes leporis Obs. Lob. ic. pag. 39. o. Lagopodium Tab. Lib. 2. fol. 222. Lagopus & Lagopyron, Adv. Lob. fol. 383. Lagopus & totus campestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ 472. Leporinus pes. Herba, Cord. in Diosc. fol. 62. Lagopus major, Cæs. lib. 6. cap. 19. fol. 243. Lagopus minor, Cam. hort. pag. 83. Lagopus vulgaris, Thal. pag. 73. Râhen Klee/ Tab. Fuchf. Nasen-Fuß/ Nasen-Klee vulgò. Râhen Schwanz Fœmelis. Siccando & adstringendo forioli utilis. Passim inter segetes.

DCCXV. Trifolium sylvestre luteum filiquâ cornutâ, vel Medica frutescens, C. B. Pin. pag. 330. Medica flavo flore, Clus. hist. lib. 6. fol. 243. Medica flore luteo, Clus. Pann. pag. 759. Lens major repens, Tab. lib. 2. f. 204. Meliloti majoris speciesteria, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ 471. Großkriechende Linsen/ Tab. Großer Stein-Klee/ der dritte. Sebitz. in Trag. Bey der Balga am Nase copiosissimè. Item bey Lauten Mühl.

DCCXVI. Trifolium acetosum vulgare, C. B. Pin. pag. 330. Oxytriphylon, Trag. Kyber. in Trag. pag. 521. Trifolium acetosum, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 50 Dod. Lateinisch/ fol. 578. Matth. deutsch/ fol. 352. Thal. pag. 123. Trifolium acetosum flore albo, Eystett. Alleluja, Lon. deutsch/ fol. 246. Oxys Fuchf. fol. 564. Cord. hist. fol. 172. Tab. lib.

lib. 2. fol. 224. Oxys Plinii, Gesn. hort. fol. 270. Oxys Pliniana, Panis cuculi, Alleluja officinarum, Trifolium acetosum, Lob. ic. pag. 32. o. Oxys flore lacteo, Cam. hort. pag. 114. Buchampffer/ Tab. Kyber. in Trag. Sauer-Klee Matth. Fuchf. Guck-Gauch-Klee/ Lon. Gauch-Ampffer/ Brunf. Buch-Klee/ Guck-Gauchlauch/ Gauch-Brodts/ Hasen-Klee/ Hasen-Ampffer vulgò. Ruckucks-Kohl Nostratibus. In umbrosis & sylvosis radicibus arborum passim adnascitur. Radix colligitur Sole 1. V inhabitante.

DCCXVII. Trifolium hepaticum flore simplici, C. B. Pin. pag. 330. Hepatica Brunf. Lateinisch/ tom. 1. fol. 190. Hepatica aurea, & herba Trinitatis, Gesn. hort. fol. 261. Hepatica aurea flore cœruleo, Tab. lib. 2. fol. 225. Hepatica aurea, Thal. pag. 56. Trifolium aureum, Dod. Lateinisch/ fol. 579. Lon. Deutsch/ fol. 246. Trinitas, Bauh. Matth. fol. 610. Trinitas & Epimedium, Cord. hist. fol. 93. Nobilis hepatica, Trag. Kyber. in Trag. pag. 519. Hepaticum trifolium, Lob. ic. pag. 34. o. Trifolium hepaticum sive aureum flore cœruleo, Cam. hort. pag. 172. Hepatica trifolia cœruleo flore, Clus. hist. lib. 6. fol. 247. Blau gülden Leber-Kraut/ Tab. Edel Leber-Kraut/ Matth. Kyber. in Trag. Gülden-Klee/ Hirsch-Klee quibusdam. Blaue Birole Nostratibus. In umbrosis bey Schwanis; Item bey Domnau.

DCCXVIII. Tussilago vulgaris, C. B. Pin. pag. 197. Cam. hort. pag. 175. Tussilago, Bauh. Matth. fol. 614. Fuchf. fol. 140. Cord. in Diosc. fol. 58. Gesn. hort. fol. 258. Cæs. lib. 12. cap. 21. pag. 490. Lon. Deutsch/ fol. 254. Tussilago

filago, Farfara, Ungula Cabballina officinorum Adv. Lob.
 ic. pag. 589. Bechion sive Farfara, Dod. Lateinisch/ fol. 596.
 Ungula caballina, Brunf. Lateinisch/ tom. 1. fol. 42.
 Trag. Kyber. in Trag. pag. 418. Bechion, Cord. hist. f. 93.
 Huff Lattich/ Matth. Lon. Rosshub/ Fuchf. Brunf. Kyber.
 in Trag. Brandt-Lattich/ Esels-Huff/ Brandletschen vul-
 gò. Secus fontes ac fossarum margines copiosè primo statim
 vere visitur. Tussilaginis vulgaris lanugo collecta, lintea-
 mine quodam cum paulo nitro conclusa, in lixivio decocta,
 ac in Sole siccata, igniariis fomitem omnium tenerrimum
 administrat. Verbasci albi lanugo idem præstat. Tussila-
 ginatum vel Farfaratum, quò Tabaci locò utendum, ita fieri
 potest: R. vini tincti seu de Alecante, Cerevisiæ Dantisc.
 Joppen-Bier ana libr. 2. Ebull. cum flor. Rosmar. Lavendul.
 pæoniæ, bugloss. borrag. Violar. à Mj Colaturæ adde succ. flor.
 betonic. rosar. Provincial. tiliæ, lilior. convall. ana Libr. 1.
 coquantur succi cum priori decocto, ac despumentur opti-
 mè: post adde salis commun. Mj pulv. Cinamom. nuc.
 moschat. macis sem. anis. ana Unc. semis. ambr. gris. veræ,
 spiritu vini dissolutæ, Scrupul. semis. ebulliant iterum, & ut
 crassamentum subsidat, ollam benè tectam aliquandiu serva.
 Mox liquidius transfusum de integro ebullire permitte, &
 confestim folia tussilaginis, mediam crescendo ætatem nacta,
 nervo crassiori vel exciso vel fracto, immitte, maceraturus
 ut mollescant. Insuccata ita folia panno involvantur laneo,
 linteò mox inductò, ac fimò equinò superpositò, ut fervore
 contractò sui digestionem & ulteriorem elaborationem con-
 sequantur folia. Cottidiè autem eadem inspicienda, nec
 eximenda, donec rufulum contraxerint colorem. Quò ad-
 versò (horridus foliorum, fotù diutiùs continuatò, evite-

tur nigror, qui corruptionis manifestus index) segestre panneum aufer, ac filo crassiori transfossa collige folia, quæ in loco perflabili & umbrosiore siccata, convoluta tandem ac gyrata, funibus arctissimè constringantur, & in vasculo ligneo firmissimè impacta servantur. Fumus hujus tussilaginati, tubulo haustus, gravior erit & cerebro, & cordi, ejusq; ventilabro pulmoni.

DCCXIX. Typha palustris major, C. B. Pin. pag. 20. Typha Matth. deutsch/ fol. 447. Fuchf. fol. 823. Tab. lib. 1. f. 686. Lob. ic. pag. 81. Cord. in Diosc. f. 58. Lon. deutsch/ f. 209. Typha palustris, Ruell. f. 560. Dod. Lateinisch/ f. 604. Cæs. lib. 4. cap. 68. pag. 194. Typha aquatica, Trag. Kyber. in Trag. pag. 681. Narren-Kolben/ Fuchf. Kyber. in Trag. Narren-Kolben/ See-Kolben Matth. Liefch/ oder Moß-Kolben/ Tab. Kolben/ Lon. Lief-Knospen/ Deitel-Kolben quibusdam. Ejus flos ambustis medetur. In aquis stagnantibus & uliginosis hinter der Altstättischen Ziegel-Scheune.

DCCXX. Valeriana sylvestris major, C. B. Pin. p. 164. Valeriana vulgaris, Trag. Kyber. in Trag. pag. 61. Valeriana & Phu majus commune, Gesn. hort. f. 272. & 285. Valeriana sylvestris, Dod. Lateinisch/ f. 349. Eystett. Lob. ic. pag. 715. Valeriana sylvestris major, Thal. pag. 129. Phu parvum, Bauh. Matth. fol. 38. Valeriana altera, Cæs. lib. 4. cap. 2. pag. 148. Phu vulgare, Tab. lib. 1. f. 562. Valeriana sylvestris prima, Clus. hist. lib. 4. f. 55. Phu Germanicum, Fuchf. f. 857. Gemein Baldrian/ Matth. Fuchf. Kyber. in Trag. Großer Baldrian/ Tab. Rachen-Wurzel/ großer Denmark/ Augen-Wurzel/ Wend-Wurzel vulgò. Valeriana sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. Flores legem-

legendi, Sole 1. m occupante: semen, Sole 8. m incolente. Semen egregiè purgat vino maceratum & assumptum. Radix, Sole 15. ☉ incolente, effossa, concisa, ac vinò malvaticò tam diu macerata, donec Sol ultimum gradum m attingat, pòst torculari submissa & expressa, oleum reddit tussientibus salubre. Radix ante ortum Solis (Sole 15. ☉ ingresso) effossa, taffetto insuta, ac collo, Sole in 1. ☿ versante, appensa, oculos confortat, aciemq; eorum tuetur.

DCCXXI. Valeriana Græca. Dod. Lateinisch/ f. 352. Tab. lib. 1. f. 569. Valeriana cœrulea, C. B. Pin. pag. 164. Phu peregrinum, Gesn. hort. f. 272. Valeriana peregrina Cam. hort. pag. 176. Valeriana peregrina Belgarum & Herbariorum, Adv. Lob. f. 319. Valeriana Græca flore cœruleò, Eystett. Griechischer Baldrian/ Tab. Bey Jüden-Kirch auff der Wiese.

DCCXXII. Valeriana palustris minor, C. B. Pin. Valeriana exigua vel 4. Trag. Seb. in Trag. Valeriana sylvestris minor Adv. Lob. Phu minus, Tab. lib. 1. Kleiner Wasser-Baldrian. Ibidem.

DCCXXIII. Valeriana campestris inodora major, C. B. Pin. pag. 165. Album olus, Dod. Lateinisch/ f. 647. Phu minimum alterum, Lob. ic. pag. 717. Lactuca agnina Tab. lib. 1. f. 570. Valerianæ campestris secunda species, Cam. hort. pag. 175. Bupleuron, Cæs. lib. 4. cap. 14. pag. 156. Locusta quibusdam Gesn. hort. fol. 265. Lamm-Lattich/ Tab. Insipidò ferè est sapore, refrigerat, & nonnihil humectat. Estur in acetariis hybernò tempore, quæ tum latissimè viret, Radix Valerianam redolet. In der Hollen-Grund.

DCCXXIV.

DCCXXIV. Valeriana palustris foliis subrotundis parum incis. Klein Wasser-Baldrian mit rundtechten Blättern. E radice geniculatâ, ac copiosissimis filamentis præditâ, exsurgit caulis spithamam altus, cui propè terram subrotunda, pediculis longis, in progressu verò ad internodium caulis bina ex adverso sita subserviunt folia, quæ circa umbellam florum congestorum ac pallidè rubentium, parum inciduntur ac dividuntur. In loco uliginoso propè pagum Lengen/ in Diœcesi Elbingensi, Majo Mense.

DCCXXV. Verbasculum pratense odoratum, C. B. Pin. pag. 241. Primula veris, Bauh. Matth. f. 801. Lonicerus deutsch/ f. 170. Primula veris sive prima, Tab. lib. 2. fol. 34. Primula veris hortensis, Thal. pag. 90. Herba Paralysis, Brunf. Lateinisch/ tom. 1. f. 96. Trag. Kyber. in Trag. pag. 201. Herba paralysis altera, Cæs. lib. 6. cap. 57. pag. 261. & 262. Primula pratensis, Lob. ic. pag. 567. Primula pratensis odora lutea, Adv. Lob. f. 243. Verbasculum odoratum, Fuchf. fol. 850. Arthritica simplici luteo flore, Cam. hort. pag. 22. Primula veris flavo flore elatior, Clus. hist. lib. 3. f. 301. Primula veris major, Dod. Lateinisch/ f. 147. Primula veris flore luteo, Eystett. Alisma pratensis, Colum. in Phytobas. pag. 21. Schlüssel-Blumen/ Tab. Matth. Kyber. in Trag. Geel Schlüssel-Blumen/ Fuchf. Himmel-Schlüssel/ Brunf. S. Peters Schlüssel/weiß Betonten/ Nicht-Kraut/ Handschuch-Blumen quibusdam. Ad sylvarum margines passim.

DCCXXVI. Verbasculum mas latifolium luteum, C. B. Pin. pag. 239. Verbasculum mas, Tab. lib. 2. f. 266. Verbasculum mas, Thapsus barbatus, Adv. Lob. fol. 242. Ver-

basium primum, Bauh. Matth. f. 800. Verbasium aut Phlo-
mos vulgaris mas Dioscoridis, Thapsus barbatus officinarum,
Lob. ic. p. 561. Verbasium latius, Dod. Lat. f. 143. Verbasium
candidum mas, Lon. deutsch/ f. 161. Verbasium latifolium mas,
Eystett. Verbasium album mas, Thal. p. 129. **Wull Kraut/
Männlein/ Tab. Wull Kraut/ Königs Kerk/ Matth. Weiß
Wull Kraut/ Männlein/ Lon. Kerzen Kraut/ Brenn-
Kraut/ Himmelbrandt/ Unholden Kerk/ Feld Kerk vulgò.
Welcke** Nostratibus. Copiosè visitur hæc planta circa op-
pidum Holland in ascensum montium. Bey Nöbel in in-
genti copia. Herba colligenda Sole 15. ☿ occupante: flo-
res Sole in ☿ constituto: Semen Sole in ultimo gradu ☿
radix Sole in ♄. ☿. Oleum in podagrâ & contracturis per-
utile hõc modò paratur: Flores dictò tempore collecti, ac
vitro conclusi, Soli exponantur, donec Sol 15. ☿ attingat.
Podagræ remedium: Verbasii manipulus unus & alter, cum
tantulo cretæ decoquatur, decocto pedes foveantur & ablu-
antur, post in scrobem fordida miscella conjiciatur, terrâ te-
gatur, putredine peritura, & curatura. Verbasii albi, seu
maris, flores tumsi, succum fundunt fœmellis servientem, tur-
pes dum vultus ruga senilis arat. Folia lateres inter ignitos
cocta, ex calceatu claudicantes equos fortè egregiè juvant.

DCCXXVII. Verbasium nigrum flore ex luteo pur-
purascente, C. B. Pin. 240. Verbasium nigrum, Trag. Kyber.
in Trag. p. 218. Tab. lib. 2. f. 267. Dod. Lateinisch/ f. 144. Ver-
basium nigrum Dioscoridis, Lob. ic. pag. 562. Verbasium ni-
grum latifolium, Thal. pag. 129. Verbasium tertium, Bauh.
Matth. fol. 800. Blattaria Plinii, seu Verbasium nigrum,
Eystett. Verbasium nigrum salvifolium purpureo flore, Adv.
Lob. 241. Verbasium sylvestre, Fuchs. fol. 849. Verba-
scum

scum sylvestre minus, Lon. deutsch/ fol. 169. Schwarz
Wull Kraut/ Tab. Wull Kraut das dritte/ Matth. Wild
Wull Kraut/ Fuchf. Wild Wull Kraut das kleine / Lon.
Schwarz Kerzen Kraut vulgò. In der Hollen Grund.
Item in pagis passim.

DCCXXVIII. Verbascum nigrum flore candido,
in medietullio purpurascete. J. L. Cum verbasco nigro flore
ex luteo purpurascete, C. B. in reliquis convenit. In pa-
go Werlitten im Osterreichischen.

DCCXXIX. Verbena communis cæruleo flore,
C. B. Pin. pag. 269. Verbena, Gesn. hort. fol. 285. Lon.
deutsch/ fol. 167. Verbena recta, Trag. Kyber. in Trag.
pag. 210. Verbena communis & sacra recta, Lob. ic. pag.
534. Verbenaca, Matth. Bauh. in Matth. fol. 742. Verbe-
na recta, Dod. Lateinisch/ fol. 150. Tab. lib. I. f. 471. Ver-
benaca supina, sive foemina, Fuchf. fol. 593. Verbenaca su-
pina, Cord. in Diosc. fol. 66. Verbena mascula, Brunf. La-
teinisch/ tom. I. fol. 119. Verbena foemina, Cæs. lib. II. cap.
32. pag. 450. Cam. hort. pag. 176. Verbena vulgaris, Clus.
hist. lib. 4. fol. 45. Eisen Kraut Männlein / Tab. Eisen-
Kraut/ oder Eisenhart Männlein/ Lon. Eisen Kraut/ oder
Eisenhart/ Matth. Eisenrich/ Eisen/ Isen Kraut / Lau-
ben Kraut quibusdam. Verbena sicca & calida est, gustu
amara, adstringens ac glutinans, Tab. Dolorem capitis di-
scutiendo mitigat, Gal. 2. de compos. med. Im alten Ham-
mer. Item zu Runzen in pago copiose. Verbena sub e-
levatione poli 45. 46. 47. 48. 49. Folia colligenda Sole in
ny existente: flores Sole in d. Verbena sagmen dicitur
veteribus. Justinianus l. Sanctum. ff. de divisione rerum
& qualitate. Sanctum est, quod ab injuriâ hominum defen-
sum

sum atque munitum est. Sanctum autem dictum est à sagminibus. Sunt autem sagmina quædam herbæ, quas Legati Populi Romani ferre solent, ne quis eos violaret. Origo ex Græco *σάγμα* pro *ἀγίωμα*, unde sagmen.

DCCXXX. Veronica mas supina & vulgarissima, C. B. Pin. pag. 246. Veronica mas, Fuchf. fol. 166. Lon. deutsch/ fol. 96. Thal. fol. 131. Veronica, Tab. lib. 2. fol. 98, Teucrium, Trag. Kyber. in Trag. pag. 207. Veronica vulgò dicta, Gesn. hort. fol. 285. Veronica vulgaris supina, Clus. hist. lib. 3. fol. 347. Veronica vera & major, sive Veronica major Septentrionalium & Veronica mas Fuchfii & Dodonæi: etiam Betonica Pauli, Lob. ic. pag. 471. Veronica major, Cam. hort. pag. 176. Veronica vera & major, Adv. Lob. fol. 197. Veronica mas serpens, Dod. Lateinisch/ fol. 40. Auricula muris tertia, Cæs. lib. 8. c. 27. pag. 335. Ehren-Preis/ Tab. Kyber. in Trag. Ehren-Preis/ Männlein / Lon. Fuchf. Grundheil quibusdam. In locis apricis passim. In pago Latten-Walde Veronicam hanc foliis observavi maximis. Veronica sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. Radix effodienda, Sole 15. ☉ occupante: cauliculi, Sole ultimum ☉ gradum inhabitante. Folia Sole 1. ☿ tenente: flores, Sole 15. ☿ obsidente: semen Sole ultimum gradum ☉ tenente. Veronica tussedine discruciatissimæ commendatissima est planta. Hic ἀντροποδίτι transilire non possum illud, quod nempe quondam hic Regiomonti (in der krummen Grub) habitavit mulier, Anna pistoris cujusdam uxor, quæ tussientes & quosvis sputatores ex mirabili antipathiâ ferre non potuit. Minxit namque confestim, ac diras imprecata est, exaudiens screatu vel tussi aliquem sputa moventem. Rusticis ubi pro fru-

frumentis solvendis pecuniam numerabat, inter numerandum si quempiam sputantem advertebat, in hæc mox prorupit verba: Sprüß deine Mutter die Hure/ & perrexit numerando 6. 7. 8. 9. Sprüß du Huren-Sohn/ 10. 11. 12. Sprüß deine Mutter die Hure/ 13. 14. 15. &c. Maritus ejus vel in cellam se abdidit tussiens, vel aliò se abduxit, ne audiretur malò pressus. Metuit namque scelerata, quæ in quosvis tussientes promiscuè effutierat, verba. Scaliger Exercit. CCCXLIV. §. 6. tradit, nobilem quendam Vasconem, auditò phormingis sono, illicò urinam reddidisse.

DCCXXXI. Veronica spicata angustifolia, C. B. Pin. pag. 246. Veronica recta vulgaris major, Clus. hist. lib. 3. fol. 347. Veronica spicata cœrulea, Cam. hort. pag. 177. Veronica recta Herbariorum Lob. ic. pag. 473. Auricula muris quarta, Cæs. lib. 8. c. 27. Veronica recta prima & secunda, Tab. lib. 2. fol. 99. Aufrecht stehender Ehren-Preiß/ Tab. Schwalcken-Tagel Nostratibus. In ericetis bey Brandenburg/ item bey Lauten-Mühl.

DCCXXXII. Veronica pratensis serpillifolia, C. B. Pin. pag. 247. Teucrium alterum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 165. Veronica pratensis, Dod. Lateinisch/ f. 41. Veronica fœmina, Thal. pag. 131. Veronica minor serpillifolia, Lob. ic. pag. 472. Betonica Pauli quorundam, Cam. hort. pag. 28. Auricula muris prima in pratis humectis, Cæs. lib. 8. c. 27. pag. 335. Bey Königsberg passim.

DCCXXXIII. Vicia sepium folio rotundiore acuto, C. B. Pin. p. 345. Aphaca, Bauh. Matth. f. 416. Vicia, Dod. Latein. f. 531. Lob. ic. p. 75. o. Clus. hist. lib. 6. f. 235. Cæs. lib. 6. c. 11. p. 236. Orobus sylvestris sive Vicia major sylvestris, & secunda, Trag. Seb. in Trag. deutsch/ f. 495. Aphace, Fuchsl. f. 110.

Vicia sylvestris, Lon. deutsch/ fol. 285. Wilde Wicken/ Matth. Fuchf. Große Wicken/ Seb. in Trag. In dumetis & frutetis passim.

DCCXXXIV. *Vicia multiflora hirsuta cærulea*. *Vicia multiflora*, C. B. Pin. pag. 345. Aracus, Tab. lib. 2. fol. 208. Galega altera, vel sylvestris, aut Germanica, Dod. Lateinisch/ 548. Galega sylvestris Dodonæi, Thal. pag. 55. Bogels Wicken/ Tab. In dumetis & secus vias passim.

DCCXXXV. *Vicia multiflora hirsuta purpurea*, Joh. Lœf. Rauge braune vielblütige Wicken. In der Hollen-Grund.

DCCXXXVI. *Vicia multiflora glabra candida*, Joh. Lœf. Unrauge weiße vielblütige Wicken. Im Morungischen Walde.

DCCXXXVII. *Vicia semine rotundo nigro*, C. B. Pin. pag. 345. Craccæ primum genus, Dod. Lateinisch/ fol. 582. Aracus, Araca, & Cracca major: *Vicia sylvestris* Lob. ic. 75. o. *Vicia minor*, vel tertia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ 495. Braune Baldwicken mit runden schwarzen Saamen. Reperta bey dem Altstädtschen Gericht in montosis; mense Aprili. Semen columbarum cibus, quod inescari possunt, gratissimus. Flosculis est purpureis.

DCCXXXVIII. *Vicia segetum cum filiquis plurimis hirsutis*, C. B. Pin. pag. 345. Craccæ alterum genus, Dod. Lateinisch/ fol. 542. Cracca minor, Tab. lib. 2. fol. 208. *Vicia minima*, vel quarta, Trag. Seb. in Trag. deutsch/ fol. 496. Aracus sive Cracca minima, Lob. ic. pag. 76. o. Kleine wilde Wicken/ Tab. Flosculis est tenellis, candidulis: filiquis nanis, curtis, hirsutis, binis, trinis, vel quaternis feminulis rotundis gravidis. Inter segetes passim.

DCCXXXIX.

DCCXXXIX. *Viola Martia purpurea flore simplici* odoro, C. B. Pin. pag. 199. *Viola purpurea*, Matth. deutsch/ fol. 514. Adv. Lob. fol. 266. Cæs. lib. 9. cap. 39. pag. 393. *Viola Martia purpurea*, Tab. lib. 2. fol. 16. *Viola Martia odorata nigra seu purpurea*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 443. *Viola Martia præcox purpurea*, odora, simplici flore, Lob. ic. 608. *Viola nigra*, sive *purpurea* Dod. Lateinisch/ fol. 156. *Viola nigra*, Cord. in Diosc. fol. 71. Gesn. hort. fol. 286. *Viola*, Lon. deutsch/ fol. 214. *Blaue/ oder braune Biolen/ Matth. blaue Biolen/ Lond. Blaue oder braune Merck Biolen/ Tab. In der Hollen-Grund sponte.* Efficax sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. Radix effodienda Sole 1. 8 ingrediente. Refrigerat, ac pulmonum exulcerationibus medetur. Flores efficacissimi Sole in 8 abeunte.

DCCXL. *Viola Martia inodora sylvestris*, C. B. Pin. pag. 199. *Viola canina*, Tab. lib. 2. fol. 18. Lon. deutsch/ fol. 214. *Viola sylvestris inodora*, Dod. Lateinisch/ fol. 156. *Viola canina cærulea inodora sylvestris serotina*, Lob. ic. pag. 609. *Viola nigra sylvestrior species*, Gesn. hort. fol. 286. *Viola purpurea sylvestris sive canina*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ 443. *Viola Martia canina*, Eyttett. *Viola Martia sylvestris*, Thal. pag. 130. *Hunds Biolen/ Lon. Tab. Sebitz. in Trag. In der Hollen-Grund passim.*

DCCXLI. *Viola tricolor hortensis repens*, C. B. Pin. pag. 199. *Herba sanctæ Trinitatis*, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 29. *Herba Trinitatis*, Fuchf. fol. 803. Lon. deutsch/ fol. 215. *Herba Trinitatis sativa*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 448. *Viola tricolor*, Dod. Lateinisch/ fol. 158. *Viola Trinitatis prima*, Tab. lib. 2. fol. 24. *Jacea*, sive *flos Trinitatis*, Bauh. Matth. fol. 832. *Viola flammea*, Cæs. lib. 9.

cap. 40. pag. 393. *Viola flammea*, coloria, calida, Lob. ic. pag. 611. *Frensam Kraut* / Tab. Lon. *Drenfaltigkeit Blum* / Brunf. *Frembde Sorge Nostratibus*. Cubitum & quadrantem alta in lætiori Sole reperta à me zu Gerdauen. In incultis & desertis passim. Sub elevatione poli graduum 45. 46. 47. 48. Radix eruatur Sole 39. 8 occupante: folia cum cauliculis, Sole 1. ☉ inhabitante: flores, Sole 30. ☿ tenente: semen, ultimum ☿ gradum Sole ingresso.

DCCXLII. *Virga aurea solidago Sarracenica dicta* Joh. Lœf. latifolia, serrata. *Groß heydnisch Wund Kraut mit breiten Blättern*. Radix ex multis crassis, longiusculis & albidis fibris constituta, caulem porrigit tricubitalem, nonnunquam & productiorem, rotundum, ramosum, viridem & striatum, albicante medullitùs pulpâ, cui folia virentia, tres digitos transversos lata, ac spithamam ferè longa, lanugine destituta, & in circuitu egregiè serrata, subserviunt. Fastigia caulium honestantur copiosis flosculis luteis, ætatis tractu in pappos euntibus. *Zur Kobbel Bude am Frisching*.

DCCXLIII. *Virga aurea, Solidago Sarracenica dicta, angustifolia serrata*, Joh. Lœf. C. B. Pin. pag. 268. *Solidago Sarracenica*, Dod. Lateinisch / fol. 141. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / 388. Fuchf. fol. 728. Observ. Lob. fol. 159. Adv. Lob. fol. 125. *Virga aurea*, Gesn. hort. fol. 286. *Consolida aurea*, Tab. lib. 2. pag. 258. *Consolida Sarracenica*, Thal. pag. 27. Eyfett. *Groß heydnisch Wund Kraut mit schmalen Blättern*. *Gölden Wund Kraut* / Tab. *Heydnisch Wund Kraut* / Fuchf. In longitudinem quatuor imò quinq; ulnarum excrefcit sæpè, caulem pedi loco utendum suppeditans. Folia dorso lanuginosa ex atro virescunt ac splendent: Quæ cacumina versùs caulium tendunt, ex incisione crispata veluti sunt in ambitu. *Zur Kobbel Bude am Frisching*.

DCCXLIV. Virga aurea latifolia ferrata, C. B. Pin. p. 268. Virga aurea ferratis foliis Tab. lib. 2. f. 546. Virga aurea altera ferrato folio, Lob. ic. p. 299. Virga aurea margine crenato, Dod. Lat. 142. *Gulden Bund Kraut mit breiten Blättern. Gulden Bund Kraut* / Tab. Calida & sicca ordine ferè secundo. Abstergit, glutinat, adstringit, urinam provocat, & renum calculos atterit, ac expellit. Villanovan^o de virtutib⁹ hujus plantæ hæc memoriæ prodit: De virgâ aureâ vidi experimentum in quodam, qui habuit lapidem in vesicâ, & comedit dictam herbam cum ovis omni manè per novem dies, & fractus est lapis, & ipse ostendit mihi manum plenam lapillis. Post addit: Omnia ulcera tam antiqua quàm recentia citò consolidat imposita, & ani exitum ac dolorem hæmorrhoidum largè fluentium sanat, in cibo vel potu sumpta. In monte Apollinis hinter Dœdnau. Floret Sole in ☉ existente. Optima sub elevatione poli 46. 47. 48. 49. Radix ejus Sole 1. ☉ ingresso collecta, ulcerationibus jecoris & pulmonum deservit. Flores ultimum ☉ gradum Sole occupante colligantur.

DCCXLV. Viscum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 949. Fuchf. fol. 329. Dod. Lateinisch/ fol. 826. Matth. deutsch/ fol. 333. Cord. in Diosc. fol. 57. Lon. deutsch/ fol. 87. Tab. lib. 3. fol. 671. Lob. ic. pag. 636. Viscum baccis albis, C. B. Pin. pag. 423. *Mistel* / Matth. Kyber. in Trag. Fuchf. Lon. *Mispel* / Tab. Emollit, digerit, extrahit, discutit, parotidas, tubercula, cæterasque collectiones ad maturationem perducit, Diosc. Querculanum & in corylo natum epilepticos juvat: In pyro sylvestri proveniens, cum foliis contusum, & pingvedini caponum emplastri instar

N n 3

mix-

mixtum, ac compositum, contracturas sanat. Sebitz. Cortices & baccae immaturæ aviculis exitiosum.

DCCXLVI. *Viscum fraxini baccis ex albo luteis. Joh. Læf. Eschen-Weissel mit weißgelben Beerlein. Observavi viscum apud nos in abiete, salice, sorbo, tiliâ, quercû, corylô, betulâ, pyrô, pomô, & fraxinô. Quia verò illud è fraxino rariùs est, & ante vix ab ullô annotatum, adhibuit in præfenti id paucis depingere. Hyeme hoc ab arbore dejectum, ex frustis sex, alas veluti quasdam præsentantibus, constituebatur, pediculis nitentibus suis, quorum concursus coronam quasi quandam mentiebatur. Quælibet ala compressa erat & striata, cubitum ferè alta, uncias duas lata, in fastigio curvata & hiulca. Baccae, alis & pediculis assistentes, ex albo luteæ spectabantur. Hinter Labiau im Nemo-nin, quæ cædua est sylva, fraxinis & alnis maximam partem constans, in quâ minimum quatuor mille ligneorum struum (quas Ahtel-Holz Nostrates dicunt) singulis annis colliguntur, annum redditum Regi nostro sedecim millibus Imperialium augens.

DCCXLVII. Vitis idæa foliis subrotundis exalbidis, C. B. Pin. pag. 470. Vitis idæa altera, Clus. hist. lib. 1. pag. 62. Clus. Pann. pag. 79. Vitis idæa Gesneri major, Cam. hort. pag. 182. Drunckel-Beeren Nostratibus. Hinter Rar-schau in muscolis. Pulpa baccarum albicat, acini flavescent.

DCCXLVIII. Vitis idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante. C. B. Pin. 470. Vaccinia nigra, Dod. Lateinisch/ fol. 768. Adv. Lob. fol. 415. Myrtillus, Matth. deutsch/ fol. 82. Lon. deutsch/ fol. 58. Vitis idæa prima, Tab. lib. 3. fol. 580. Bagolæ primum genus, Cæs. lib. 5. cap. 14. pag. 210. Heidel-Beer/ Tab. Lon. Gemeine Heidel-

del-Beeren/ Matth. Blau-Beeren Nostratibus. In ericetis & muscosis passim.

DCCXLIX. *Vitis idæa* foliis subrotundis non crenatis baccis rubris, C. B. Pin. 470. *Vaccinia rubra*, Dod. Lateinisch/ fol. 770. Adv. Lob. fol. 415. *Myrtillus exiguus*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 974. *Vitis idea buxeis foliis*. Clus. hist. lib. 1. fol. 61. *Vitis idæa species altera acinis rubris*, Gesn. hort. fol. 287. Foliis buxi locò utuntur mulieres hybernò tempore insertis exornandis, quæ sæpius inaurant vel argento incrustant. Bey Schwanis im Gebrüch/ itém bey Lauten-Mühl.

DCCL. *Vitis idea* foliis oblongis non crenatis baccis rubris. *Erica baccifera latifolia*, Tab. lib. 3. fol. 810. Hæc in Pinace C. B. omissa. In der Sarschau.

DCCLI. *Vitis idæa palustris*, C. B. Pin. pag. 471. *Vaccinia palustria*, Dod. Lateinisch/ fol. 770. Lob. ic. pag. 109. o. *Oxycoccum*, Cord. hist. fol. 140. Eystett. *Oxycoccus Valerii Cordi*, Cam. hort. pag. 113. *Oxycoccum*, Cordi, Thal. pag. 83. *Vitis idæa tertia in palustribus*, Clus. hist. lib. 1. fol. 61. *Acinaria palustris*, Gesn. hort. fol. 277. Helvetiis & Boruffis. Roß-Beeren. Hinter Rarschau. Item bey Lauten-Mühl in muscosis & uliginosis.

DCCLII. *Vitis idæa Rorismarini folio*, aversâ parte albido ac nervoso. Joh. Læf. Folia unâ parte virescunt, alterâ albescunt, ac nervò eleganti in duas veluti partes discriminantur. In der Sarschau/ itém bey Schwanis im Gebrüch.

DCCLIII. *Ulmus*, *πτελέα* Diosc. & Theophr. Joh. Læf. Rößtern. Folia, cortex & radix adstringunt, abstergunt, glutinant, & fracturas solidant. Foliis se recens vulnus ad σύμφορσιν duxif-

duxisse scribit Gal. 8. simpl. Ulmi lignum recens à rusticis sæpè fauciatur, ut nodos crescendo contrahat. Hoc paulò post clavæ & lychnuchi locò utuntur iter facientes. In sylvis passim. Præcox foliorum ulmi ac Persicæ decidium pestilitatem jumentis portendit. Ulmum arborem servisse olim censeo horribili illi suppliciorum generi, quod disphendomena vocârunt. Illud ita sumebatur: Arborea procera curvabantur, criminoso in deflexis cacuminibus alligato, quibus repentè laxatis, lacerum corpus in diversa distrahebatur. Hòc suppliciò afficiebatur Bessus, qui Darium interfecerat, perhibente Plutarchò in Alexandro. Membris ita suis plectebatur ab Aureliano Imperatore miles, qui cum hospitis uxore adulterium commiserat, Vopiscò teste.

DCCLIV. Ulmus aut ei similis, cum folliculis, quam aliqui pro Tiliâ mare offerunt, Dod. *Latéinisch*/ fol. 838. Tilia mas, Matth. Bauh. in Matth. fol. 155. Tab. lib. 3. f. 691. Lob. ic. pag. 188. o. *Stein-Linden* Tab. *Wieschen* Nostratibus. Foliis insident folliculi purpurei, oblongi, pisi magnitudine, muscas continentes exiles, quæ apertis iisdem avolant. Insunt & nonnunquam vermiculi teretes, qui Cnipes dicuntur Theophrasto, 2. de hist. Plantar. c. 9. Ex folliculis ulmi, cum bestiolis innatis, additis aliis, sæpiusculè emplastrum paratur, probatissimo experimento ad puerorum hernias. Dixi Cnipes vocari ulmi vermes ex Theophrasto. Aliàs *σύνψ* vel *κύνψ* vermiculus est ligna erodens, quibus erosus subinde locum mutat. Hinc proverbium, *ὁ κύνψ ἐν χάρα*, i. e. Cnips in regione, dicitur in vagabundum, qui sedem crebriùs mutat, & ex locò in locum migrat, velut Horatius, qui vitio huic se obnoxium fuisse fassus est. Trips simili-

similiter Græcis vermiculum denotat, lignis tam exitiosum, quàm Ips cornibus & vitibus. Hinc illud vulgare: κακὰ μὲν θρίπες, κακὰ δὲ ἴπες, i. e. mali thripes, mali ipes. Lignum arboris tenellum adhuc cultello sæpiusculè circa circum sauciant rustici, ut nodos contrahat, quò resectò post clavæ Herculeæ locò utuntur. Ex delibrato cortice Lithvani calceos parant, quos Παράσπην nominant. In sylvis passim.

DCCLV. Urtica fatua sylvestris aculeata, Thal. p. 131. Cannabis spuria facie urticæ, Lob. ic. pag. 527. Planta hæc C. B. Pin. pag. 232. Urtica aculeata foliis non ferratis vocatur, verùm folia ferrata obtinet, quæ à pictore omiſſa, testante Plantinò in iconibus Antverpiæ editis. *Sau-
be wilde Neßel/ oder falscher wilder Hanff.* In arenosis passim.

DCCLVI. Urtica urens maxima, C. B. Pin. pag. 232. Urtica major, Fuchſ. fol. 107. Tab. lib. 2. fol. 234. Lon. deutsch fol. 138. Thal. pag. 131. Urtica, Cord. in Diosc. fol. 69. Urtica urens altera, Dod. Lateinisch fol. 151. Urtica vulgaris urens prima, Trag. Kyber. in Trag. pag. 2. Urtica sylvestris major, Gefn. hort. fol. 287. Urtica sylvestris asperior, sive Urtica communis, sive major, aut Urtica foemina, Lob. ic. pag. 521. *Große Neßel/ Tab. Groß brennend Neßel Lon. Heyter Neßel Fuchſ. Donner Neßel Nostratibus.* Ex hâc elegantissimum ac firmissimum conficitur linteum. Urticâ hâc involutum tabacum, biennium & diutiùs viribus integrum, servant nautæ. Vilius tabacum hoc segestri munitum, colorem acquirit Nicotianæ Brasilianæ. Circa Regiomontum passim, Copiosissimè cre-

scit in alneto Zwischen dem Pilschen-Krug und Bonihn-
feim. Attici urticam vocant ἀνάλιν, herbam nimirum,
cujus contactu cutis prurit. Miror hinc Antigonum, lasci-
vum Juvenem, pro sceptro dextrâ manu pungentes urticas,
& pro aureâ coronâ hederaceam gestasse, & hâc habitu jus
populis dixisse.

DCCLVII. *Urtica urens minor*, C. B. Pin. pag. 232.
Urtica minor, Fuchf. fol. 108. Cord. hist. fol. 109. Tab.
lib. 2. fol. 335. Lon. deutsch fol. 138. Thal. pag. 131. *Urtica*
urens minima, Dod. Lateinisch/ fol. 152. *Urtica minor a-*
crior, Lob. ic. pag. 522. *Urtica tertia*, Trag. Kyber. in
Trag. pag. 1. Bauh. Matth. fol. 790. *Urtica minor*, sive
Cania Plinii acrior, Adv. Lob. fol. 223. Heiter-Nessel/ Tab.
Euter-Nessel/ Lon. Brenn-Nessel Fuchf. Circa loca ha-
bitabilia passim.

DCCLVIII. *Vstilago tritici*. J. L. Weizen-Brand. Hujus
nulla fit mentio apud Bauh. copiosè tamen reperitur, ita,
ut tritico, antequam pistrillæ committitur, aqua sit affun-
denda, pro removendâ ustilagine, quæ paulò pòst superna-
tat agitato tritico. *Urtica fatua sylvestris aculeata* Thal.
Cannabis spuria facie urticæ Lob. ic. *Urtica aculeata foliis*
non ferratis C. B. Pin. Laube wilde stachliche Nessel.

DCCLIX. *Vstilago fecalis*, C. B. Pin. pag. 24. *Vsti-*
lago, Dod. Lateinisch/ fol. 542. Lob. ic. pag. 35. Lon.
deutsch fol. 287. Trag. Kyber. in Trag. pag. 66. *Vstilago*
fecalina, Tab. lib. 1. fol. 683. Rubigo & Robigo Horatio
& Virgilio. Korn-Brandt Tab. Brandt/ Lon. Kyber. in
Trag.

Trag. Pulvisculum Vstilaginis pictoribus elegantem colorem fuscum suppeditare scribit. Tab. Fortè intelligit fuliginem hordei usti, quâ Gemmarii utuntur in parandis tincturis, quæ Adamanti subduntur. Obiter hoc: Hortorum areas, gressibus destinatas, quas sabulo communiter oppleamus, instante hyeme, stramine copiosô si oneraveris, superingesta hybernis frigoribus nix cavebit solidè, ne gramina eo in loco vernô tempore succrescant, quæ aliàs eradicanda, ut libera sit eundi via.

DCCLX. Vstilago hordei, C.B. Pin. pag. 24. Vstilago hordeacea, Tab. lib. I. fol. 684. Vstilago polystichi, Lob. ic. pag. 36. Gersten-Brandt Tab.

DCCLXI. Vstilago avenæ, C.B. Pin. pag. 24. Lob. ic. p. 36. Vstilago avenacea, Tab. lib. I. f. 684. Haber-Brandt Tab. Ex avenaceo vel hordeaceo stramine atramentum, rebus in æs incisis, & exscribendis deserviens: Stramen in minuta concisum, ollæ capaci committitur, eiq; ollar additur, commissuris (ne quid expiret) benè clausis: post in furnum, ubi vasa figulina coqvuntur, congeritur totum, & ustulatur aliquandiu: tandem horridè in fundo nigricans materies cum olivo in marmore Porphyretico teritur, ac usui servatur. Præstantius atramentum eam in rem conficitur ita: Fuligo, quæ in vasculis ligneis conclusa passim apud nos distrahitur, ac Zönnchen-Schwarz salutatur, in ollam figulinam, encausto non pictam, immittitur, orificio exactè clausô. Mox quadrantem horæ, admotis circum circa prunis, exuritur fuligo, ut incandescat. Post calore spontè refrigerato & extincto,

294 PLANTÆ IN PRUSSIA SPONTE NASCENTES.

fuligini ammiscetur vernix benè pura & cocta, ac miscella
in marmore tam diu agitur, donec spissitudinem contrahat.
Coctæ vernici aliquantillum aluminis Arabici si addideris,
chrisma obtinebis splendidius. Sunt, qui ex ebore, succino,
vini tartaro ac facibus, longè elegantissimum
parant atramentum, rebus ex arte
describendis utile.

FINIS.



INDEX

INDEX GERMANICUS.

NB. p. paginam, n. numerum indigitat.

Al.

Wasser Alaron. p. 62. n. 149.
Abbiß/ Anbiß/ Teuffels Ab-
biß. p. 263. n. 686.

Ackerwurz p. 6. n. 10
klein Holtz-Aepffel p. 157.
n. 429.

weiße große Holtz-Aepffel/
Höltschen ibid.

wilde Agley p. 18. n. 46.

Agrimonien p. 71. n. 176.

Alhorn/ vid. Leinbaum.

Alant-Kraut/ Alant-Wurzel
p. 123. n. 338.

schwarz Albeer-Baum p. 205
n. 560.

Alb-Kraut p. 70. n. 174.

Alfranc p. 257. n. 670.

Alhorn/ Alhorn p. 240. n. 638.

Allerman Harnisch p. 105.
n. 277.

Alp-Rutten p. 235. n. 625.

Alphanen-Fuß. p. 225. n. 605.

wasser-Ampfer/ Roß Ampfer

Weyer-Ampfer p. 135. n. 377

klein Weyer-Ampfer ibid.
n. 378.

Saafen-Ampfer / Butter-

Ampfer p. 135. n. 379.

Buch-Ampfer p. 275. n. 716.

Anblatt p. 187. n. 517.

gemeiner weißer Andorn p.
159. n. 430.

Andorn-Weiblein ibid.

schwarzer stinckender An-
dorn ibid. n. 431.

Andorn-Männlein ibid. n. 432

unrauger Wasser-Andorn
p. 160. n. 433.

Wasser oder rauher Andorn.
ibid.

Bruch- oder Wasser-Andorn
ibid.

Wasser-Angelick p. 15. n. 38.

wilde rauhe Angelick p. 16.
n. 39.

S. Antonii Kraut p. 152.
n. 422.

Apostemen-Kraut mit hoch-
blauer Blum p. 229. n. 612.
mit weißer Bluth. ibid. n. 613.

Apostemen-Kraut p. 247.
n. 648.

Geel Aprillen-Blumen p. 219.
n. 592.

weiß Aprillen-Blumen ibid.
n. 593.

Aspen p. 205. n. 561.

Attich oder niedriger Hollun-
der p. 243. n. 639.

Augen-

INDEX GERMANICUS.

Augen=Erst p. 72. n. 177.
 blauer Augen=Erst p. 64.
 n. 153.

brauner Augen=Erst p. 72.
 n. 178.

Augenwurk p. 219. n. 593.
 Augen=Wurk^{el} vid. Baldrian.
 Aurin vid. Laurin.

B.

Bachbungen klein mit länglich-
 ten Blättern p. 14. n. 33.

- - mit Polley = Blättern p.
 14. n. 34.

- - mit kurzen länglichten
 Blättern/ dessen Saam
 in doppelten Schildlein
 p. 15. n. 36.

Bären-Klau / Bären-Zah/
 vid. Bartsch.

Bären-Lapp. p. 169. n. 463.

Baldgreiß vid. Creutzwurk.

Baldrian grosser p. 277. n. 720.

Grichischer Baldrian p. 278.
 n. 721.

kleiner Wasser = Baldrian/
 ibid. n. 722.

Wild oder Katzen=Balsam
 p. 162. n. 438.

S. Barbara Kraut. vid. Ra-
 pungel.

Bartsch p. 262. n. 685.

Barkens-Kraut p. 49. n. 124.

klein/ groß und mittel Ba-
 sillen p. 179. n. 497.

Seidel-Bast p. 139. n. 388.

Wolffs-Bast. ibid.

Bast p. 268. n. 700.

Beinwelle p. 264. n. 689.

Beißerling p. 83. n. 207.

Benedicten = Wurk / Kraut/
 p. 36. n. 96.

Wasser= und Wald = Benedi-
 cten=Wurk^{el} p. 37. n. 97.

Bengel-Kraut p. 163. n. 439.

Berg-Kraut p. 144. n. 401.

wilder Bertram p. 63. n. 150.

Wiesen-Bertram mit zerkerb-
 ten Blättern. ibid.

Besem Kraut vid. Stabwurk.

groß Besem = Kraut p. 130.
 n. 362.

weiß Betonien p. 279. n. 725.

Beyfuß p. 19. n. 47.

Bibenel p. 195. n. 537.

groß Bibenel/ Stein-Bibenel
 ibid.

grosse Welsche Bibenel/ p.
 196. n. 539.

Bieber-Kraut. vid. Tausend
 Gulden-Kraut.

Bieber=Wurk p. 78. n. 193.

Biesem-Kraut p. 220. n. 594.

Bingel oder Bengel-Kraut
 Weiblein p. 162. n. 439.

wild Bingel-Kraut Weiblein
 p. 136. n. 440.

weiß Bilsen-Kraut p. 127.
 n. 353.

groß weiche Binsen p. 130.
 n. 364.

blühende Wasser-Binsen p.
 131. n. 365 glatte

INDEX GERMANICUS.

- glatte Waſer-Binſen p. 131. n. 366.
 ſchlechtköpfichte kleine Cy-
 per-Binſen p. 131. n. 367.
 Binzen-Halm p. 118. n. 321.
 gemeine Birck p. 25. n. 66.
 Hangel-Birck p. 26. n. 67.
 Birckling p. 82. n. 205.
 wilder Birn-Baum p. 211. n. 583.
 Bitterling p. 82. n. 203.
 Bladloß p. 252. n. 686.
 ein Blat mit Zwieblechter
 Wurzel p. 180. n. 501.
 zwey Blatt p. 180. n. 500
 - - mit zwieblechter Wurzel
 p. 181. n. 502
 Süßblatt p. 217. n. 586.
 Blaubeeren. p. 288. 289. n. 748
 Blumen-Kraut p. 187. n. 517.
 groß Blut-Kraut p. 196. n. 539.
 groß Blut-Tröpflein p. 196. n. 539.
 Blut-Kraut p. 28. n. 71. p. 201. n. 552. 553.
 Boßs-Beeren p. 122. n. 334.
 Boßs-Kraut p. 133. n. 371
 Boßs-Bart/geeler breitſteng-
 lichter p. 270. n. 703. p. 271. n. 704.
 Bogen-Holz. vid. Eibenbaum.
 Sau-Bohnen. vid. Biſſenkraut
 Vollen p. 205. n. 560.
 Brand p. 292. n. 758. &c.
 Braunellen p. 208. n. 573.
 groß Waſer-Braun-Wurk.
 vid. Creuk-Reſel.
 Braun-Wurk p. 250. n. 653.
 Brenn-Kraut p. 221. n. 598.
 Brenn-Kraut vid. Welck.
 Brombeeren p. 232. n. 619.
 Bruchwurk p. 71. n. 174. 176
 Bruch-Kraut p. 202. n. 554.
 Brunel mit weißer Blüth. p. 209. n. 573.
 Brunitſchen p. 234. n. 622.
 Bruſt-Kraut p. 39. n. 99.
 rothe Büche oder Buchbaum
 p. 72. n. 179.
 Buch-Aeſchen p. 188. n. 520.
 C.
 Calmus p. 6. n. 10
 Camillen / Chamillen-Blum
 vid. Romey.
 S. Chriſtoffels-Kraut p. 4. n. 7
 wilde Chriſtus-Aeuglein p. 148. n. 409.
 Corallen-Kraut vid. Spargen
 wilde Corinthen. p. 122. n. 335.
 Corneel-Baum p. 55. n. 139.
 Creuk-Blum/blau/braun und
 weiß p. 182. n. 505. p. 200. n. 549.
 Creuk-Holz / Creuk-Beer
 p. 230. n. 615.
 Creukwurk / Creuk-Kraut p. 101. n. 267. p. 252. n. 658.
 wald-Cypreß p. 170. n. 464.
 D.
 Dagget p. 27. n. 67.
 Degenz

INDEX GERMANICUS.

Degen-Kraut p. 260. n. 681.
großer Dennmarck vid. **Balsdrian**.
krotten-Dill **Hunds-Dill** vid. **Hunds-Romey**.
Ruh-Dill p. 45. n. 117.
Ucker-Diestel **Haber-Diestel** p. 34. n. 90. breitblätterig
Speer-Diestel p. 34. n. 91. vielstachlichte **Ucker-Diestel** mit schmalen Blättern / p. 34. n. 92. **Weg-Diestel** p. 216. n. 684. **Dreum-Diestel** **drey-Diestel** p. 50. n. 127. **Fliegen-Diestel** **Müßcken-Diestel** p. 22. n. 55. **groß Garten-Diestel** **braun Karten-Diestel** p. 62. n. 148. **Säu-Diestel** mit breiten und schmalen zerschnittenen Blättern p. 257. 258. n. 672. 673. mit spizigen und absätzigen Blättern / i-bid. n. 675. **Vieltstachlichte Wiesen-Diestel** mit schmalen Blättern p. 35. n. 93.
Doll-Kraut vid. **Bilsen-Kraut**.
Doll-Wurk p. 257. n. 671.
Dorn **Sommer-Dorn** p. 61. n. 145. **Marien-Dorn** p. 232. n. 618. **Weg-Dorn** **Beer** p. 230. n. 615. **schmaler weidenblättriger Stech-Dorn** p. 230. n. 616.

Stech-Dorn der ander p. 231. n. 616. **Purgierende Stech-Dorn** oder **Creutz-Beer** p. 230. n. 615.
Dort p. 121. n. 331.
Dosen-Kraut **Alb-Kraut** p. 70. n. 174.
Dost **Wirbel-Dost** p. 50. n. 126. **Waser-Dost** p. 70. n. 174. **weiß Waser-Dost** p. 71. n. 175. **gemein Dost** p. 185. n. 512. **brauner und weißer Feld-Dost** p. 185. n. 512. p. 186. n. 513.
Dotter / vid. **Lein-Dotter**.
Dotter-Blum / vid. **Ruh-Blum**.
Drachen-Wurk p. 6. n. 10. p. 62. n. 149.
Drespe p. 121. n. 331.
Druckel-Beeren p. 288. n. 747.
Drüß-Wurk p. 222. n. 598.
Dreyfaltigkeit-Blum p. 286. n. 741.
Dürr-Wurk / **scharffe** / **blaue** / p. 52. n. 134. **Waser-Dürr-Wurk** mit zerschnittenen Blättern p. 53. n. 135. **Dürr-Wurk** mit **Kugel-runder Blüth**. item **kleine Dürr-Wurk** i-bid. **Waser Dürr-Wurk** mit tieff und schlecht zerschnittenen Blättern p. 54. n. 127. 128.
Dürr-

INDEX GERMANICUS:

Dürr-Kraut p. 202. n. 554.
Durchwachs/ gelb. p. 29. n. 73.
Durchwachs-Männlein/ p.
180. n. 500.

2

Eber-Wurz p. 35. n. 94.
Egel-Kraut/ groß und klein
p. 177. n. 492.
Ehren-Preis p. 282. n. 730.
Eiben-Baum p. 266. n. 693.
Eiche/ Eich-Baum p. 211.
n. 584.

Erd-Eiche/ Erd-Eichel p. 73.
n. 187.

Meer oder See-Eiche mit
Blasen p. 216. n. 585.

Eichen-Lung p. 172. n. 473.

Ein-Beer p. 257. n. 671.

Ein-Blatt p. 141. n. 396. mit
Zwieblechter Wurzel p.
180. n. 501.

Eisenhart/ Eisen-Kraut/ Ei-
serich p. 5. n. 8. p. 281. n. 729.

Eisen-Kraut p. 69. n. 171.
vid. Creutz-Wurz.

Elisabeth-Kraut p. 43. n. 113.

Endten-Flott p. 139. n. 389.

Ehren-Baum p. 10. n. 19.

Engel-Blümlein/ weiß und
braune p. 107. n. 280.

Engelsüß p. 204. n. 559.

Berg-Eppich/ Berg-Peter-
lein p. 18. n. 45.

Wasser-Eppich/ Wasser-Epff
Wasser-Peterlein p. 223.
n. 600. p. 255. n. 667.

dreyspiziger Wasser-Eppich
p. 139. n. 390.

Grosch-Eppich p. 255. n. 667.

Seig-Blätter-Eppich p. 223.
n. 600.

Wasser-Epheu p. 139. n. 390.

kleiner Baum- und Wald-

Epheu p. 122. n. 336. Erd-

Epheu p. 123. n. 337.

Erdbeer-Kraut/ gemein und
weit kriechend p. 75. n. 188.

189.

Erd-Gall. vid. Tausendgül-
den-Kraut.

Erd-Rauch p. 77. n. 192. mit
runder hohler und dichter

Wurzel p. 78. n. 193. 194.

Erd-Schmeer. p. 91. n. 235.

Erd-Spinnen-Kraut ohne
Ast/ p. 193. n. 533.

Ermenwürger p. 186. n. 515.

Esch-Baum/ Eschern-Holz/
Stein-Eschern p. 76. n. 190.

Esels-Huff/ vid. Huff-Lattich
Espin p. 205. n. 561.

Eyer-Blum p. 61. n. 145.

3.

Farb-Kraut/ gelb p. 101. n.
266.

Farn-Kraut p. 73. n. 182.
großästiges ohngezähntes

Farn-Kraut/ p. 74. n. 183.

kleinästiges/gezähntes Farn-
Kraut ibid. n. 184. gezähn-

tes
Pp

INDEX GERMANICUS.

- tes Waſer = Farn = Kraut
 ibid. p. 185. Baum = Farn /
 p. 204. n. 559.
- Faul-Baum / Hüſner-Augen /
 p. 11. n. 20. p. 42. n. 111.
- Feder = Nägelchen p. 40. n. 105.
- Feigwarzen = Kraut p. 250. n.
 653. vid. Gefel = Blum.
- Feld = Kümme / groß / klein und
 kriechender p. 253. n. 659.
 660. 661.
- Fenchel / Waſer = Fenchel / p.
 165. 166. n. 443. 446. 448.
- Ferber = Blumen p. 101. n. 266.
- Fichten / wilder Fichten-Baum
 p. 196. n. 540.
- Fieber = Kraut / vid. Tauſend =
 Gilden = Kraut p. 165. n. 425
- Filz = Kraut / p. 59. n. 141.
- Fingerhutt / geel / p. 61. n. 147.
- Fünff Finger = Kraut / p. 217.
 n. 587.
- Fiſch = Molde. p. 28. n. 70.
- Flachs = Seide / Flachs = Dot-
 ter / p. 59. n. 141. Matten =
 Flachs / Wiefen = Flachs / p.
 114. n. 307. wilder Flachs / un-
 ſer Frauen Flachs / Kröten =
 Flachs / p. 142. n. 397. p.
 112. n. 300.
- Flederöhrchen / p. 92. n. 236.
- Fliegen = Blumen p. 181. n. 503
- Floſten = Blum / groß / ſchwarz /
 mit ſchuppichten Köpfen / p.
 128. n. 355. mit weißer
 Blüth ibid. n. 336. mit zer-
- ſchnittenen Blättern und
 ſchuppichten Köpfen p. 129.
 n. 357. breitblättrige Floſ-
 ten = Blum mit haarichten
 Köpfen ibid. n. 358. weiß =
 blühende Floſten = Blum mit
 haarichten Köpfen. ibidem
 n. 359.
- Flöh = Kraut / p. 53. n. 136.
 ſcharff / gelind / klein Flöh =
 Kraut = Männlein und Weib-
 lein / p. 191. 192. n. 528.
 530.
- Foh = Wein / Fohzwang / vid.
 Wolffs = Bohnen.
- unſer Frauen Mantel vid.
 Sinnau.
- unſer Frauen Schüßlein / p.
 145. n. 402.
- unſer Frauen Flachſ p. 142.
 n. 397.
- Frembde Sorge / p. 286. n. 741.
- Freyſam = Kraut / p. 187. n.
 517. p. 286. n. 741.
- Froſch = Biß. p. 179. n. 496.
 G.
- Galeiſe. p. 101. n. 266.
- Gänſe = Blum p. 31. n. 81.
 große Gänſe = Blum / p. 24.
 n. 61.
- Gänſerich / kriechender Gän-
 ſerich mit raugen grauen
 Blättern p. 207. n. 570.
 großer gerader Gränſing
 mit raugen grauen Blättern
 p. 207. n. 571.
- Gänſ

INDEX GERMANICUS.

- Gänse-Fuß p. 23. n. 58.
 Gänse-Kraut p. 207. n. 569.
 Gänssichen p. 86. n. 221.
 Garb/ Wasser-Garb / oder
 Wasser-Violen mit nackten
 Stengeln p. 166. n. 448.
 groß Garben/ groß Garben-
 Kraut p. 164. n. 442. Feld-
 Garb/ weiße Garb. ibid.
 Wasser-Garb mit geelen
 Blümlein p. 165. n. 444.
 Knotichte mit kleinen weißen
 Blümlein ibid. n. 445. Sa-
 demblättrige Garb ibid. n.
 446. Feder-Wasser-Garb
 ibid. n. 447.
 Gasen-Wurk p. 135. n. 379.
 Gauch-Blum p. 41. n. 108.
 Gauch-Brodt vid. Bocksbart
 Gauchheil p. 14. n. 32. vid.
 Wolffs-Bohnen.
 Gauch-Haber p. 73. n. 180.
 Geelöhrchen p. 81. n. 200.
 Hoß-Geelöhrchen p. 90. n.
 233.
 Geiß-Bart p. 23. n. 60.
 Geiß-Fuß p. 16. n. 40.
 Genst/ Fenster p. 101. n. 266.
 Geleack-Wurk p. 200. n. 550.
 Gention (klein) p. 101. n. 267.
 S. Georgen-Wurk p. 187.
 n. 517.
 Gertlein/ Gertel/ Gertwurk/
 p. 170. n. 464.
 Germal p. 164. n. 442.
 Gerstenthwalsch vid. Gauch-
 Haber.
 Gersten-Brand p. 293. n. 760.
 Gessel-Blum p. 46. n. 119.
 Gicht-Beeren p. 122. n. 334.
 Gicht-Kraut p. 105. n. 276.
 vid. Simmels-Schlüssel.
 Giersch/ Hund-Giersch p. 16.
 n. 39. 40.
 Gil-Blum p. 101. n. 266.
 Glattling p. 83. n. 206.
 Glieder-Kraut p. 160. n. 433.
 Glied-Kraut p. 149. n. 411.
 p. 254. n. 664.
 Gliedweich p. 149. n. 411.
 Glocken-Blum/ blau und weiß
 p. 33. n. 87. 88. p. 225. n.
 605. Wind-Glocken/ Zaun-
 Glocken p. 51. n. 131.
 Wald-Glocklein p. 61. n.
 147. klein Glocklein p. 230.
 n. 614. blaue Glocken ibid.
 Gold-Blum mit Rheinsfahr-
 Blätter p. 47. n. 120.
 Goldwiesen-Blum/ vid. Ruh-
 Blum.
 Goldwurk p. 141. n. 394. vid.
 Schin-Kraut.
 Gotts-Bartlein p. 196. n. 539.
 Gottes Gnad p. 105. n. 276.
 Gottheil p. 208. n. 573.
 Gottes-Bergeß p. 159. n. 430.
 Grähnen-Holz/ vid. Thanne.
 Gränsing vid. Genserich.
 Gras / 49-tigerley. Besiehe
 nach

INDEX GERMANICUS.

- nach der Ordnung von p.
 107. bis 121. von n. 284.
 bis 332.
- Gried/ Berg-Griedt p. 118.
 n. 321.
- Grind-Kraut vid. Creutz-
 Wurz. Schaff = Grind-
 Kraut p. 229. n. 612. 613.
- Grind-Magen p. 188. n. 525
- Grind-Wurk/ dessen Blätter
 eine Elle lang p. 135. n. 377.
 Klein Wasser = Grindwurk
 p. 135. n. 378. Grindwurk
 mit hohlen rundlechten Blät-
 tern p. 135. n. 379. Grind-
 wurk mit spizen krausen
 Blättern p. 135. n. 380.
- Grinsing p. 207. n. 569.
- Grüßling p. 86. n. 220.
- Grundheil vid. Ehrenpreis.
- Grünfig p. 207. n. 569.
- Guckguck-Blum p. 41. n. 108.
- Günkel; Gilden Günkel p.
 50. n. 128. blau Gilden-
 Günkel ibid. roth Gilden-
 Günkel ibid. n. 129. roth
 Günkel vid. Tormentil.
- Gundreb/ Gundelreb p. 123.
 n. 337.
- Gürtel-Kraut p. 169. n. 463.
- S.
- Haar-Schaar und Teuffels-
 Klauen. p. 169. n. 463.
- Haarstrang p. 178. n. 493.
- Haarwurk ibid. (Diestel.
- Haber = Diestel vid. Acker-
- Haber-Graß p. 73. n. 180.
- Gauch = Haber / Mauf-
 Haber/ Taub-Haber p. 73.
 n. 180.
- Haberbrandt p. 293. n. 767.
- Habicht-Kraut (klein) mit
 Wegwarten = Blättern p.
 124. n. 343. unrauhes Ha-
 bicht-Kraut mit Wegwart-
 Blättern ibid. n. 344. wild-
 Habicht-Kraut p. 125. n.
 345. rauhes Habicht-Kraut
 mit breiten Blättern und
 großer Blüth ibid. Berg-
 Habicht-Kraut mit breiten
 unzerschnittenen Blättern p.
 125. 346. Aftiges Berg-
 Habicht-Kraut mit rauhen
 Blättern p. 125. n. 347. Klein
 Berg = Habicht-Kraut mit
 breiten unraugen Blättern
 p. 126. n. 348. Großstaudi-
 ges Habicht = Kraut mit
 schmalen Blättern p. 126.
 n. 349. Habicht-Kraut mit
 Pfaffen = Dehrelins Blät-
 tern p. 126. n. 350. Weg-
 warten-Habicht = Kraut i-
 bid. Habicht = Kraut mit
 langlechten und am Rande
 stachlichten Blättern p. 126.
 127. n. 351.
- Händchen p. 49. n. 264.
- Handel-Kraut/ Hüner-Nau-
 ten p. 13. n. 26. Wasser-
 händ-

INDEX GERMANICUS:

händleins= Wurk mit glat-
ten schmalen Blättern p. 181.
n. 504. Händleins= Wurk
p. 182. n. 505. gesprengte
Händleins= Wurkel ibid.
mit gehelinter lichtgrüner
Blüth n. 506. umbgekehrt
mit weißer Blüth ibid. n. 507
Hänlein / Wasser= Hänlein/
Fluß= Hänlein p. 223. n.
601. gelb und weiß Wald=
Hänlein p. 219. n. 592. 593.
Hagedorn p. 163. n. 441.
Hahnen= Bein/ p. 110. n. 289.
Hahnen= Fuß/ Biesem= Hanen=
Fuß p. 220. n. 594. rauger
Wald= Hanen= Fuß mit Be-
nedicten= Wurk Blättern/
p. 220. n. 595. scharffer/
wilder/ gelber Acker= und
Wiesen= Hahnen= Fuß p.
221. n. 596. kriechender
Wiesen= Hanenfuß/ Wein=
gart= Hahnen= Fuß ibid. n.
597. Rüben= Hahnen= Fuß/
p. 222. n. 598. ungefüllter
Garten= Hahnen= Fuß. Ak-
ker= Hahnen= Fuß mit stach-
lichten Köpfen p. 222. n.
599. Blatter Eppich= blät-
triger Wasser= Hahnenfuß/
p. 222. n. 600. groß lang
Wasser= oder Speer= Hah-
nen= Fuß p. 223. n. 603.
langer Wasser= Hahnen=

Fuß p. 224. n. 604. Hah-
nen= Fuß mit Wolffswurk=
hafftigen Blättern/ da ein
rundes Blat an der Wur-
kel sitzt p. 225. n. 605.

Hahn=Hödlein p. 70. n. 173
Hahnen=Kamm/ p. 190. n. 525.
Hahnen=Kamp/ p. 54. n. 157.
Hahnen=Köpff p. 179. n. 498.
Hackel=Kraut/ p. 209. n. 575.
Hanbuttten oder Han= Rosen
p. 232. n. 618. wilde fleisch-
farbe riechende Hanbuttten
oder Feld= Rosen/ p. 131.
n. 618.

Handschuh= Blumen vid Him-
mels= Schlüssel

Hals=Kraut/ gemein Nessel=
blättericht scharffes Hals=
Kraut p. 32. n. 84. Nessel=
blättericht Hals=Kraut mit
weißser Blüth p. 33. n. 85.
klein Hals=Kraut mit deicht-
aneinander gesetzten Blu-
men p. 33. n. 86. (n. 89.
Hanff/ wilder Hanff p. 33.
Harn=Kraut p. 202. n. 554.
Groß Harn=Kraut p. 142.
n. 397. Meer=Harn=Kraut
mit wolriechenden Blumen
p. 192. n. 398.

Hark= Baum p. 196. n. 540.
HartDiegel p. 55. n. 39.
Hasel= Nuß/ Hasel= Baum/ Ha-
sel= Strauch p. 55. n. 140.

Gees

INDEX GERMANICUS.

- Geele Haafel = Blumen / p. 219. n. 592.
 Hasel = Wurz p. 19. n. 49.
 Hasen = Flug vid. Benedicte = Wurz.
 Hasen = Brodt / Hasen = Oehrlein p. 112. n. 300. p. 92. n. 240.
 Hasen = Fuß p. 274. n. 714.
 Hasen = Pfötlein p. 107. n. 280. p. 273. n. 710.
 Hasen = Graß p. 112. n. 300.
 Hasen = Kohl / vid. Kohl.
 Hasen = Klee p. 273. n. 716.
 Häubüchen oder Haynbüchen p. 188. n. 520.
 Haugenblum vid. Romey.
 Hauhechel / braun / mit und ohne Stengel / p. 17. n. 41. 42.
 Hauf = Lauch / Haufwurz / groß und klein p. 251. 252. n. 655. 656.
 Hederich p. 69. n. 171. Hederich oder Heiden = Retrich / p. 228. n. 610. Wasser = Hederich p. 227. n. 609.
 Heer = Moß / vid. Moß.
 Heidelbeer p. 288. n. 748.
 Heiden p. 67. n. 163. schmalblättrige Heide mit schwarzen Beeren p. 67. n. 164.
 Heinrich / stolzer guter Heinrich / p. 136. n. 381.
 Heid = Nägelein / vid. Nägelein.
 Heidnisch Wund = Kraut / vid. Wund = Kraut.
 Heil aller Schaden p. 102. n. 277.
 Heil aller Welt vid. Benedicte = Wurz.
 Heiblät p. 267. n. 695.
 Heil = Kraut / gülden Heil = Kraut p. 43. n. 113.
 Helm = Kraut / Wasser = Helm = Kraut p. 165. n. 444.
 Hendel = Kraut / vid. Sändel = Kraut.
 Herbsfilig p. 82. n. 204.
 Herk = Freude / vid. Meeske.
 Herk = Gespan p. 159. n. 432.
 Herkgesperr und Herk = Kraut. ibid.
 Heyd / vid. Heid.
 Heydecker / vid. Tormentill.
 Heydenschmuck p. 101. n. 266.
 Heydnische Blumen p. 141. n. 394.
 Himmels = Brand / vid. Weld.
 Himmels = Schlüssel / p. 279. n. 725.
 Hindbeeren p. 233. 234. n. 621.
 Hirnschaal / p. 188. n. 521.
 Hirsch = Milde / p. 23. n. 59.
 Hirsch = Brunst / p. 95. n. 250.
 Hirsch = Kraut / p. 78. n. 139. vid. Alffranden.
 Hirsch = Wund = Kraut p. 70. n. 174.
 Hirsch = Wurz / p. 254. n. 663.
 Hirse / Wald = Hirse / p. 161. n. 435. Meer = Hirse / erhaben

INDEX GERMANICUS.

- bene groſſe Meer-Hirſe/ p.
 142. n. 399. kleine Meer-
 Hirſe p. 143. Acker-Meer-
 Hirſe p. 143. n. 403. wilde
 ibid. braunechte Wald-Hir-
 ſe p. 160. n. 434. breitblät-
 trige gelbe Wald-Hirſe ibid.
 Hirten-Taſch/ Hirten-ſeckel/
 vid. Taſchel-Kraut.
 Hödlein/ Fuchs-Hödlein/ p.
 181. n. 503. Einhödlein-
 Wurk mit lichtgrüner
 Blüth/ p. 184. n. 510.
 Hochmuth und Muthwillen
 p. 40. n. 105.
 Hollunder/ Holder/ Holder-
 Baum/ p. 240. n. 638.
 Waſſer-Hollunder mit
 ſchlechter Blüth p. 243. n.
 640.
 Hollwurk/ kleinſte Hollwurk
 p. 220. n. 554. runde/ feſte/
 gemeine Hollwurk p. 78.
 n. 193. 194.
 Holzkäſen p. 157. n. 429.
 Holz-Aepffel ibid.
 Holz-Birn/ vid. Kruſchken/
 p. 211. n. 583.
 Hopffen/wilder Hopffen p. 273
 n. 710. fruchtbahrer/zahmer
 Hopffen p. 146. n. 405.
 unfruchtbahrer Hopffen p.
 147. n. 406. Hopffen-Kühn
 p. 147. n. 405.
 Huſſ-Lattich vid. Lattich.
 Hühner-Augen vid. Saulbaum.
 p. 11. n. 20.
 Hühner-Biß/ vid. Meyer. Hüh-
 ner-Biß mit Bündelreß
 Blättern p. 135. n. 376.
 Hühnerdarm mit Ehrenpreis
 Blättern p. 13. n. 27. mit
 Epheu-Blättern p. 13. n.
 28. mit Gamanderlein Blät-
 tern p. 13. n. 30. Meer-Hüh-
 nerdarm p. 12. n. 22.
 Hühner-Füll vid. Pfefferkraut
 Hühner-Kauten vid. Sändel-
 Kraut.
 Hunds-Aug. p. 45. n. 117. p.
 53. n. 136.
 Hunds-Blum p. 61. n. 145.
 Hunds-Graß p. 127. n. 352.
 Hunds-Milch/ vid. Wolffe-
 Milch.
 Hunds-Romey/ p. 44. n. 116.
 Hunds-Kirſchen p. 42. n. 112.
 Hundswürgel p. 203. n. 556.
 Hunds-Violen p. 285. n. 740.
 Hunds-Zahn/ p. 127. n. 352.
 Hunds-Zung/ kleine/ auch
 groſſe gemeine mit Blumen/
 p. 60. n. 143. p. 64. n. 153.
 J.
 S. Jacobs-Blum/ S. Jacobs
 Kraut p. 129. n. 360. mit
 Winter-Kreß-Blättern/
 ibid. n. 361.
 Je länger je lieber p. 257. n.
 670.
 Igels-

INDEX GERMANICUS.

Igels-Knospen p. 260. n. 681.
 Immer-Grün/ p. 251. n. 655
 S. Johannes-Blum p. 24. n.
 61.
 S. Johannes-Kraut/ p. 128.
 n. 354.
 S. Johannis/ zahme/ wilde
 und schwarze Beerlein/
 Träublein p. 121. 122. n.
 333. 334. 335.
 Johannis-Würmlein p. 203.
 n. 556.
 Isen-Kraut vid. Eysenhart.
 Isopp. Berg-Isopp oder Hei-
 den p. 43. n. 113 wilder Is-
 sop/ Kirch-Isop/ Kalbs-Is-
 sop/ Zwiebel-Isop. p. 245.
 n. 643.
 Jungfrau/verfluchte Jungfrau
 p. 48. n. 121.
 Jungfer-Tritt. p. 201. n. 552.
 Jungfer-Gras p. 202. n. 554.
 Jungfrauen-Haar. p. 7. n. 11.
K.
 Kälberkropff / Kälber-Korn/
 p. 175. n. 486.
 Karten-Diestel/ p. 62. n. 148.
 Kaninchen-Baum/ vid. Was-
 ser- HOLLUNDER.
 Ratten-Poten/ p. 65. n. 155.
 Rattich/ p. 132. n. 368.
 Raken-Käfschen/ p. 157. n. 428.
 Raken-Klee/ p. 273. n. 710.
 Raken-Münch/ p. 162. n. 437.
 Raken-Kraut/ zahm. p. 162.
 n. 437.

Raken-Körbel-Kraut/ p. 77.
 n. 192.
 Raken-Leiterlein/ p. 169. n. 463
 Raken-Alpt/ p. 162. n. 437.
 Rakenschwanz / klein und
 groß p. 65. n. 157. p. 274.
 n. 714.
 Rakenwädel/ p. 65. n. 158.
 Rakenträublein/ p. 252. n. 656
 Rakenwürzel/ vid. Baldrian.
 Kellers-Hals p. 139. n. 388.
 Kellerwurk/ p. 178. n. 493.
 Kerz/ Unholden-Kerz/ Feld-
 Kerz/ vid. Welck.
 Keulwurk/ p. 178. n. 493.
 Kien-Holz/ Kiefer-Holz p.
 196. n. 540.
 Kirschen/ Ahl-Kirschen/ vid.
 Faulbaum. Hunds-Kir-
 schen/ Teuffels-Kirschen/ p.
 42. n. 112. schwarze Teuf-
 fels-Kirschen.
 Klapper/ p. 190. n. 525.
 Klee-Kraut/ p. 17. n. 43.
 Klee-Blume/ p. 145. n. 402.
 Buch = Klee/ ibid. Herk-
 Klee Hirk-Günstel/ Herk-
 Bund = Kraut. p. 70. n.
 174. Geeler Haasen =
 Klee. p. 144. n. 401.
 kleine unrauge fünfblätteri-
 ge gelbe Schoten = Klee/ p.
 145. n. 402. Horn = Klee/
 Honig = Klee ibid. wilder/
 gemeiner oder grosser/ item
 geeler

INDEX GERMANICUS.

geeler Stein-Klee. p. 161.
 n. 436. braun Wiesen-Klee
 p. 272. n. 707. weiße Wiesen-Klee
 ibid. n. 708. geeler Wiesen-Klee
 ibid. n. 709. weißer spitziger Berg-Klee/ p.
 273. n. 711. Groß brauner Berg-Klee/ p.
 273. n. 712. großer Weiß-Klee p. 273. n.
 713. Bieber-Klee p. 272. n. 706
 Spitz-Klee p. 272. n. 708. Feld-Klee
 ibid. n. 709. Rachen-Klee p. 273. n.
 710. 714. Hasen-Klee p. 274. n. 714.
 716. grosser Stein-Klee p. 274. n. 715.
 Guckguck-Klee p. 275. n. 716.
 Buch-Klee/ Saur-Klee ibid. Guld-
 en-Klee/ Hirsch-Klee p. 275. n. 717.
 Klette/ grosse Klette mit weissen
 Blumen p. 137. n. 383. mit Purpurfar-
 ben Blumen p. 136. n. 382. kleine Klette
 p. 137. n. 384. Igels-Kletten ibid.
 Leber-Kletten p. 71. n. 176. Bürenkletten
 p. 136. n. 382. Ross-Kletten ibid.
 Kletten-Kraut p. 60. n. 144.
 Knabenwurz / wilde / item dunkle
 mißgebürtige Knabenwurz p. 184.
 n. 511. Anavel/ Anawelp. p. 203. n. 556
 Knoblauch/ Knoblauch-Kraut
 Wald-Knoblauch/ Hundes-

Knoblauch / Acker-Knoblauch p. 8. n. 15. 16. Berg-Knoblauch
 mit Purpurfarber Blüth p. 9. n. 17. Berg-Knoblauch
 mit runden Purpur-farben Köpflein
 p. 9. n. 17. Lacken-Knoblauch/ Wasser-Knoblauch
 p. 248. n. 650.
 Kolben/ Narrenkolben/ See-Kolben/
 Moskolben/ Deistkolben/ p. 277. n. 719.
 Köblesskraut/ groß p. 196. n. 539
 Königs-Blum. p. 5. n. 8. Königs-
 Braut p. 71. n. 176. Königs-
 kerze vid. Welsch. Kohl/ Acker-Kohl
 mit bleichgelben Blumen p. 228. n. 610.
 Hasen-Kohl p. 258. n. 674. Ruckucks-
 Kohl p. 275. n. 716.
 Körbel/ wilder Körbel p. 175. n. 486.
 mit scharffem Saamen p. 175. n. 487. so keinen
 Geruch hat. ibid. Korn/ Kälberkorn
 p. 175. n. 486. Taub-Korn p. 121. n. 331.
 groß Taufendkorn p. 202. n. 554.
 Korn-Blum/ p. 60. n. 142. Korn-
 Brand p. 293. n. 759. Korn-Münz/ p. 31.
 n. 82. Kozelar / schwarz und weiß/ p. 84.
 n. 210. Arden-Beeren p. 67. n. 164.

INDEX GERMANICUS.

- Kramot-Baum** vid. **Wachol-**
der.
Kranich = **Schnabel** vid.
Storch-Schnabel.
Kraquelbeeren/ blaue p. 233.
n. 620.
Kref/ Meer-Krefe p. 60. n. 107
wilde Kref p. 130. n. 362.
Brun-Kref/ Wasser-Kref
die erste und andere p. 176.
n. 489. 490. **Wiesen-Kref**
mit großer Blüth ibid. **wil-**
de Kref mit ganz kleinē zer-
theilten Blättern ibid.
Krostincken/ oder Kerstienken-
Kraut p. 53. n. 136.
Kreuz-Beer vid. **Kreuzbeer.**
Krottenstiel/ groß und klein/
p. 93. n. 242. 243.
Kröten-Gras p. 115. n. 312.
Kruschken p. 211. n. 583.
Küchern/ braunrothe frühzeiti-
tige Wald-Küchern p. 187.
n. 518. **Würfelsaamichte**
Küchern mit Wicken-Blät-
tern ibid. **wilde Küchern/**
p. 138. n. 385.
Küh-Blum p. 32. n. 83.
Kuhmilden p. 85 n. 217.
Kuchen-Schellen p. 209. n.
575.
Kürbeeren p. 55. n. 139.
Kürbs/ Hundes-Kürbs p. 29.
n. 75.
Kühwurz/ Küh-Kraut p.
163. n. 439.
Kunigund Kraut **Weible** / p.
54. n. 128.
L.
Lab-Kraut vid. **Meyer-**
Kraut.
Läuse/ Bettlers-Läuse p. 137.
n. 384. **Buben-Läuse/ Igels-**
Läuse. ibid.
Läuse-Kraut p. 139. n. 388.
geel Läuse-Kraut p. 190. n.
525. **Läuse-Kraut mit Pur-**
purfarben-Blumen ibid. n.
526. **braun Läuse-Kraut/**
braun Wiesen-Läuse-Kraut
ibid. mit weissen Blumen
p. 191. n. 527.
Lahle p. 83. n. 207.
Lakarike. p. 106. n. 279.
Lattich/ Weg-Lattich/ Wiesen-
Lattich/ Hunds-Lattich p.
61. n. 145. **Butter-Lattich**
p. 135. n. 379. **Huff-Lattich**
p. 276. n. 718. **Brand-Lats-**
tich ibid. **Brandlehschen**
ibid. kleiner Brunn- oder
Frosch-Lattich p. 206. n.
566. **Lämmer-Lattich** p. 278
n. 723.
Lauch/ Ziegen-Lauch/ p. 186.
n. 514.
Lauchel/vid. Knoblauch-Kraut
Laurin/ Aurin/ vid. Tausend-
Gulden-Kraut.
Leber-Blumen/ weisse/ p. 108.
n. 284. **braune/** p. 196. n. 539
Leber-

INDEX GERMANICUS:

Leber-Klätten/ vid. Kletten.
 Leber-Kraut/ p. 140. n. 393.
 Stein-Leber-Kraut/ braun
 Leber-Kraut/ ibid. Stein-
 Leber-Kraut vid. Meeske.
 blau Gilden Leber-Kraut/
 Edel Leber-Kraut p. 275.
 n. 717.
 Lein-Baum p. 3. n. 4.
 Leindotter mit langen Schoten
 p. 174. n. 483. rauger Lein-
 dotter mit runden Schoten
 lein p. 175. n. 485.
 Lein- und Harn-Kraut p. 142.
 n. 397.
 Lerchen-Klau p. 51. n. 130
 Liebstock/ wilder p. 49. n. 124.
 Lilgen/ Lilien/ groß Lilgen. p.
 193. n. 533. bleichrothe pun-
 ctirte wilde Lilien/ p. 141. n.
 394. Berg-Lilien/ heidnische
 Lilien ibid. Wasser-Lilien/
 p. 178. n. 493.
 Lilgen-Convalgen. vid. May-
 en-Blümlein.
 Linde/ Linden-Baum p. 268.
 n. 700. Stein-Linden p.
 260. n. 754.
 Linsen/ Wasser-Linsen/ p. 139.
 n. 389. Meer-Linsen ibid.
 Sichel-Linsen p. 251. n. 654
 groß kriechende Linsen p. 274
 n. 715.
 Linsen-Kraut/ klein kriechend
 Linsen-Kraut mit viereck-

richter Frucht p. 139. n. 391
 schmalblättricht und zer-
 schnittenes p. 140. n. 392.
 Löwen-Fuß/ vid. Sinnau.
 Löwen-Zahn p. 61. n. 145.
 Lob-Kraut/ p. 100. n. 265.
 Löffel-Kraut/ Frosch-Löffel-
 Kraut/ p. 199. n. 547.
 Lorbeeren/ Scheiß-Lorbeeren
 p. 139. n. 388.
 Lulich/ Loldch p. 121. n. 331.
 Lungen-Blumen p. 102. n. 268
 Lungen-Kraut p. 172. n. 473.
 Lungen-Moos mit dunkeln
 Wurkeln p. 172. n. 474.

117.

Madelgeer vid. Modelgeer.
 Mähl-Baum p. 163. n. 441
 Magd-Blum vid. Romey.
 Magsahnen/ Feld-Magsaa-
 men p. 188. n. 521.
 Mälde/ Hirsch-Mälde/ p. 23.
 n. 59.
 Mangolt/ Hirsch-Mangolt/
 p. 265. n. 690. Holtz-Man-
 golt p. 210. n. 577. Wald-
 Mangolt p. 210. n. 577.
 wilder Mangolt p. 135. n.
 n. 379. Wiesen-Mangolt.
 Mans- Treue/ Meer oder
 Sees-Mans- Treue p. 69.
 n. 170.

Margendrehen p. 184. n. 511.
 Margen-Gras p. 111. n. 297.

INDEX GERMANICUS.

Margen-Röflein roth/ und
wild p. 148. 149. n. 409.
411.

Marien-Gras p. 111. n. 297.

Marien-Röflein/ flebrichte
weiße mit Ohrlöffel-Kraut
Blättern p. 150. n. 414.

Marien-Nessel p. 162. n. 437.

Maßholder vid. Leinbaum.

Maßlieben/ große und kleine
Maßlieben p. 24. n. 61. 62.

Große gelbe Maßlieben p.
25. n. 63. große gelbe Maß-
lieben mit tieff zerschnitte-
nen Blättern p. 25. n. 63.

Matten-Flachs p. 114. n. 307.

Maur-Nägelein p. 39. n. 104.

Mäuf-Dehrlein p. 107. n. 280
blaue Mäuf-Dehrlein p. 63
n. 151. blaue Wasser-Mäuf-
Dehrlein p. 64. n. 153. groß

gerades Mäuf-Dehrlein p.
193. n. 534. kriechendes/
rauges/ kleines p. 193. n. 535
536. weiße Acker-Mäuf-
Dehrlein p. 63. n. 152.

Mäuf-Dehrchen p. 92. n. 239.

Mäuf-Schwänklein p. 127.
n. 352.

Mayholz p. 238. n. 630.

Medesüß/ Med-Kraut p. 23.
n. 60.

Meer-Fadem/ Meerstrang/
p. 75. n. 186.

Meer-Gras p. 7. n. 14. rund-

blättriges und in der Spitz
zweyspaltiges Meer-Gras
p. 77. n. 191.

Meer-Harn-Kraut vid.
Harn-Kraut.

Meer-Hirse/ vid. Hirse.

Meer-Hünerdarm/ vid. Hü-
nerdarm.

Meer-Kresse/ vid. Kresse.

Meer-Mans-Treu/ vid.
Mans-Treu.

Meer-Nägelein p. 40. n. 107

Merrettich/ Merrieh p. 226.
n. 607.

Meerstachel-Wurk/ p. 133.
n. 371.

Meerwurkel/ p. 69. n. 170.

Meeske p. 21. n. 52.

Meger-Kraut p. 166. n. 449.

Meliß/ wilde Meliß p. 254. n.
665.

Mengolwurk/ wild p. 135.
n. 379. krause spitze Men-

golwurk p. 136. n. 380.

Mercurius-Kraut p. 163. n.
439.

Merken-Blum p. 61. n. 145.

weiße Merken-Blum p.
219. n. 593.

Merck-Violen vid. Violen.

Mey-Blümlein p. 141. n. 395

Meyer/ Meyer-Kraut/ groß
und klein p. 12. n. 22. 23. 24.

25. p. 100. n. 265. rother

Meyer p. 14. n. 32. weiß
glat

INDEX GERMANICUS.

glat Meyer-Kraut p. 18.
 n. 44. wider Meyer p. 28.
 n. 70. kleiner und großer
 rother Meyer p. 28. n. 71.
 72. groß Stern-Meyer-
 Kraut p. 166. n. 449. breit-
 blättriges weißes Meyer-
 Kraut. Ibid.
 Milch-Blum p. 200. n. 549.
 mit rundlechten Blättern p.
 106. n. 278.
 Milk-Kraut / gülden Milk-
 Kraut p. 246. n. 645.
 Milde/ Scheiß-Milde/ Pur-
 gier-Milde p. 22. n. 57.
 Nissel/ Mistel/ p. 287. n. 745
 Modelgeer p. 101. n. 267.
 Möhren/ Busch-Möhren p.
 175. n. 486. mit glattem
 Saamen/ und raugem p.
 175. n. 487. wilde dünn-
 blättrige Möhren/ p. 189.
 wilde Möhren/ Esels-Möh-
 ren/ p. 190. n. 524.
 Mohn/ Wasser-Mohn p. 178.
 n. 493. wilder Mohn p. 188
 n. 521.
 Morcheln p. 79. n. 195.
 Morgenstern vid. Bocksbart
 Moß/ Heer-Moß p. 66. n. 160
 gemein Erd-Moß p. 166.
 n. 450. Wald-Feder-Moß
 p. 167. n. 451. Feder-Moß/
 so auff alten Dächern sitzt/
 ibid. p. 452. gespißter groß-

ser ibid. gespißter kleiner
 Feder-Moß mit ästigen
 Stängelchen p. 167. n. 454.
 klein kriechender Waldfah-
 ren Moß/ ibid. n. 455. zwey-
 blättriger liegender Moß/
 ibid. Moß mit breiten läng-
 lichten Blättern p. 168. n.
 457. Stern-Moß/ ibid. n.
 458. Wasser-Moß mit rund-
 den ausgebreiteten Blät-
 tern/ ibid. n. 459. ästiger
 Cypressen-Moß/ ibid. dünn-
 ner haarichter Baum-Moß
 p. 168. n. 461. Maur-Moß
 p. 170. n. 465. Büchsenförmiger
 Erd-Moß p. 171. n.
 466. Büchsenförmiger
 Stein-Moß n. 467. gera-
 der/ grauer Corallen-Moß
 n. 468. gerader Corallen-
 Moß mit röthlichen Hör-
 nern n. 469. Langer Asch-
 farber Baum-Moß p. 171.
 n. 471. Meer-Moß p. 172
 n. 475. langer See-Moß/
 n. 476. gehörnter Wasser-
 Moß n. 477. zähnichter
 Wasser-Moß p. 173. n. 478
 subtiler Nethförmiger Was-
 ser-Moß n. 479. Wasser-
 Moß von ganz zarten Fä-
 demchen n. 480. mit ganz
 kleinen subtilen Blättern
 chen ibid. langer Wasser-
 Moß/

INDEX GERMANICUS:

Moß/ so tieff unter der Er-
 den gestanden p. 173. n. 482.
 Moß=Beeren/ p. 289. n. 751
 Moß=Blum/ Mott=Blum/
 vid. Ruh=Blum.
 Moß=Kolben p. 277. n. 719.
 Motten=Blum vid. Rhein=
 Blume/ p. 64. n. 155.
 Münch=Blatt/ p. 61. n. 145.
 Münch=Kap. p. 5. n. 8.
 Munk/ Kaken=Munk p. 162.
 n. 437. Vorgemunk/ Stein=
 Munk ibid. langblättrige
 wilde Moß=Munk n. 438.
 Mürsemau p. 169. n. 462.
 Mummeln/ geel und weiß p.
 178. n. 493. 495.
 Mütterchen p. 99. n. 264.
 Mutter=Kraut. vid. Susan=
 ken=Kraut.
 N.

Nachtschatten p. 256. n. 669.
 Nägelein/ Acker=Nägelein/ wil-
 de rothe bärtige Nägelein/
 Ehier = Nägelein / kleine
 Maur= oder Weg=Näg-
 lein p. 38. 39. n. 100. 101.
 102. 103. 104. Acker=Näg-
 lein mit grosser Blüth p. 38.
 n. 99. raue Acker=Nägelein
 mit grosser Blüth p. 39. n.
 100. weisse Pflaum=Näg-
 lein/ Feder=Nägelein p. 40.
 n. 105. weisse wilde Stein=
 Nägelein p. 40. n. 106.

Wald= und Heid=Nägelein/
 Meer=Nägelein ibid. n. 107.
 Korn=Nägelein p. 148. n.
 410.
 Nägelein=Gras p. 39. n. 100.
 Nabel=Kraut p. 142. n. 397.
 Nardenwurk p. 36. n. 96.
 Narren=Kap. p. 5. n. 8.
 Narrenkolben p. 277. n. 719.
 Natter=Milch/ p. 248. n. 651.
 Natterwurk/ p. 28. n. 69.
 Natter=Zung/ p. 177. n. 492.
 Natter=Zunglein p. 179. n.
 499.
 Nept/ p. 162. n. 437.
 Nessel/ taube oder todte Nes-
 seln mit weissen/ gelben und
 blauen Blumen p. 133. n.
 372. 373. 374. stinckende
 braune Wald=Nessel p. 134.
 n. 373. grosse stinckende tau-
 be Wald=Nessel p. 134. n.
 373. kleine taube Nessel/
 dessen Blätter umb den
 Stengel herum gehen p. 134.
 n. 376. Marien=Nessel/ p.
 162. n. 437. taube/ wilde
 Nessel p. 291. n. 755. grosse
 brennende Nessel / kleine
 brennende Eyter= oder heiz-
 ter=Nessel/ p. 291. 292. n.
 756. 757. Donner=Nessel
 p. 291. n. 756. Creutz=Nes-
 sel p. 248. n. 652.
 Nessel=Rancken p. 59. n. 141.
 Neun=

INDEX GERMANICUS.

Neunheil und Neungleich / p.
169. n. 463.

Neunkrafft / p. 193. n. 531.

Niese-Wurk / breitblättrige

Berg-Niesewurk mit brau-
ner Blüth p. 123. n. 339.

wilde Niesewurk mit weisser
Blüth p. 124. n. 340. schmal-

blättrige Purpur-braune
Berg-Niesewurk p. 124.

n. 341. schmalblättrige Wie-
sen-Niesewurk mit weiß-

brauner Blüth p. 124. n. 342.

Ruß / vid. Hasel-Ruß. Klei-
ne Erd-Ruß p. 186. n. 514.

Wasser-Ruß / Weiher-
Ruß / See-Ruß / Stachel-

Ruß / Spiz-Ruß p. 271.
n. 705.

O.

Ochsenbrech p. 17. n. 41.

Ochsen-Zung / wilde p. 64. n.

154. grosse schmalblättrige
gemeine Ochsen-Zung p. 29.

n. 76. weisse Ochsen-Zung /
p. 30. n. 76. Wald-Och-

sen-Zung p. 30. n. 79. wil-
de Ochsen-Zung mit liegen-

den Stengeln p. 30. n. 79.
wild-Ochsen-Zung p. 64.

n. 154. rothe Ochsen-Zung
p. 143. n. 400.

Odermennig / p. 71. n. 176.

Oherlöfflein-Kraut / p. 149.

n. 413.

S. Stillen-Kraut p. 51. n. 136

Otter-Zung / kleine / p. 235.

n. 624.

P.

Päppel / grosse wilde Päppel /

p. 156. n. 427. Hasen-Pap-

peln / grosse Roß-Päppeln /

ibid. p. 157. rundblättrige

kleine Wald-Päppeln / ibid.

n. 428. Gänß-Päppeln p.

157. n. 428. Räß-Päppel /

Hasen-Päppeln / gemeine

kleine Päppeln ibid.

Päppel-Baum / schwarzer

Päppel-Baum / p. 205. n.

560. Lybischer Päppel-

Baum / p. 205. n. 561.

Paröfken quid? p. 291. n. 754.

Pastemen-Kraut vid. Upo-

stemen-Kraut.

Pastenach p. 189. n. 522.

Parwen-Fist / p. 90. n. 234.

Perlen / Wasser-Perlen p. 13.

n. 29.

Pestilenz-Wurk / grosse ge-

meine p. 192. n. 530. kleine

Pestilenz-Wurk / p. 193.

n. 532.

Peterlein / groß Boßs-Peter-

lein / p. 195. n. 537. Steins-

Peterlein / ibid. n. 538.

Mauer-Peterlein / ibid.

Pfaffen-Blat / Pfaffen-Röhr-

lein / Pfaffen-Stiehl p. 61.

n. 145.

Pfess-

INDEX GERMANICUS.

Pfeffer/ Mauer= Pfeffer/ p.
 251. n. 655. Frösch= Pfef-
 fer p. 223. n. 600.
 Pfeffer= Kraut p. 245. n. 643.
 Pfefferling/ p. 82. n. 203.
 Pfeil= Kraut/ klein schmalblät-
 trig spitzig Pfeil= Kraut / p.
 235. n. 625. Pfennigblum/
 preusche/ p. 145. n. 403.
 Pfennig= Kraut p. 177. n. 492.
 Pfersing= Kraut/ Weiblein/ p.
 191. n. 529.
 Pfriemen/ Acker= Pfriemen p.
 147. n. 407. klein Färb=
 Pfriemen p. 101. n. 266.
 Pinn= Holz. p. 70. n. 173.
 Pintchen p. 91. n. 235.
 Po= Gift. p. 90. n. 234.
 Poggen= Aug p. 96. n. 253.
 Poggenstiel p. 94. n. 244.
 245. 246.
 Pömpchen/ p. 86. n. 219.
 Polley/ Wald= oder Berg=
 Polley p. 50. n. 126. Was-
 jer= Polley. p. 177. n. 492.
 Potenge vid Betonien.
 Pülske/ Stein= Pülske p. 83.
 n. 208. Ruhe= Pülske ibid.
 Heide= Pülske Stein= Püls-
 ke p. 83. n. 209. Ziegen=
 Pülske p. 84. n. 212.
 Schwolst= Pülsken p. 89.
 n. 230. Blut- Pülsken p.
 90. n. 231. Schlangen=
 Pülsken p. 92. n. 241. Stein=
 Pülsken Blüth p. 95. n. 250.

C.

Quacken= Kraut p. 51. n. 131.
 Quacken= Gras p. 109. n. 286.
 Qwendel vid. Geld= Kummel
 Qwitschen/ Qwitschle= Beer/
 p. 260. n. 680.

R.

Raden p. 148. n. 410. Groß
 Raden ibid.
 Ramsel/ p. 200. n. 549.
 Rappen= Fußlein/ wild p. 127.
 n. 352.
 Rapunkel p. 68. n. 165. große
 Rapunkel mit einer Fuchs=
 schwanz= Aehr p. 228. n.
 611. Wald= Rapunkel ibid.
 Rapunkel mit blauen Sca-
 biosen= Köpfflein p. 229. n.
 612. Pfirschen= blätterig
 Rapunkel mit grossen blau-
 en Glocken= Blumen p. 229.
 n. 614.
 Raut/ Hüner= Rauten/ p. 13.
 n. 26. Leber= Raut p. 146.
 n. 404. traubichte Mohn=
 Raute p. 146. n. 404. klein
 Mohn= Raut/ ibid. große
 Wiesen= Raut p. 267. n.
 696.
 Rechholder/ vid. Wachholder.
 Reinfarn p. 265. n. 691. weiß
 Reinfarn p. 63. n. 150.
 Reisklen/ p. 79. n. 196. Stein=
 Reisklen/ p. 80. n. 197. Eich=
 Reisklen p. 80. n. 198. roth
 und

INDEX GERMANICUS:

und blau Bruch=Reißen/
p. 80. n. 199. Ab=Reißen/
p. 86. n. 222. Reißen=Blüth
p. 95. n. 249.
Nettich/ Wasser=Nettich/ p.
227. n. 608. wilder Net-
tich ibid. mit zerschnittenen
Blättern ibid.
Rhein=Blume/ schwarzblätt-
trige gelbe p. 64. n. 155.
Nied/ Groß Nied/ Schwer-
tel=Nied p. 260. n. 684.
Nied=Gras p. 119. n. 324.
Rinds=Augen p. 45. n. 117.
Rinds=Wurzel/ vid. Bilsens
Kraut.
Ritter=Sporn/ Ritterblum
p. 51. n. 130.
Nödel/ Nödel-Kraut p. 190.
n. 525.
Rohr/ gemein Rohr/ Deck-
Rohr p. 19. n. 48. Wald-
Rohr p. 118. n. 321. Berg-
Rohr ibid.
Rohr=Gras/ p. 112. n. 299.
Rohrlein=Kraut/ p. 61. n. 145.
Rohr=Köpfchen p. 84. n. 211
Rothlauffen=Kraut/ p. 105.
n. 276.
Romey/ p. 44. n. 115.
Röstern p. 259. n. 753.
Rosen/ Heck-Rosen p. 232. n.
618. Feld-Rosen/ Frauen-
Rosen p. 232. n. 618. Klap-
per-Rosen/ p. 188. n. 521.

Korn-Rosen/ ibid. item p.
282. n. 618. Haber=Rose/
Hunds=Rose/ Büttl.=Rose
Heyd=Rose ibid. Herk-
Rößlein=Gras p. 39. n. 100
Rosmarin/wilde p. 49. n. 125.
Rokripp p. 198. n. 543.
Rosshub vid. Suff=Lattich,
Ros=Münke p. 162. n. 438.
Ros=Schwanz/ Wasser-
Ros=Schwanz mit sehr
dünnen langen Blättern p.
65. n. 156. Wald Ros-
Schwanz ibid. p. 157.
Rotten oder Rotten=Blum p.
148. n. 410.
Ruhr=Kraut/ groß und klein
Ruhr=Kraut/ p. 107. n.
281. 283. Groß Ruhr-
Kraut mit schmalen läng-
lichten Blättern p. 107. n.
282. Berg=Ruhr=Kraut
mit runder Blüth p. 107.
n. 280.
Ruprechts=Kraut p. 105. n.
276.

S.

Saam=Kraut/rundblättriges
Saam=Kraut p. 205. n.
562. schmalblättrig Saam-
Kraut p. 205. n. 564. spitzig
Saam-Kraut p. 206. n.
564. Saam=Kraut mit
weichen breiten glänzenden
Blättern p. 206. n. 565
Saam=

INDEX GERMANICUS.

- Saam=Kraut mit krausen
 Blättern p. 206. n. 566.
 Klein großächtiges Saam=
 Kraut p. 206. n. 567.
 Klein großächtiges schmales
 Saam=Kraut p. 206. n.
 568.
 Sade=Baum/ wilder/ Wald=
 Sadebaum p. 170. n. 464.
 Saffran/ wilder/ stachlichter
 Feld=Saffran p. 50. n. 127.
 Salk = Kraut vid. Knob=
 lauch=Kraut.
 Samlob p. 18. n. 45.
 Sanickel p. 244. n. 641.
 Sar-Baum p. 205. n. 560.
 Saturay p. 245. n. 643.
 Sau = Blum/ Sau = Rüssel/
 Sau = Schnabel p. 61. n.
 145. Sau = Brodt p. 187.
 n. 517. Sau = Melcken p.
 257. n. 674. Saurach p.
 163. n. 441. Sau = Todt/
 p. 23. n. 58. Sau = Wurz/
 vid. Braun = Wurz. Sau =
 Distel/ vid. Diestel.
 Saurampff p. 3. n. 5. Schaaff=
 Saurampff p. 4. n. 6.
 Scabiosen/ groß/ braun und
 weiß p. 246. n. 646. 647.
 Groß Scabiosen p. 247. n.
 648. gelblicht Scabiosen
 mit sehr zerschnittnen Blät=
 tern p. 247. n. 649.
 Schaaff=Garbe / grosse ge=
 meine p. 164. n. 442. groß
 Schaaffribb/ Schaaffrip/
 ibid. Purpurrothe Schaaff=
 Garbe/ p. 164. n. 443.
 Schaafftheu p. 65. n. 157.
 Schaafftheu ohne Blätter/
 p. 65. n. 159. Groß Schaaff=
 theu ibid. mit vielen Nesten
 ibid. n. 160. stinckender
 Schaafftheu/ so unter dem
 Wasser kreucht p. 66. n.
 161. kriechend Wasser=
 Schaafftheu mit vielen
 zwey = zändlichten kleinen
 Blättern p. 67. n. 162.
 Schaaffs=Zunge p. 199. n.
 546.
 Scharter=Kraut p. 253. n.
 662.
 Scheiß=Kraut/ p. 142. n. 397.
 p. 163. n. 439.
 Scheiß=Lorbeeren p. 139. n.
 388.
 Schell=Wurz vid. 'Schin=
 Kraut.
 Schernäckel vid. Sanickel..
 Schin=Kraut p. 45. n. 118.
 Schierling / vid. Wehdens=
 dunk / schmalblättriger
 Wasser=Schierling p. 49. n.
 124.
 Schlaff=Kraut/ vid. Bilsens=
 Kraut.
 Schlüssel = Blumen / geel
 Schlüssel=Blumen/ S. Pes=
 ters

INDEX GERMANICUS.

- ters Schlüssel/ p. 279. n. 725.
- Schlangen=Neuglein p. 30. n. 79.
- Schlangen=Kraut p. 177. n. 492. Klein Wasser=Schlangen=Kraut p. 62. n. 149.
- Schlangen=Nord/ p. 248. n. 651.
- Schlangen=Wurk/ grosse/ p. 27. 28. n. 69.
- Schlehen=Baum / wilder p. 208. n. 572.
- Schlehen/ Schlehen=Dorn/ ibid. rothe Schlehen p. 231 n. 616.
- Schotten=Blum p. 209. n. 575
- Schmalz=Blum/ vid. Kuh=Blum.
- Schmeelen/ klein und groß p. 118. n. 321. p. 119. n. 322.
- Schmerbel p. 136. n. 381.
- Schnabel=Kraut/ klein Ucker=
- Schnabel=Kraut/ p. 105. n. 275.
- Schollwurk/ kleine/ p. 105. n. 276.
- Schön=Härlein p. 50. n. 127.
- Schorbocks=Kraut p. 46. n. 119
- Schotwurk. p. 170. n. 464.
- Schoten=Klee/ p. 145. n. 402.
- Spergel mit kleinen Flach=
- Köpfen p. 261. n. 682. mit
- Lankächtigen Blättern p. 261. n. 683.
- Schuppenwurk/ siebenblät=
- riger mit schwarzen Beeren
- p. 61. n. 146. grosse Schup=
- pen=Wurk p. 187. n. 517.
- Schüttgelb/ wie es bereitet
- wird von den Mahlern p. 26. n. 67.
- Schwaalcen=Zagel/ p. 283. n. 731.
- Schwaben/ p. 108. n. 285.
- Schwalben=Wurk/ p. 20. n. 50.
- Schwalben=Kraut/ klein p. 105. n. 276. vid. Schin=
- Kraut.
- Schwam/ Schwämme/ Holz=
- schwämme p. 90. n. 232.
- Hollunder= Schwamm p. 92. n. 236. Lungächtiger
- Klösch=Schwamm p. 95. n. 248. schwarzer Rehhaa=
- richter Fliegen=Schwamm
- p. 87. n. 223. rother Fliegen=
- Schwam/ geeler / grauer/
- Eichen= Hasel = Fliegen=
- schwam ibid. n. 224. 225. 226. weisser Fliegenschwam
- p. 89. n. 227. Heide Flie=
- genschwam p. 89. n. 228. weisser Kolbenächtiger Flie=
- genschwam p. 89. n. 229. wässerichter Galretschwam
- p. 96. n. 251. Körnichter
- Corallen= Schwam p. 96. n. 254. Körnichter Fleisch=
- farber

INDEX GERMANICUS.

- farber Schwam p. 97. n. 255. Scharlach = rother Büchsen-Schwam/ p. 97. n. 256. Rappenschwam p. 97. n. 257. Mehlschwam/ p. 97. n. 258. Holzsächtiger Schwam mit einem langen Stiel. p. 98. n. 259. Scheiben Büchsen Schwam. p. 98. n. 260. Kästichter Holz-Schwam. p. 98. n. 261. Harter Holzschwam. ibid. n. 262. kleiner Saat-tragender Büchsen Schwam. p. 99. n. 263.
- Schwartling. p. 95. n. 247.
- Schwein kraut. p. 62. n. 149.
- Schweinichen. p. 86. n. 218.
- Geele Schweinichen. ibid. n. 221.
- Schwelcken / Schwelcken-Baum vid. Wasser-Holz-lunder.
- Schwertel/ grosse/ braune p. 105. n. 277. kleine schmalblättrige braune Wiesen-schwertel p. 130. n. 263.
- Cyper-Schwertel/ Vinken-Schwertel p. 131. n. 365.
- Scorpion-Kraut p. 133. n. 371
- Sekel-Kraut vid. Taschel-Kraut.
- See-Blum/ kleine/ weisse / p. 179. n. 496. geele p. 178. n. 493.
- Seekannen/ grosse/ gelbe / p. 177. 178. n. 493. weisse p. 178. n. 495.
- See-Kolben/ p. 277. n. 719.
- See-Mans-Treu p. 69. n. 170.
- See-Schoten/ wilde/ p. 197. n. 541.
- Seegen/ Wasser-Seegen p. 11. n. 21.
- Seiden-Kraut p. 59. n. 141.
- Seil-Kraut p. 169. n. 463.
- Senff/ Bauren-Senff/ p. 226. n. 607. p. 268. n. 698.
- wild weisser Senff p. 68. n. 166. kleiner und grosser wilder Senff mit schwarzen Blättern/ so an der Erde in die runde herumbliegen p. 68. n. 168. 169.
- Weg-Senff/ Schnöder Senff Schütt-Senff/ Steinsenff/ p. 69. n. 171. haarichter Weg-Senff ibid. p. 172.
- Senff-Kraut/ gelb/ breitblättricht p. 68. n. 165.
- Sergen-Kraut vid. Pfeffer-Kraut.
- Sesel Ethiopischer p. 254. n. 603.
- Seyffen-Kraut p. 244. n. 642.
- Siebengezeit p. 161. n. 436.
- Siegmurk/ p. 105. n. 277.
- Silber-Kraut p. 207. n. 569.
- Simarswurk/ Sygmarswurk p. 7. n. 12.

INDEX GERMANICUS.

- Simonswurz/ *ibid.*
 Sindau *vid.* Sonnentheu.
 Sinnau/ p. 7. n. 13
 Sommerwurz. *vid.* Erwen-
 würger.
 Sonnen-Blum/ oder Sonnen-
 Glnkel. p. 43. n. 113.
 Sonnenwend/ Sonnenwirbel
 Sonnen-Kraut p. 47. n. 121.
 p. 103. n. 271.
 Sonnen-Brut *ibid.* p. 48.
 Sonnen-Löffel/ p. 231. n. 617.
 Sonnentheu/ p. 231. n. 617.
 rundblättriger kleiner Son-
 nentheu.
 Sonnentau p. 7. n. 13.
 Sophien-Kraut p. 176. 177.
 n. 491.
 Spargen/ Aspargen. p. 20.
 n. 51.
 Speer-Birn/ wilde / Speer-
 werbaum *vid.* Owtischen.
 Speer-Kraut/ gekerfft p. 224.
 n. 604.
 Speerdiestel p. 34. n. 91.
 Speeren-Stich p. 101. n. 267
 Speichelmurz/ *vid.* Seyffen-
 Kraut.
 Sperber-Kraut/ p. 196. n. 539
 Spindel-Baum p. 188. n. 520
 p. 70. n. 173.
 Spinnen-Kraut / ohnästiges
 Erdsinnen-Kraut p. 193.
 n. 533.
 Springkraut/ Springsaamen-
 kraut/ *vid.* Sirsch-Malde.
 Stabwurz/wild p. 2. n. 2.
 Stachelkraut / Meerstachel-
 kraut mit Pasternack Saa-
 men p. 132. 133. n. 370. 371.
 Ständel-Wurz/ Fliegenstän-
 delwurz/ fleckichte/ auch glat-
 te braunrothe Fliegenstän-
 delwurz p. 183. n. 508. 509.
 Stallkraut/ stachlicht/ p. 17.
 n. 41.
 Standhart p. 181. n. 503.
 Ständkraut p. 147. n. 407.
 S. Steffenskraut p. 256. n. 668
 Stechdorn/ *vid.* Creutzbeer.
 Steinbart/ p. 172. n. 475.
 Steinbeeren p. 234. n. 622.
 Steinbrech/ p. 245. n. 644.
 gülden Steinbrech p. 246.
 n. 645. rother Steinbrech/
 p. 73. n. 181.
 Steinflechten/ p. 140. n. 393.
 Steinklee p. 161. n. 436. p.
 274. n. 715.
 Steinkraut p. 202. n. 554.
 Steinsaamen p. 143. n. 399.
 Sternkraut p. 21. n. 53.
 Sternkraut p. 164. n. 671.
 Wasser-Sternkraut p. 54.
 n. 138.
 Stern-Leberkraut p. 21. n. 52
 Stichwurz/ wilde p. 50. n. 127.
 Stöbling. p. 81. n. 202.
 Stoltzer Heinrich p. 136. n. 381
 Storchenschnabel/ blauer mit
 Eisenhutts Blättern p. 102.
 n. 269. p. 103. n. 271. mit
 Schier-

INDEX GERMANICUS.

Schierlings Blättern p. 104.
 n. 274. Kleiner liegender
 Storchschnabel mit Schier-
 lings Blättern p. 105. n. 275.
 Straßling p. 92. n. 237.
 Streel/ Bubenstreel/ Wolfs-
 Streel. p. 62. n. 248.
 Streichkraut/ weiden blättri-
 ges. p. 147. n. 407.
 Streiffwurk. p. 138. n. 379.
 Stroh/ Wall=Stroh. p. 100.
 n. 265. p. 166. n. 449.
 Strömring/ Holz = Ström-
 ling. p. 157. n. 429.
 Süßfarn. p. 204. n. 559.
 Süß-Holz. p. 106. n. 279.
 Süßling. p. 81. n. 201.
 Süßwurzel. p. 204. n. 559.
 Süttgrün vid. Schüttgelb.
 Susanken=Kraut. p. 43. 44.
 n. 114.

T.

Tarant/ blauer. p. 102. n. 268.
 Täschel= oder Seckel=Kraut/
 groß und klein p. 30. 31. n.
 80. 81. p. 268. n. 698.
 Taubensuß. p. 222. n. 548.
 p. 103. n. 271. Tiefzer-
 schnittener Taubensuß mit
 großer Blüht p. 103. n. 271.
 mit kleiner Blüht. p. 104. n.
 283.
 Tauben=Kropff p. 77. n. 192.
 Tauben=Kraut vid. Wisen-
 hart.

Taube Nessel p. 133. 134. n.
 373. 374.
 Taubkorn. p. 121. n. 331.
 Tausend Guldentrout. p. 41.
 n. 109.
 Tausendkorn. p. 202. n. 554.
 555.
 Teuffels Abbiß. vid. Abbiß.
 Teuffels=Blumen p. 39. n. 99.
 Teuffels=Kirschen. vid. Kir-
 schen.
 Thanne. p. 1. n. 1.
 Thannenwedel. p. 65. n. 158.
 Thwalth/ Gersten Thwalth.
 p. 73. n. 180.
 Tormentill. p. 270. n. 702.
 Traut Babbichen sieh mich
 an. p. 146. n. 404.
 Tropffenwurk. p. 204. n. 559.

U

Uderamp. p. 123. n. 337.
 Ueelautta. p. 18. n. 45.
 Verfluchte Jungfrau. p. 47.
 48. n. 121.
 Vergiß mein nicht. p. 63. n.
 151.
 Vielsaamen. p. 28. n. 70.
 Viole/ blaue. p. 275. n. 717.
 Blaue braune Viole/
 Merk=Viole. p. 285. n.
 739. Hundsviole. ibid. n.
 740. weisse Viole. p. 219.
 n. 593. Wasser=Viole
 mit nackten Stengeln p. 166.
 n. 448.

INDEX GERMANICUS.

Vogelkraut / vid. Meyer/
 Vogelkraut mit Coriander
 Saamen/ p. 13. n. 31.
 Vogels-Nest p. 189. n. 522.
 Untreu/ p. 133. n. 371.

W.

Wacholder/ Wacholderbaum
 p. 131. n. 368.
 Wald= Cypress. vid. Sade= Baum.
 Waldsar/ p. 73. n. 182.
 Waldbirse vid. Hirse.
 Waldfichern p. 187. n. 517.
 518.
 Walb= Knoblauch/ vid. Knob= lauch.
 Wald= Meister/ vid. Meefte
 Wald= Nägelein/ vid. Näge= lein
 Waldrinde p. 42. n. 112.
 Waldviolen p. 219. n. 191.
 192.
 Wald = Wolffsmilch vid. Wolffsmilch.
 Wallwurz vid. Beinwellen.
 Walckenkraut p. 147. n. 408.
 Wasser= Aron/ vid. Aron.
 Wasserbathenig p. 248. n. 650
 Wasserdoft/ vid. Doft.
 Wasser= Eppich/ vid. Eppich.
 Wasser= Gall/ p. 75. n. 187.
 Wasser= Garb/ vid Garb.

Wasser= Kolben/ vid. Kol= ben/
 Wasser= Kress/ vid. Kress.
 Wasser= Linsen/ vid. Linsen.
 Wassermerck.
 Wasser= Nuß/ vid. Nuß.
 Wasser= Perlen/ vid. Perlen/
 Wasser= Pfeffer/ vid. Pfeffer.
 Wasser= Polley. vid. Polley.
 Wasser= Rettich/ vid. Rettich
 Wasserschlange= Kraut/ vid. Schlangen= Kraut.
 Wassersegen/ p. 11. n. 21.
 Wassersichel/ p. 11. n. 21.
 Wasser= Viole/ vid. Viole.
 Wasser = Wundkraut/ vid. Wund= Kraut.
 Weberkarten/ p. 62. n. 148.
 Weholderbaum/ vid. Wa= holder= Baum.
 Wedendunck/ Wehdendunck/ groß und klein/ p. 48. 49.
 n. 123. 124.
 Weg= Blätter/ n. 198. n. 542.
 Wegdiestel/ vid. Diestel.
 Wegerich/ breiter Wegerich/ p. 199. n. 546. breitblätte= riger Wasser= item Frosch= Wegerich / ibid. n. 547.
 Wasser = Wegerich mit schmalen langen Blättern/ p. 199. n. 548. grosser Wegerich / p. 197. n. 542. kleiner/ breiter/ kleiner spitzer rohter

INDEX GERMANICUS.

- rohter breiter Wegrich/ p. 198. n. 543. 544. 545.
 Weg-Nägelein/ vid. Nägelein.
 Weg-Senff/ vid. Senff.
 Wegstroh / unser Frauen Bett- und Wegstroh p. 100 n. 265.
 Wegtritt/ p. 201. n. 552. grosser Wegtritt ibid. mit langen schmalen Blättern p. 202. n. 553. kleiner Wegtritt ibid. n. 554. Wegtritt mit kleinen Köpfchen und gar zarten Blättern/ p. 203. n. 557. p. 204. n. 558. klein fruchtbahrer Wegtritt/ p. 203. n. 556.
 Wegwart/ wilde/ p. 47. n. 121
 Weiber-Gift/ p. 90. n. 234.
 Weide/ grosse und kleine Salwenblättrichte Kampweide p. 235. n. 626. p. 239. n. 635. Saalweide p. 236. n. 626. Band-Weide/ rohte Weide/ p. 237. n. 627. Gold-Weide ibid. rohte Sprott-Weide p. 239. n. 634. Haar-Weide ibid. n. 636. 637. Seilweide. p. 237 238. n. 629. 630. 631. Bachweide/ Dotter-Weide Bruchweide/ ibid. n. 632. 633.
 Weiderich/ p. 150. n. 414. Wasser-Weiderich p. 151. n. 416. rauger Schotentragender Weiderich mit grosser Blüth p. 151. n. 417. 418. grosser und kleiner unrauger Schotentrager der Weiderich p. 151. 152 n. 419. 420. Dito./ mit weisser Blum p. 152. n. 421. spitziger blauer Weiderich p. 155. n. 424. blauer gehelmter ibid. n. 425. rauger gehelmter mit Purpursarben Blumen p. 156. n. 426. Weiderich-Röslein/ p. 151. n. 418.
 Weihenfuß/ p. 221. n. 597.
 Weiskurk p. 200. n. 550.
 Weizen/ Zwaldfweizen p. 121 n. 331. Kuhweizen / p. 16. n. 434.
 Weizenbrand/ p. 293. n. 758.
 Welsch p. 280. n. 726. schwarze Welsch p. 280. n. 727.
 Welsaamen p. 177. n. 491.
 Wendwurzel vid. Baldrian.
 Vermuth p. 2. n. 3.
 Weyher/ klein Weyher / p. 131. n. 366.
 Wicken/ geel Wicken p. 138. n. 387. grosse und kleine wilde Wicken p. 284. n. 733. 738. raug / braune und unrauge

INDEX GERMANICUS:

- uurauge/ weisse vielblättrige
 Wicken p. 284. n. 735. 736.
 Vogels Wicken / n. 734.
 braune Waldwicken n. 737.
 Wicken p. 260. n. 754.
 Wiederstoß roth und weiß / p.
 147. 148. n. 400. 408.
 WiederTodt/ gulden Wie-
 dertodt p. 7. n. 11.
 Wiesenblum/ Goldwiesenblum
 vid. Kuhblum.
 Winde/ grosse/ glatte / weisse
 Winde p. 51. n. 131. kleine
 weisse Blattwinde / ibid. n.
 132. Weidenwinde/ Wein-
 gartwinde / Zaunwinde/
 kleine Winde mit dreykan-
 tigen Saamen / schwarze
 Winde/ ibidem.
 Windhalm / Ackers Wind-
 halm p. 112. n. 299.
 Winterblümchen p. 65. n. 155
 Wintergrün/ groß rundblät-
 teriges p. 209. n. 577. spitz-
 blättriges Wintergrün mit
 vielen weissen Blümlein p.
 210. n. 579. klein rund-
 blättrig Wintergrün p. 210
 n. 578. Wintergrün mit ge-
 spizten und zerkerbten Blät-
 tern p. 210. n. 580. staud-
 ächtiges Wintergrün mit
 zerkerbten langlechten Blät-
 tern p. 211. n. 581. Win-
 tergrün mit Hünerdarm-
 Blüth ibid. n. 582.
 Wirbel=Doß p. 50. n. 126.
 Witscherling vid. Dunct.
 Woll/ Wiesen-Woll/ Matten-
 Woll/ p. 114. n. 307.
 Wolfferley p. 21. n. 53.
 Wolffsbeer p. 257. n. 671
 Wolffsbast p. 139. n. 388.
 Wolffsbohnen p. 267. n. 694.
 Wolffsmilch p. 269. n. 701.
 Wald = Wolffsmilch vid.
 Sirschmalde.
 Wolgemuth p. 185. n. 512. klein
 Wolgemuth p. 50. n. 126.
 Worusken / p. 85. n. 216.
 Wull = Kraut vid. Welf.
 schwarz Wull = Kraut p.
 281. n. 727.
 Wund=Kraut p. 144. n. 401.
 vid. Wolffsbohnen/ Was-
 ser-Wund=Kraut p. 54. n.
 138. gulden Wund=Kraut
 mit breiten Blättern p. 287
 n. 744. groß Heidnisch
 Wund=Kraut mit breiten
 und schmalen Blättern p.
 286. n. 742. 743. Gotts-
 Wunden-Kraut p. 128. n.
 354.
 Würffel-Saamen / p. 187.
 n. 519.
 Wurmkraut/ vid. Geißbart.
 vid. Reinsarn.
 Wurmwurk/ p. 196. n. 539.
 Wurst=Sucht / eine Pferd-
 Krankheit p. 5. n. 8.
 S s Ploß

INDEX GERMANICUS.

- Vloß/ V. p. 122. n. 336.
 3.
 Zacharias-Blum p. 60. n. 142.
 Bahnkraut/ klein/ kahl p. 187.
 n. 517.
 Bäunling/ p. 42. n. 112.
 Baucken/ p. 141. n. 395.
 Beiland p. 139. n. 388.
 Zeitlosen/ groß und klein p. 24.
 n. 61. 62.
 Zeiskraut/ vid. Gliedkraut.
 Ziegenbart/ gekraußter p. 92.
 n. 238. ästiger Ziegenbart/
 p. 84. n. 213.
 Ziegen-Lauch p. 186. n. 514.
 Zigeuner-Kraut/ vid. Bilsen-
 Kraut.
 Zirbel-Baum/ wilder Berg-
 Zirbel-Baum p. 196. n.
 540.
 Zwen-Blatt/ p. 180. n. 500.
 Zwick-Holz p. 70. n. 173.
 Zwiebel/ Acker-Zwiebel/ Feld-
 und wilde Zwiebel p. 186.
 n. 514.



INDEX LATINUS.

* * *

* * *

*The written names
mark the original
of the interlinear
then are appropriate*

Aaron palustre, vid. Dracunculus, p. 62. n. 149.

Abies p. 1. n. 1. Abietis-lacryma Cerevisiæ incocta, eandem ab acore præservat sed cum infatuandi virtute, p. 1. n. 1.

Abies foribus olim applicata lugubre signum fuit. Apud Prussos Latum & Nuptiale. *ibid.* Ex abiete olim factus est Equus Trojanus, p. 2. Nec non aliæ Deorum statux, p. 2. n. 1.

Abrotanum Campestre, p. 2. n. 2.

Abinthium, p. 2. n. 3. Ponticum *ibid.*

Acanthus Germanica. *vid.* Spondylium.

Acanthium, *vid.* Spina alba.

Accipitrina, p. 177. n. 491.

Acer Major Cordi, p. 3. n. 4. Acer operum elegantia Statuis olim inserviit, p. 3. n. 4.

Acetosa pratensis, p. 3. n. 5.

Acetosæ radix decocta cerevisiam formâ externâ æmulatur, p. 4. n. 5.

Acetosa arvensis lanceolata, p. 4. n. 6.

Acetosella, p. 4. n. 6.

Acetabulum, *vid.* Telephium.

Achillæa & millefolium, p. 164. n. 442.

Acinaria palustris, p. 289. n. 751.

Acinus siye sterilis, p. 50. n. 126

Aconitum racemosum, p. 4. n. 7.

Aconitum cœruleum, p. 5. n. 8.

Aconiti Cœrulei seu Napelli poculò Aristoteles interiit, p. 5. n. 8.

Aconitum salutiferum, Pardalanches, monococcum, p. 257. n. 671.

Acorus verus, p. 5. 6. n. 10.

Acorus & Acorum. *ibid.*

Acorus adulterinus, p. 6. n. 10.

Diarrhæam sanat, p. 6. n. 10.

Aculeosa Gazæ, p. 34. n. 92.

Adiantum aureum minus, 6.

Adulterorum pœna apud antiquos, p. 226. n. 607.

Ædificiis fruendis quamam ligna accommodata, ne dehiscent ac rimas agant, p. 197. n. 540.

Ægilops Plinii, *vid.* Gramen leporinum, p. 112. n. 300.

Ægopodium, p. 16. n. 40.

Ægylops, *vid.* Festuca, p. 73. n. 180. vera, *ibid.*

Agrimonia, *vid.* Eupatorium Veterum, p. 71. n. 176. Agrimonia officinarum, *ibid.*

INDEX LATINUS.

Agrioriganum f. Onitis major,
p. 185. n. 512.

Aizoon, *vide* Sedum.

Alcea vulgaris major. p. 7. n. 12.

Alceæ radix, loco altheæ ab
aliquibus substituitur, p. 7.
n. 12.

Alchimilla, p. 7. n. 13

Alectorolophos, *vid.* pedicularis

p. 190. n. 525. tertius, *ibid.*

n. 526. tertii alterum genus,

Dodonæi prima, *ibid.*

Alga marina, p. 7. n. 14.

Alisma f. Arnica, *vid.* Aster.

Alisma tenuifolium, *vid.* Helle-

borine, p. 124. n. 341. Ali-

isma, p. 180. n. 500. Ali-

isma pratorum, p. 279. n. 725.

Alleluja, p. 274. n. 716.

Alliaria, p. 8. n. 15. Alliastrum,
ibid.

Allium ursinum, p. 8. n. 16. Alli-

um qui gustasset, à delubro &

sacris olim arcebatur, p. 8.

n. 16. Allium montanum

bicorne angustifolium flore

purpurascente, p. 9. n. 17.

Allium montanum capite ro-

tundo, p. 9. n. 18. Allium

medetur Calculo, p. 9. n. 16.

Allio coronatus est Andro-

nicus Imperator Oriental. p.

10. n. 19.

Alnus, p. 10. n. 19. Alni folia

calceis imposita lassitudinem

levant, *ibid.* Cortex macera-

tus coriariis atrum colorem

suppeditat, *ibid.* Aqua Alni,

cui AQUIANA dicatur, *ibid.*

Podagræ dolores tollit, *ibid.*

Flores quid? *ibid.* & ver-

rucæ? Alnus antiquitus lin-

tribus & scaphis fabricandis

inserviit, *ibid.* Emplastrum

Lœselii ex Alno, *ibid.* Alnus

nigra baccifera f. Frangula.

p. 11. n. 20. Lac auget à

vaccis comesta, *ibid.*

Aloë palustris, p. 11. n. 21.

Alpen *vel* Alsprutten quid? p.

235. n. 626. eorum usus

p. seq.

Alfinanthemon, p. 211. n. 582.

Alfine marina foliis portulacæ,

p. 12. n. 22. Alfine major, p.

12. n. 23. minor repens, p.

12. n. 24. multicaulis, p. 12.

n. 25. Alfine triphyllos cœ-

rulea, p. 13. n. 26. Alfine Ve-

ronicæ foliis, flosculis caudi-

culis adhaerentibus, *ibid.* Al-

fine hederulæ folio, *ibid.* n. 28

Alfine spargula dicta major,

p. 13. n. 29. Alfine foliis

Triflaginis, p. 13. n. 30. Al-

fine bifolia fructu Coriandri

radice geniculatâ, p. 13. n. 31.

Alfine alpina, p. 211. n. 582.

Alfine myosotis, *vid.* Echium

p. 63. n. 151. Alfine minima

vid.

INDEX LATINUS.

- vid.* Burfa Pastoris minor.
 Alfines minimum genus, p.
 202. n. 556.
- Alysson, p. 13. n. 27.
 Alyssum Galeni, *vid.* Sideritis
 arvensis. angustifolia mera.
 Alysson Germanicum Echl-
 oides, p. 30. n. 79.
- Amara dulcis, p. 257. n. 670.
 Amaranthus luteus, *vid.* Elichry-
 sum, p. 64. n. 155. Amaran-
 thus Galeni, *ibid.*
- Ambrosia, *vide* Abrotanum, p.
 2. n. 2.
- Amerius montanus tenuifolius
 minor, p. 40. n. 107. sylve-
 ster, p. 41. n. 108.
- Anomum falsum & Pseudoa-
 momum, *vid.* Grossularia, p.
 121. n. 334.
- Ampeloprasion proliferum, p.
 9. n. 17.
- Anagallis mas phœnicæa, p. 14.
 n. 32. hæmorrhagiæ medetur
ibid. Anagallis aquatica ma-
 jor folio oblongo, p. 14. n. 33.
 Anagallis aquatica minor fo-
 lio oblongo, p. 14. n. 34. A-
 nagallis aquatica folio subro-
 tundo, reptante cauliculo, p.
 14. n. 35. Anagallis aquatica
 brevior oblongo folio semi-
 ne biscutato, p. 15. n. 36.
 Anagallis aquatica longiore
 angusto folio, semine biscuta-
 to, p. 15. n. 37.
- Anblatum, *vide* Orobanche, p.
 187. n. 517. Cordi, *ibid.*
- Anchusa mimima, *vid.* Buglof-
 sum vulgare minus. Anchusa
 Alcibiadion, *vid.* Buglossum
 vulgare. Anchusa sylvestris,
vid. Echium vulgare, p. 64.
 n. 154.
- Androfaces, *vid.* Cuscuta, p. 59.
 n. 141.
- Anemone montana colore luteo
 p. 219. n. 592. colore can-
 dido, *ibid.* n. 593. Anemo-
 ne sexta, p. 219. n. 592. ne-
 morosa flore majore, *ibid.* n.
 593. quinta, sylvestris vulga-
 ris flore niveo, montana co-
 lore candido, *ibid.* montana
 quædam, p. 225. n. 605.
- Anemones species p. 209. n. 575
- Angelica aquatica, p. 15. n. 38.
 Angelica sylvestris major hir-
 suta, p. 16. n. 39. Angelica
 sylvestris minor sive erratica,
 p. 16. n. 40.
- Angvillaræ Panax chironium,
vid. Helenium vulg. p. 123.
 n. 338.
- Angvina aquatica, *vid.* Dracun-
 culus, p. 62. n. 149.
- Anonis spinosa flore purpureo,
 p. 16. n. 41. Anonis spinis
 carens purpurea, p. 17. n. 42.
- Anserina, *vid.* Potentilla, p. 207
 n. 569.

INDEX LATINUS.

Anthemis, *vid.* Chamæmelum.

Anthyllis leguminosa Belgarum
p. 144. n. 401. lenti similis,
ibid.

Antoniana major hirsuta, p. 151.
n. 417.

Aparine vulgaris p. 17. n. 43
medetur morsibus phalangio-
rum & viperarum p. 17. 18.
n. 42. Aparine palustris læ-
vis p. 18. n. 44.

Aphaca Aphace *vid.* Vicia sepiū.

Aphaco *vid.* Dens leonis p. 61.
n. 165.

Apium montanum folio ampli-
ore. p. 18. n. 45.

Apium aquaticum p. 222. n. 600

Apium palustre. p. 254. n. 667.

Apollinaris tertia *vid.* Hyoscy-
amus, p. 127. n. 353.

Aquilegia sylvestris, p. 18. n. 46
medetur variolis, morbillis,
Ictero. Ophthalmica & Cos-
metica est, *ibid.* quæ & quan-
do colligenda? *ibid.*

Aquilina, *ibid.*

Arachus, *vid.* Orobus, p. 187. n.
518.

Aracus, Araca, p. 284. n. 734. 736.

Arbor quotidie foliis suis aquam
stillans, p. 231. n. 617.

Arbores alienas incidere capitale
olim supplicium. p. 26. n. 67

Archangelica, p. 15. n. 38.

Archangelica, *vid.* Campanula
vulgatior.

Arcion, *vid.* Lappa p. 136. n. 382

Arcium Dioscoridis, *vel* Arcti-
um, *vid.* Lappa, p. 136. n. 382

Argemone altera, p. 207. n. 569.

Argentilla major, *vid.* Barba
Capræ. (n. 569.)

Argentina *vel* argentilla, p. 207

Aristolochia rotunda, p. 77. n.

193. rotunda vulgaris, *ibid.*

flore purpureo, *ibid.* rotunda

vulgaris radice majore solida,

p. 78. n. 194. rotundæ fabæ

altera species solida, *vid.* Fu-

maria bulbosa rotunda flore

albō, *ibid.* Aristolochiæ ro-

tundæ concavæ similis herbu-

la, p. 220. n. 594.

Ameria sylvestris altera, *vid.*

Caryophyllus barbatus sylve-
stris, p. 39. n. 102.

Armerius sylvestris, p. 41. n. 108

Armoracia, p. 226. n. 607.

Armoraria pratensis sylvestris,

p. 41. n. 108.

Arnica s. Alisma, *vid.* Aster.

Arnoglossa, p. 197. n. 542.

Artemisia vulgaris major, p. 18.

n. 47. latioris folii, *ibid.* ma-

ter herbarum, *ibid.* rubra &

alba, *ibid.* uterina & emme-

nagoga existit, p. 19. n. 47.

Carbones sub radice reperibi-

les quid, & quem usum præ-

stent? *ibid.* Artemisia mono-

clonos *vid.* Tanacetum vul-

gare. Arte-

INDEX LATINUS:

Artemisia polyclonos Dodonæi
vid. Jacobea, p. 129. n. 360.
Arundo palustris, p. 19. n. 48.
 Flos ejus lanosus aures exfurdat, *ibid.* *Arundo coronat*,
ibid. mortem infert, *ibid.*
Asarum, p. 19. n. 49. pro di-
 verso præparandi modo, eme-
 ticâ, diaphoreticâ, & diureti-
 câ virtute pollet, p. 20. quod-
 nam optimum, & quando col-
 ligendum? *ibid.*
Asclepias albo flore, p. 20. n. 50
Asparagus maritimus, p. 20. n. 51
 multis & egregiis pollet vir-
 tutibus, *ibid.* quomodo ubertas
 ejus ubique procuranda, *ibid.*
Aspergula, *vid. Asperula.*
Asperugo spuria, p. 30. n. 79.
Asperula f. *Rubeola montana*
 odora, p. 21. n. 52.
Asphodelus germanica, p. 193.
 n. 533
Aster montanus luteus salicis
 glabrô flore, p. 21. n. 53.
Aster Atticus, *ibid.* virtute
 vulnerariâ pollet, *ibid.* *Aster*
luteus hirsuto salicis folio, p.
 21. n. 54.
Astragalus, *vid. Orob.*, p. 187
 n. 517.
Astragloides, *vid. Orob.*, p.
 187. n. 519.
Atramentum rebus æri incis
 ex cudentis inserviens ex stram-
 mine avenaceo & hordeaceo,

nec non aliunde quomodo præ-
 parandum? p. 293. n. 761.

Atractylis aculeata foliis maxi- J. 4
me laciniatis, capitulis albis,
 p. 21. 22. n. 55.

Attractylis, *vid. Cnicus*, p. 50.
 n. 127. *Attractylis sylvestris*,
 medica, mitior, *vid. ibid.*

Atriplex sylvestris, Fimataria, p.
 22. n. 56. *Atriplex sylvestris*
 prima, p. 22. n. 57. *Atriplex*
sylvestris latifolia acutiore fo-
lio, p. 23. n. 58.

Avena fatua, græca, sterilis, p.
 72. & 73. n. 180.

Auricula muris, p. 193. n. 535.
 minor, p. 194. n. *ibid.* se-
 cunda, p. *ibid.* n. 536.

Auricula muris, *vid. Echium*,
 p. 63. n. 151. & p. 64. n. 153

Auricula Judæ, *vid. Fungus non*
vescus XIV. p. 92. n. 236.

Herba auricularis, p. 149. n. 411.

B

Baccaris, *vid. Asarum.*

Baccharis germanica. p. 179.
 n. 497.

Bagolæ primum genus Cæsalp.
 p. 288. n. 748.

Balsamine lutea, seu Noli me
tangere. p. 23. n. 59. *Atta-*
genes allicit & illaqueat. ibid.

Baptifecula *vid. Cyanus* p. 59.
 n. 142.

S. Bar-

INDEX LATINUS.

S. Barbata herba. *vid.* **Eruca**
lutea latifolia. p. 67. n. 165.
Barba Capræ floribus compactis.
Barbicapra. p. 23. n. 60.
Barba hirci *vid.* **Tragopogon**.
Bardana *vid.* **Lappa major** p.
 136. n. 382.
Barstuccæ subterranei, German.
Erd-Männlein quoniam olim
 fuerint p. 241. n. 638.
Basilicum medium p. 179. n.
 497. **Basilica minor**. *ibid.*
Baucia *vid.* **Pastinac.** **Sylv.** p.
 189. n. 524.
Bechion. *vid.* **Tussilago** p. 276.
 n. 718.
Belis major sylvestris caule foli-
 oso p. 23. n. 61. **Bellis** mi-
 nor sylvestris, p. 24. n. 62.
Remedium singulare *wieder*
den hastigen Druck *ibid.*
Bellis major lutea foliis profun-
 de incis. p. 24. n. 62.
Benedicta *vide* **Caryophyllata**.
Berula major, p. 14. n. 33.
Beta sylvestris p. 210. n. 577.
Betonica purpurea, p. 25. n. 64.
 vulgaris, *ibid.* alba *ibid.*
Betula virgulis erectis p. 25. n.
 66. **Betulae** folia praesaga sunt
 aliquando hyemis infecuturæ,
 p. 25. 26. n. 66. **Betula** pen-
 dulis virgulis, p. 26. n. 67.
Aqua **Betulae** cui usui inservi-
 at? *ibid.* **Betulae** virgæ accensæ
 lacum fundunt oculorum vi-

tiis perutilem, *ibid.* **Betula**
Pumila, p. 27. n. 67.
Betulae axungia **Dagget** dicta,
 vermes & pediculos enecat in-
 tus & foris adhibita p. 27. n.
 67. **Cortex coriis** preparan-
 dis destinata, *ibid.* **Ex Betula**
Fasces Romanorum consta-
 bant, *ibid.*
Betulus, p. 188. n. 520.
Bidens foliis tripartito divisis, p.
 34. n. 89.
Bifolium, p. 180. n. 500. **bifo-**
lium & **Satyrion** decimum,
ibid. **bifolium** bulbosum, *ibid.*
 n. 502.
Bistorta major, radice minus in-
 torta, p. 27. n. 69.
Blitum **Polyspermon**, p. 28. n.
 70. **piscibus** gratissima esca,
ibid. **rubrum** majus & minus
 p. 28. n. 71. 72.
Boletus cervinus, *vid.* **Fungus**
 non veseus, p. 95. n. 250.
Branca **Leonina**, *vid.* **Pastinaca**
 sylvestris, p. 189. n. 524.
Branca ursina, *vid.* **Spondylium**.
Brassica campestris perfoliata flo-
 re luteo, p. 29. n. 73. **Brassica**
 sylvestris foliis circa radicem
 cichoraceis, p. 29. n. 74.
Bromos herba, *vid.* **Festuca**, p.
 73. n. 180. **Bromos** sterilis,
ibid.
Bruncella major, *vid.* **Prunella**,
 p. 208.

INDEX LATINUS.

- p. 208. n. 573. Officina-
rum, *ibid.*
- Bryonia alba baccis nigris, p.
29. n. 75. Bryonia nigra, *ibid.*
- Bubonium luteum, *vid.* Aster.
- Buglossum vulgare, p. 29. n. 75.
Buglossa vulgaris, *ibid.* Bug-
lossum sylvestre flore albo,
p. 30. n. 77. Buglossum syl-
vestre minus alterum & aspe-
rius, p. 30. n. 78. Buglos-
sum sylvestre caulibus pro-
cumbentibus, p. 30. n. 89.
- Bugula, *vid.* Consolida.
- Buglossum sylvestre, *vid.* Echi-
um vulgare, p. 64. n. 154. a-
greffe, *ibid.*
- Bulbus sylvestris Tragi, p. 186.
n. 514. agrestis. *ibid.* escu-
lentus, *ibid.* Bulbus sylvestris
alius bifolius, *ibidem.*
- Bulegium agreste officinarum,
vid. Calamintha arvensis ver-
ticillata.
- Bunonium adulterinum, *vid.* E-
ruca lutea, p. 67. n. 165.
- Bupthalmum majus, *vid.* Bellis
major.
- Bupthalmum majus, *vide* Cha-
mæmelon inodorum.
- Buplevron, p. 278. n. 723.
- Bursa pastoris major, folio si-
nuato, p. 30. n. 80. Hæ-
morrhogię medetur, *ibidem.*
minor loculo oblongo, p. 31.
- Butomus, *vid.* Juncus, p. 131.
n. 365.
C.
- Calamintha arvensis verticillata,
p. 31. n. 82. herba magnæ
virtutis est, *ibid.*
- Calaminthæ primum genus, p.
162. n. 437. Calamintha
tertia s. Nepeta, *ibid.* mon-
tana Gattaria vulgo, *ibid.* Ca-
laminthæ tertium genus Dio-
scoridis, p. *ibid.* n. *ibid.*
- Calamogrostis quorundam, *vid.*
Gramen arundinaceum p. 119
n. 323.
- Calamogrostis secunda, *vid.* Jun-
cus p. 131. n. 365.
- Calamus aromaticus officinarum
p. 5. n. 6.
- Calathiana viola autumnalis *vid.*
Gentiana palustris p. 102. n.
268.
- Caltha palustris flore simplici,
p. 31. n. 83. Caltha in nume-
ro plurali genere neutro à Pru-
dentio usurpata, *ibid.* p. 32.
- Cameline p. 174. n. 483. Came-
lina s. Myagris, *ibid.* 484.
- Camelina Dodonæi seu Myagri-
on, *ibid.*
- Campanula vulgatiore foliis urti-
cæ, vel major & asperior, p.
32. n. 84. Campanula vul-
garis monoclonos foliis urti-
cæ, flore candido, p. 32. n. 85.

INDEX LATINUS.

- Campanula pratensis flore glomerato, p. 33. n. 86. Campanula oblongifolia flore cœruleo in summis cauliculis, p. 33. n. 87. Campanula oblongifolia flore albo in summis cauliculis, p. 33. n. 88.
- Campanula alba, *vid.* Convolvulus, p. 51. n. 131.
- Campanula sylvestris, *vid.* Digitalis, p. 61. n. 147.
- Campanula persicifolia nostras, *vel* persicæ folio, p. 229. n. 614. angustifolia, media, *ibid.* alba & cœrulea, p. 230. n. 614.
- Canis Plinii, p. 292. n. 757.
- Cannabina aquatica, *vid.* Eupatorium cann. p. 70. n. 174.
- Cannabina aquatica, *vid.* Conyza, p. 53. n. 137. & p. 54. n. 138.
- Cannabis erratica, foemella erratica paludosa sylvestris sterilis p. 33. n. 89. Decoctum hujus cannabis cimices necat. *ibid.*
- Cannabis spuria facie urticæ, p. 292. n. 758.
- Capnium phragmites majus, *vid.* Fumaria bulbosa, p. 78. n. 193. capnium phragmites minus, *ibid.* n. 194.
- Capnos fumaria, *vid.* Fumaria, p. 77. n. 192. Capnos chelidonia, *vid.* Fumaria bulbosa. p. 78. n. 193.
- Caput monachi, *vid.* Dens leonis p. 61. n. 165.
- Cardamine altera, p. 176. n. 490. simplici flore, *ibid.*
- Carduus in avena proveniens, p. 34. n. 90. avenarius, arvensis, *ibid.* Carduus lanceolatus latifolius, p. 34. n. 91. Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris, Carduus sylvestris tertius Dodonæi, p. 34. n. 92. Carduus spinosissimus angustifolius pratensis, p. 35. n. 93.
- Carduus, *vid.* Cnicus, p. 50. n. 127.
- Carduus fullonum, *vid.* Dipfascus p. 62. dicitur etiam carduus fullonius erraticus, *ibid.*
- Carex minor, *vid.* Gramen junceum spic. p. 114. n. 308.
- Carlina acavlos flore magno, p. 35. n. 94.
- Carlina sylvestris vulgaris, *vid.* Cnicus, p. 50. n. 127.
- Carpinus Theophrasti, *vid.* Eonymus, p. 70. n. 173.
- Carthamus, *vid.* Cnicus, p. 50. n. 127.
- Carum, Carvi officinarum. Caros, carus, vulgò Carvi, Careum, p. 36. n. 95.
- Caryophyllata vulgaris, p. 36. n. 96.

INDEX LATINUS.

- n. 96. aquatica nutante flore,
p. 37. n. 97. montana, palu-
stris, *ibid.* prolifera flosculis
elegantissimis, p. 37. n. 98. *16.*
Caryophyllus arvensis glaber flo-
re majore, p. 38. n. 99.
Caryophyllus arvensis hirsutus
flore majore, p. 39. n. 100.
holostius, *ibid.* flore minore,
p. 39. n. 101. Barbatus syl-
vestris, p. 39. n. 102. arven-
sis calyculo florum numeroso
p. 39. n. 103. minimus mu-
ralis, p. 39. n. 104. pluma-
rius albus, p. 39. n. 105. Syl-
vestris vulgaris angustifolius,
p. 40. n. 106. montanus al-
bus, *ibid.* montanus minor,
pratensis flore laciniato sim-
plici, p. 40. 41. n. 108.
Cassutha, *vid.* Cuscuta, p. 59. n.
141.
Cassutha Plinii, *vid.* Cuscuta, p.
59. n. 141.
Castor delectatur esu corticum sa-
licis, alni, & confimilium ar-
borum, p. 239. n. 637.
Catanance altera, *vid.* Balsami-
ne lutea.
Cattaria f. Mentha Catti. p. 161.
n. 437. Herba, *ibid.*
Cauda muris *vel* murina, *vide*
Holosteo affinis, p. 127. n.
352.
Ceanothus levis, *vid.* Grossularia
p. 121. n. 333. & p. seq.
n. seq.
Centaurium minus, Centaurea,
p. 41. n. 109. Centaurium
minus floribus albis, *ibid.* n.
110.
Centaurois, *vid.* Serratula.
Centiana minor, p. 101. n. 267.
Centinervia, p. 197. n. 542.
Centummorbia, Centmorbia, p.
177. n. 492.
Centumnodia, p. 201. n. 552.
Centunculus, *vid.* Alfine.
Centunculus, *vid.* Gnaphalium,
p. 107. n. 281.
Centunculus hirsutior, p. 13.
n. 28.
Cerasus avium Racemosa, p. 42.
n. 111. Cerasia racemosa ru-
bra, nigra, *ibid.*
Cerdopatium caule nullo, p. 35.
n. 94.
Cervicaria major, *vid.* Campa-
nula vulgarior.
Cervicaria tertia sive minor, p.
33. n. 86.
Cervi spina, p. 230. n. 615.
Chamæcerasus p. 42. n. 112.
Chamæcissus sive Chamæcissos
terrestris, vulgaris, *vid.* p. 123
n. 337.
Chamæcisi alterum genus, *vid.*
Consolida, p. 50. n. 128.
Chamæcistus vulgaris flore luteo
p. 43. n. 113.

INDEX LATINUS.

- Chamæcyparissus, p. 170. n. 464.
 Chamædaphne f. pusilla laurus,
 p. 138. n. 388.
 Chamædris spuria major altera
 seu frutescens, p. 43. n. 114.
 Chamælæa f. Mezereon, p. 138.
 n. 388. Germanica, *ibid.* no-
 stras, *ibidem*.
 Chamælema, *vid.* Hedera terre-
 stris, p. 123. n. 337.
 Chamæleon albus, p. 35. n. 94.
 Chamæmelum vulgare Leucan-
 themum, p. 44. n. 115. Cha-
 mæmelum foetidum, *ibid.* n.
 116. inodorum, p. 45. n. 117.
 Chamæmelum eranthemon, *vid.*
 Consolida, p. 51. n. 130.
 Chamæpeuce, p. 169. n. 463.
 Chamæpeuce, *vid.* Cistus Le-
 don, p. 49. n. 125.
 Chamærubus saxatilis, p. 234.
 n. 632.
 Chamomilla, *vid.* Chamæmelum.
 Chamomilla fatua, *vid.* Cha-
 mæmelon inodorum.
 Chelidonium majus vulgare, p.
 45. n. 118. Chelidonium mi-
 nus, p. 46. n. 119.
 Chelidonia rotundifolia minor,
 p. 46. n. 119. Chelidonia
 capnitis radice nigrâ, *vid.* Fu-
 maria bulbosa, p. 78. n. 194.
 Chelidonia palustris, *vid.* Caltha
 palustris.
 Χαλιδονίαν quid apud Veteres?
 p. 47. n. 119.
 Chenopodium, *vid.* Atriplex
 sylvestris latifolia.
 Chironium, Chironica, *vid.* Cha-
 mæcissus.
 Christophoriana, *vid.* Aconitum
 racemosum, 4.
 Chrysanthemum arvense, p. 25.
 n. 64. Chrysanthemum fo-
liis Tanacetii, p. 47. n. 120.
 Chrysanthemum, *vid.* Caltha
 palustris.
 Chrysanthemum segetum, *vid.*
 Bellis lutea major.
 Chrysocome, *vid.* Elichrysum,
 p. 64. n. 155. Chrysocome
 prima vulgaris, *ibid.*
 Chrysosplenion, *vid.* Saxifraga
 aurea.
 Cicercula sylvestris, p. 138. n. 385.
 Cicutaria palustris latifolia alba,
 48. n. 123. *tenuifolia*, *ibid.*
 n. 124.
 Cichoreum sylvestre, agreste of-
 ficinarum, p. 47. n. 121. Ci-
 choreum sylvestre flore albo,
 p. 48. n. 122. Cichorea, *ibid.*
 Cicutaria, p. 175. n. 486. Ci-
 cutaria palustris latifolia alba,
 p. 48. n. 123. *tenuifolia*, p.
 48. n. 124.
 Cicutæ potus, olim pœna, p. 48.
 n. 123.
 Circea, p. 256. n. 668. 669. 670.
 Cirsium, *vid.* Cnicus, p. 52.
 n. 127.
 Cir-

INDEX LATINUS.

- Cirsium Italicum, *vid.* Buglossum vulgare.
 Cistus Ledon, p. 49. n. 125.
 Clinopodium vulgare, majus, p. 49. n. 126. Origano simile, *ibid.*
 Climenum Matthioli, p. 138. n. 385.
 Cnicus sylvestris spinosior, p. 50. n. 127.
 Cnips quid. p. 260. n. 754.
 Colubrina, *vid.* Bistorta.
 Colus rustica, *vid.* Cnicus, p. 50. n. 127.
 Coma aurea, *vid.* Elychrysum, p. 64. n. 155.
 Consolida major, *vid.* Symphytum.
 Consolida media pratensis caerulea, p. 50. n. 128. purpurea, *ibid.* n. seq. regalis *vel* regia, p. 51. n. 130.
 Consolida minor, minima, p. 208. n. 573.
 Convolvulus major albus, p. 51. n. 131. minor, p. 52. n. 132. & seq. volubilis, *ibid.*
 Conyza ccerulea acris, p. 52. n. 134. Conyza aquatica, *it.* Helenitis, p. 53. n. 135. major, minor, minima, n. seq. palustris, n. 137. bidens *ibid.* & n. seq. Conyza palustris foliis tripartito divi-
lis, p. 34. n. 89. p. 53. n. 137. foliis serratis, p. 54. n. 138. *III.*
 Cornus foemina, p. 54. n. 139.
 Corona graminea qualis apud Romanos. p. 215.
 Corona qverna quanam apud Romanos? p. 215.
 Coroneola, *vid.* Genista, p. 101. n. 266.
 Coronopus sylvestris, *vid.* Holsteo affinis p. 127. n. 352.
 Corylus sylvestris, p. 55. n. 140.
 Coryli flores falsò creduntur esse Juli. *ibid.* p. 56. Juli ejus pictoribus & tinctoribus inferviunt *ibid.* Corylus in Prussia valdè frugifera, p. 55. n. 140. Pictoribus pulverem Schüttgelb dictum suppeditat, metallurgis virgam divinatoriam, *ibid.* p. 56. Corylus materies est virgulæ metallorum indagatricis, Wilmshel-Nut dictæ, p. 56. n. 140. Corylus eò fructuosior quò pejus tractatur, p. 57. n. 140.
 Cotula alba, foetida, *vid.* Chamamelum foetidum. Cotula inodora, *vid.* Chamamelum inodorum.
 Cõtyledon, *vid.* Sedum. (738.
 Cracca major, p. 184. n. 737.
 Crassula *vid.* Telephium.
 Crataegonon, p. 161. n. 435.
 Crepitus lupi, *vid.* Fungus non vescus XII. p. 90. n. 234.
 T t 3 Cru-

INDEX LATINUS:

- Crucialis, *vid.* Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus.
 Cruciata, *vid.* Centiana minor p. 101. n. 267. Cruciata gentianella, *ibid.*
 Crus Galli, *vid.* Gramen dactylon, p. 110. n. 289.
 Cuculi flos, p. 41. n. 108.
 Cuminum pratense, *vid.* Carum.
 Cuminum sylvestre, *vid.* Confolida, p. 51. n. 130.
 Cunila bubula Plinii p. 185. n. 512.
 Cunila sativa, *vid.* Satureja hortensis.
 Cupressus ac Pinus cariem ac vetustatem non sentiunt, p. 196. n. 540. causa *vid. ibid.* Pinus in Isthmicis ludis primum coronamentum, p. 197. *ibid.*
 Cuscuta major, p. 59. n. 141.
 Cuscuta officinarum, *ibid.*
 Cuscuta Matth. *ibid.*
 Cyanus segetum, p. 59. n. 142.
 coeruleus *ibid.* flos, vulgaris, major, coeruleus arvensis, *ibid.*
 flores cyani pictoribus & aliis colorem suppeditant, *ibid.* p. 60.
 Cyanus sylvestris, montanus, integrifolius, *vid.* Jacea latifolia p. 129. n. 358.
 Cyanus sylvestris major arvensis *vid.* Scabiosa major.
 Cymbalaria, *vid.* Telephium.
 Cynanche, p. 203. n. 556.
 Cynocrambe foemina, *vid.* Mercurialis, p. 163. n. 440.
 Cynoglossa minor, *vid.* Echium Scorp. p. 64. n. 153.
 Cynoglossum majus vulgare, p. 60. n. 143. item Cynoglossus vulgaris, *ibid.* cum flore, *ibid.* minus n. seq. 144.
 Cynorrhodos procerior, p. 232. n. 618.
 Cynosbatus Theoph. *vid.* Mespilus, p. 163. n. 441.
 Cynosbatus Diosc. p. 231. n. 618. Cynosbatus procerior, p. 232. n. 618.
 Cynosorchis palustris laevi folio & angusto, p. 181. n. 504.
 Cyperella Cordi, *vid.* Gramen exile, p. 118. n. 319. Pseudocyperi species pumila, *ibid.*
 Cytisus, p. 273. n. 713. lac auget, p. 273. n. 713.
 D.
 Damasonium tenuifolium, *vid.* Helleborine, p. 124. n. 341.
 Damasonium callyphyllon, *vid.* Helleborine latifol. p. 124. n. 339.
 Daphnodes, p. 138. n. 388.
 Daucus officinarum, *vid.* Pastinaca sylvestris, p. 188. n. 522 vulgaris, *ibid.*
 Daucus Selinoides, p. 195. n. 538.

INDEX LATINUS.

- Delphinium, vulgare, *vid.* Con-
solida p. 51. n. 130.
- Densleonis, p. 61. n. 145. lati-
ore folio, *ibid.* vulgi, *ibid.*
- Dentaria heptaphyllos, p. 61. n.
146. baccifera, bulbifera,
ibidem. Dentaria major, *vid.*
Orobanche, p. 187. n. 517.
Matthioli, *ibid.*
- Diapensia, *vid.* Sanicula.
- Digitalis flore luteo p. 61. n.
147. magnò flore, *ibid.*
- Dipsacus sylvestris, p. 62. n. 148
purpureus, primus, *ibid.*
- Disphendomen, quale genus sup-
plicii fuerit, p. 290. n. 753.
Dracontium palustre, *vid.*
Dracunculus, p. 62. n. 149.
- Dracunculus palustris, p. 62. n.
149. aquaticus vel aquatilis,
ibid. palustris minor, *ibidem.*
pratensis, p. 63. n. 150.
- Dracunculus major, *vid.* Bistor-
ta major.
- Dulcamara, p. 257. n. 670.
E.
- Ebulus five Sambucus humilis,
p. 243. n. 639. Ebulus gli-
res & mures fugat, p. 243. n.
638. Ebuli oleum corticum
radicum vermes expellit ex-
ternè inunctum, p. 243. n.
639. Ebuli radix amuletum
in ulceribus sordidis, p. 243.
n. 639.
- Echium scorpioides arvense, p.
63. n. 151. flosculis niveis,
n. 152. palustre, p. 64. n.
153. Echium vulgare, p.
64. n. 154. floribus pur-
purantibus, *ibid.* Echium Ita-
licum, spinosum, *Vide* Bu-
glossum vulgare.
- Ελάτη, *Vid.* Abies.
- Elatine, *Vid.* Convolvulus mi-
nor, p. 52. n. 133.
- Elatine, *Vid.* Cynoglossum, p.
60. n. 144.
- Elaphobosum, *Vid.* Pastinaca
sylvestris, p. 189. n. 524. Er-
raticum. *ibid.*
- Elenium, enula, campana enula,
Vide Helenium vulg. p. 123.
n. 338.
- Eleoselinum, *Vid.* Sion.
- Elichrysum, p. 64. n. 154.
- Elleborine, *vid.* Helleborine, p.
123. n. 339.
- Empetron, p. 202. n. 554.
- Emplastrum Lœselii ex Alno mi-
rabile, p. 10. 11. n. 19.
- Enophyllum. p. 179. n. 499.
- Epactis recentiorum, *Vid.* Hel-
leborine p. 123. n. 339. lati-
folia, *ibid.* p. seq.
- Epimedium, p. 275. n. 717.
- Equisetum palustre, p. 65. n.
156. sylvaticum, *ibid.* n. 157.
palustre, n. seq. tertium, n.
158. foliis nudum, non ra-
mosum

INDEX LATINUS.

- p. 66. n. 159. itemque ramosum, n. seq. Equisetum foetidum sub aquâ, p. 66. n. 161. pini foliis simile, *ibid.*
- J. 12.* Equisetum foliis bifurcis sub aquâ repens, p. 67. n. 162.
- Equorum morbus, dictus *Wurst.* *J. 14.* *Gucht.* p. 5.
- Erica vel Erice vulgaris glabra, p. 67. n. 163. folio myricæ, *ibid.* vulgarior, *item* prior, *ibid.* baccifera tenuifolia p. 67 n. 164.
- Erica baccifera latifolia, p. 189. n. 750.
- Ericoides rubrum, *Vid.* Euphrasia pratensis p. 72. n. 178.
- Erigeron, *Vid.* Senecio.
- Erigerum quantum, *Vid.* Conyza p. 52. n. 134.
- Eriophoron gramen, *Vid.* gramen pratense, p. 14. n. 307.
- Eruca lutea latifolia sive barbarea, p. 67. n. 165. Barbarea foemina, *ibid.* Eruca sylvestris minor, p. 68. n. 166. palustris minor, *ibid.* maritima vulgò marina, n. seq. napi flore, *ibid.*
- J. 13.* Eruca sylvestris minor altera foliis subasperis in orbem sparsis, p. 68. n. 167. sylvestris major iisdem quidem foliis ast multum luxuriantibus *ibid.* n. seq. Erucas sentiunt sæpissimè folia Nymphææ, p. 178. n. 493.
- Ervilium, p. 138. n. 385.
- Eryngium maritimum vel marinum, p. 69. n. 170.
- Erysimum p. 69. n. 171. vulgare, *ibid.* Dioscoridis, *ibid.* nostras, *Vid.* hirsutum n. seq.
- J. 14.* Erysimum hirsutum siliquis Erucæ, p. 69. n. 172.
- Evonymus vulgaris, p. 70. n. 173. Theophrasti, *ibid.*
- Eupatorium cannabinum *vid.* Conyza palustris, p. 54. n. 138.
- Eupatorium Cannabinum, p. 70. n. 174. Avicennæ, seu vulgare, adulterinum, Mas, *ibid.* Cannabinum alterum flore candido, p. 71. n. 175. Eupatorium Veterum, *ibid.* n. seq. Dioscoridis & aliorum Græcorum vulgare, *ibid.*
- Euphragion, *Vid.* Euphrasia, p. 71. n. 177. Euphragia altera major, *ibid.*
- Euphrasia sive Euphrosine officinarum, p. 71. n. 177. ocularis Argentinensium, *ibidem.* Pratensis rubra, p. 72. n. 178. Euphrasia altera Dodonæi, *ibid.* Euphrasia cœrulea, *Vid.*
- Echium Scorp. p. 64. n. 153.
- Euphrasia gramen, *Vid.* Caryophyllus arvensis glaber.
- F.
- Faba inversa, *Vid.* Telephium. Fagus p. 72. n. 178. Fa-

INDEX LATINUS.

- Fagus Sepium*, vid. *Ostrya*, p. 188. n. 520.
- Farfara*, *Vid.* *Tussilago*.
- Farfugium*, *Vid.* *Caltha palustris* flore simplici.
- Favagello*, *Vid.* *Chelidonia rotundifolia minor*.
- Festuca avenacea sterilis elatior*, p. 72. n. 180. lolii primum genus, & vitium plerumque hordei est. *ibid.*
- Filago sive impia*, *Vid.* *Gnaphalium* p. 107. n. 281. major, *ibid.* n. 282. minor, *ibid.* n. seq.
- Filicula*, p. 204. n. 559. *Filicula petraea foemina*, *vid.* *Filix ramosa*, p. 74. n. 184.
- Filipendia*, p. 73. n. 181.
- Filipendula prima & saxifraga rubra*, *vid.* *Filipendia*, p. 73. n. 181. *Filipendula vulgaris*, *ibid.*
- Filix non ramosa dentata*, p. 73. n. 183. vulgaris, mas secunda, foemina, mascula, *ibid.* *Filix ramosa major*, p. 74. n. 183. foemina sylvestris, mas major, ejus primum genus; *ibid.* *Filix ramosa pinnulis dentatis*, p. 74. n. 184. *Filix altera tenuifolia*, *ibid.* *Filix palustris maxima*, p. 74. n. 185.
- Filum marinum*, p. 74. n. 186.
- Fistularia*, *vid.* p. 190. n. 526.
- Flammula*, p. 221. n. 598. folio ferrato. p. 224. n. 404.
- Flammula Ranunculus quartanae medetur* externè. Internè contra Scorbutum. p. 224. n. 604.
- Flos ambarvalis*, p. 200. n. 539.
- Flos hepaticus*, *vid.* *Gramen Parnassi*, p. 108. n. 284.
- Flos regius vel sylvestris*, *vid.* *Consolida*, p. 51. n. 130.
- Flos tinctorius*, *vid.* *Genista tinctoria*, p. 101. n. 266.
- De fluminibus retandis publice redemptis*, p. 240. n. 637.
- Foeniculum aquaticum galericulatum*, p. 164. n. 444. *foeniculum aquaticum secundum* p. 166. n. 448.
- Folliculus marinus*, p. 75. n. 187.
- Forbesina Bononienfis*, *vid.* *Conyza palustris*, p. 53. n. 137.
- Formentone*, *vid.* *Convolvulus minor*, p. 52. n. 133.
- Fraga fructu rubro*, *vid.* *Fragaria vulgaris*, p. 75. n. 188.
- Fragaria vulgaris*, p. 75. n. 188. major, *ibid.* cauliculis maximè reptantibus, *ibid.* n. 189.
- Fragula*, *vid.* *Fragaria vulgaris*, p. 75. n. 188.
- Fragum*, *vid.* *Fragaria vulgaris*, p. 75. n. 188. *Fraga vindemiam quomodo polliceantur*, *ibid.*

INDEX LATINUS.

Frangula, *vid.* Alnus nigra bac-
cifera, p. 11. n. 20. Frangu-
læ cortex interior luteus vim
Catharticam obtinet, *ibid.*
Frassinella, p. 200. n. 550.
Fraxinus, p. 76. n. 199. excel-
sior, *ibid.* Fraxini lignum
certò modò cæsum vulnera
sympatheticè curat, p. 76.
n. 190.

Frixago palustris, *vid.* Scordium
Fucus marinus, *vid.* Alga marina
Fucus marinus, p. 77. n. 191.

Fucus maritimus, p. 216. n. 585
Fucus ex anchusæ radice & ap-
paratus metricius artificiosus
lepidè describitur, p. 143.
n. 400.

Fumaria bulbosa seu tuberosa mi-
nima, p. 220. n. 594.

Fumaria. p. 77. n. 192. fumaria
officinarum & Dioscoridis,
ibid. bulbosa major p. 77. n.
193. fumaria altera Matth.
ibid. bulbosa radice non cavâ.
p. 78. n. 194.

Fumus terræ, *vid.* Fumaria, p.
77. n. 192.

Fungi vesci 28. non vesci 42.
reperiuntur à p. 79. ad p. 99.

Fungus ovatus, *vid.* Fungus non
vescus XII. p. 90. n. 234.

Fungus foetidus penis imaginem
referens, *vid.* Fungus non
vescus XIII. n. 235.

Fungus Sambucinus, *vid.* Fun-
gus non vescus XIV. p. 91.
n. 236. Fungus ad Sambu-
cum, *ibid.*

Fungus membranaceus auricu-
lam referens sive sambucinus
vid. Fungus non vescus XIV.
p. 91. n. 236.

Fungus virilis penis arrecti fa-
cie, *vid.* Fungus non vescus
XIII. p. 91. n. 235.

Fungus biorchis anthracinus, *vid.*
Fungus non vescus XXV. p.
95. n. 247.

Fungus granulofus corallinus,
vid. Fungus non vescus XXXII
p. 96. n. 254. Fungus gra-
nulofus incarnatus, p. 97.
n. 255.

Fungus racemofus vetustis lignis
adnatus, *vid.* Fungus non ve-
scus, p. 96. n. 253.

Fungus cucullatus, *vid.* Fungus
non vescus XXXV. p. 97.
n. 257.

Fungus farreus. *vid.* Fungus non
vescus, p. 97. n. 258.

Fungus pyxioides coccineus, *vid.*
Fungus non vescus XXXIV.

p. 97. n. 256. Fungus pyxi-
oides feminifer, p. 98. n. 263.

Fungus digitatus alveariorum,
vid. Fungus non vescus XLII.
p. 99. n. 264.

INDEX LATINUS.

Fungos circa quâ diatâ opus sit?
p. 79. n. 195. p. 87. n. 222.
Fusterna quid? p. 1. n. 1.

G.

Galega altera vel sylvestris, p.
284. n. 734.

Galeopsis Matthioli, *vid.* Lami-
um, p. 133. n. 372. Diosco-
ridis vera, *ibid.* & n. 373. vul-
garis, foetens, purpurea, se-
cunda, *ibid.* flore croceô luteô
p. 134. n. 374. legitima vel
vera, *ibid.* n. seq.

Galion album quorundam, p.
166. n. 449. Gallion candi-
dô flore, *ibid.* Gallion terti-
um, *ibid.* Gallion album, *ibid.*
Gallium flore albô, *ibid.*

Galion, *vid.* Gallium, p. 100.
n. 265. Galion luteum, *ibid.*

Galla, fructus quercus, p. 211.
n. 584. varia plebi progno-
stica præbet, *ibid.*

Galli Crus, p. 221. 598.

Gallinaceus pes, *vid.* Fumaria
bulbosa, p. 78. n. 193.

Gallion luteum, *vid.* Gallium,
p. 100. n. 265.

Gallium luteum, p. 100. n. 265.
flore luteo primum. *ibid.* flo-
re luteo, *ibid.* Galli primum
genus, *ibid.* Gallium luteum
multis medicis, præfagis eti-
am pollet virtutibus, p. 101.

n. 265.

Gallium album latifolium, p.
166. n. 449. Gallium flore
albô. *ibid.* Gallium album
palustre, p. 18. n. 44.

Gariofilata, *vid.* Caryophyllata,
Gariofillata, *vid.* Caryophyllata
Gattaria herba, p. 161. n. 437.
Genista tinctoria Germ. p. 101.
n. 266. vulgaris. *ibid.*

Genistella infectoria vulgi, *vid.*
Genista, p. 101. n. 266. Ge-
nistella tinctoria, *vid.* *ibid.*

Gentiana minor, *vid.* Centiana
minor, p. 101. n. 267. Genti-
ana cruciata, *vid.* *ibid.* cru-
ciata recentiorum. *ibid.* Gen-
tiana III. item III. cruciana,
ibid. media, *ibid.* Palustris
angustifolia p. 102. n. 268.
quarta, *ibid.* minima, Genti-
anæ 4. species. *ibid.*

Geranium batrachioides, p. 102.
n. 269. Geranii species tertia
ibid. Geranii batrach. cæru-
leum, it. flore albô, *ibid.* foliô
Aconiti, p. 102. n. 270.

Geranium columbinum, p. 102.
n. 271. foliô malvæ rotundô,
ibid. Geranii vulgaris species
ibid. Geranium alterum, item
secundum, *ibid.* alterum Di-
oscoridis, *ibid.* Malvaceum
sive Balsaminum, *vid.* Gera-
nium columbinum, p. 103.
n. 271. Geranium columbi-

Uu 2

num

918

INDEX LATINUS.

num erectum, *ibid.* n. seq.
719. procumbens tenuius lacinia-
tum, p. 104. n. 273. cicuta
foliò moschatum & inodo-
rum, *ibid.* n. seq. primum,
supinum, majus, *ibid.* Gera-
nium myrrhinum, item mu-
scatum, *σκανδικόφυλλον, vid.*
Geranium cicuta foliò, p. 104.
n. 274. cicuta foliò minus
& supinum, p. 104. n. 275.
minus & primum, *ibid.* ar-
vense, *ibid.* septimum fixe
gruinum, *ibid.* p. 105. n.
276. Moscatum inodorum,
ibid. Rupertianum, *ibid.* ter-
tium, primum, *ibid.* p. 105.
n. 276.

Gerhardi Herba, p. 16. n. 40.
Geum rivale, *vid.* Caryophyllata
aquatica.

Gladiolus floribus uno versu di-
spostitis major, p. 105. n. 277
Gladiolus verus, item Germa-
nicus, sylvestris, *vid. ibid.*
Narbonensis, *ibid.*

Gladiolus palustris, *vid.* Juncus,
p. 131. n. 365. aquatilis, *ibid.*

720. Glaux aquatica, p. 106. n. 278.
exigua maritima, *ibid.* An
glaux Dioscoridis, *ibid.* ma-
rina minor, *ibid.*

Glessum quid. p. 216.

Glossularia multiplici acinò, sive
non spinosa, p. 121. n. 333.

non spinosa fructu nigro, *ibid.*
n. 334. sylvestris rubra, p.
122. n. 335.

Glyzyrrhiza siliquosa, *vid.* Ger-
manica, p. 106. n. 279. alte-
ra, vulgaris, *ibid.*

Gnaphalium montanum, p. 106.
n. 280. flore rotundò, pur-
pureum & album, *ibid.* sive
rubens, p. 107. *ibid.* vulgare
majus, minus, *ibid.* majus al-
terum, p. 107. n. 282. Angli-
cum vel Belgicum, *ibid.* me-
dium, *ibid.* n. 283. Gnapha-
lion. *vid.* Gramen pratense
p. 114. n. 307. Gnaphalium
Hieronymi Bockii, *ibid.*

Gorcho, quale antiquorum Prus-
forum Deastrum, p. 213. n. 584

Graminis 49. species à p. 107.
ad p. 121.

Gramen Parnassi vel Parnassum,
p. 107. n. 284. hederaceum,
recentiorum, *ibid.* p. seq.

721. Gramen manna, p. 108. n.
285. Diversum est à gramine
mannæ esculentò Lob. *ibid.*
Manna quomodo ad edendum
præparetur, *vid. ibid.* Gra-
men officinarum p. 109. n.
286. caninum sive Dioscori-
dis, item, canarium, medica-
tum officinarum, *vid. ibid.*

Gramen caninum supinum mi-
nus p. 109. n. 287. secundum
ibid.

INDEX LATINUS.

- ibid.* geniculatum caninum
marinum vel maritimum, i-
tem spicatum, *ibid.* caninum
tertium, *ibid.* Gramen da-
ctylon, p. 109. n. 289.
- Gramen montanum, p. 110. n. 122,
290. arvense duplicis gene-
ris, *ibid.* n. 291. & seq. cri-
statum, *ibid.* n. 293. monta-
num aliud p. 111. n. 294.
Pratenſe, *ibid.* n. ſeq. minus
vel ſecundum, *ibid.* Panicu-
latum, *ibid.* n. 296. Gramen
Mariæ Boruſſorum, *ibid.* n. 126
297. paniculatum odoratum
ibid. Gramen ſegetum vel ſe-
getale, n. ſeq. ſegetale aliud,
p. 112. n. 299.
- Gramen pratenſe tertium, *vid.*
Gramen ſegetum p. 112. n.
299. harundinaceum arven-
ſe, loliaceum, gramen agro-
rum, vel agrorum venti ſpica.
ibid. leporinum, tremulum,
tremulum majus, p. 112. n.
300. loliacei decimum ge-
nus, *ibid.* Gramen Caryophyl-
latum polycarpon, *ibid.* n. 127
301. montanum an ſpica
variâ. *ibid.* Gramen hirsutum
nemoroſum, item piloſum,
vel latifolium majus, p. 113.
n. 302.
- Gramen thyphoides maximum,
p. 113. n. 303. aſperum pri-
mum, item typhinum pri-
mum, *ibid.* n. 304. thypho-
ides ſpica anguſtiore, alopecu-
roides minus vel alopecuri-
num ſecundum, *ibid.* n. 305.
thyphoides culmò reclinatò,
ibid. n. 306. alopecurinum
tertium, it. alopecuroides mi-
nus, *ibid.* Gramen pratenſe
tomentoſum p. 114. n. 307.
tomentarium, pratenſe, junce-
um lanigerum, *ibid.*
- Gramen junceum ſpicatum p.
114. n. 308. marinum ſpi-
catum, *ibid.* mixtum ex jun-
co & gramine *ibid.* junceum
folio artic. ſylv. *ibid.* n. 309
junceum ſylvaticum, *ibid.*
junceum aquaticum, *ibid.* n. 128.
310. junceum ſemine acumi-
natò, p. 115. n. 311. junce-
um ſextum, nemoroſum, epi-
gonatocavlon, *ibid.* n. 312.
Cyperoides paluſtre majus,
p. 115. n. 313. Cyperinum
minus, *ibid.* Gramen Cype-
roides paluſtr. ſpica pendulâ
p. 116. n. 314. cyperoides
minus ſpica diviſâ, *ibid.* n. 129.
315. ſpiciſ curtis divuſſis, p. 117.
n. 316. ſpica varian-
te, *ibid.* n. 317. exile ſpiciſ
nigriſ, *ibid.* n. 318. exile
hirsutum, p. 118. n. 319.
hirsutum capituliſ Pſyllii,
ibid.

INDEX LATINUS.

ibid. Cyperinum pilosum,
ibid. hirsutum repens, p. 118
n. 320.

Gramen arundinaceum enode
majus montanum. p. 118. n.

321. minus sylvaticum p.

119. n. 322. arundinaceum

paniculâ molli spadiceâ ma-

jus *ibid.* n. 323. loliacei 8vi

alia species *ibid.* tomentosum

ibid. Gramen palustre panicu-

latum altissimum, p. 119. n.

324. aquaticum panic. arun-

dinaceum, *ibid.* Gramen a-

rundinaceum foliis acutissimis

paniculâ multiplici, p. 119.

n. 325. arundinaceum pani-

ceum divisâ paniculâ *ibid.* n.

326. paniceum spinâ simplici

p. 120. n. 327. panici effigie

& simplici spinâ, *ibid.* Gra-

men panicum spicâ aristis

longis armata, p. 120. n. 328.

paniceum secundum, *ibid.* pa-

nici effigie cum aristis, *ibid.*

Marinum spicâ fecalinâ p. 120.

n. 329. latifolium spicâ triti-

ceâ divulsâ, *ibid.* n. 330.

Gramen loliaceum spicâ lon-

giore, p. 121. n. 331. mon-

tanum avenaceum spicatum,

ibid. n. 332. sylvaticum se-

cundum, item, montanum

spicatum, *ibid.*

Gramen Levcanthemum flori-

dum, *vid.* p. 38. n. 99.

Gramen Mannæ esculentum Pru-
tenicum, quomodo præpare-
tur? p. 108. n. 285.

Gramen Polyanthemum minus,
vid. Caryophyllus montanus
minor.

Gratia DEI, *vid.* Geranium Ro-
bertianum, *vid.* p. 105. p. 276

Grossularia, *vid.* Glossularia.

H.

Halimus, *vid.* Chamæcerasus.

Harundo, *vid.* Arundo.

Hedera helix, p. 122. n. 336.

pervoluta sterilis Hedera,

ibid. Hedera species tertia,

item arboreæ sylvestre genus,

major sterilis, *ibid.* Hedera

terrestris, *ibid.* n. 337. vulga-

ris terrestris, humilis, hederula

corona terræ, *ibid.* p. 123.

Hedypnois, *vid.* Dens leonis, p.

61. n. 165.

Helenium vulgare, p. 123. n. 338.

item Helenion, *ibid.*

Helianthemum Plinii, *vid.* Cha-

mæcissus.

Helichryson, *vid.* Elichrysum, p.

64. n. 155.

Heliochrysos sylvestris *vid.* Gna-

phalium, p. 107. n. 281.

Heliotropium minus, *vid.* Echi-

um scorpioides, p. 63. n. 151.

Helix *vid.* Hedera p. 122. n.

336.

Helleborine latifolia p. 123. n.

339.

INDEX LATINUS.

339. recentiorum secunda,
ibid. montana, n. 340. angu-
 stifolia, quinta, sexta recentio-
 rum, p. 124. n. 341. angusti-
 folia pratensis, *ibid.* n. seq.
 Helxine cissampelos, *vid.* Con-
 volvulus, p. 51. n. 131. & seq.
 Helxine sylvestris sive fluvia-
 tilis, p. 256. n. 668.
 Hemeris, p. 211. n. 584.
 Hemerocallis flore rubello, p.
 140. n. 394. Herbariorum,
 p. 141. n. *ibid.*
 Henricus bonus, sive tota bona,
 spinaciæ facie, Dodonæi, *vid.*
 Lapathum, p. 136. n. 381.
 Hepatica alba, *vid.* Gramen
 Parnassi p. 107. n. 248.
 Hepatica aurea, nobilis p. 275.
 717.
 Hepatica palustris, *vid.* Saxifra-
 ga aurea.
 Hepatica stellata, *vid.* Asperula.
 Hepatorium aquaticum. p. 34.
 n. 89. Hepatorium aquatile,
vid. Conyza, p. 53. n. 137.
 Hepatorium vulgare, *vid.* Eu-
 patorium cann. p. 70. n. 174.
 Heptaphyllum, *vid.* Tormen-
 tilla.
 Heraclea. *vid.* Lamium, p. 134.
 n. 375.
 Herba Gerhardi, p. 16. n. 40.
 Herbarum proventus in areis
 hortorum quomodo impedi-
 endus? p. 293. n. 759.
 Herculis simulacrum ex abiete
 confectum p. 2. n. 1.
 Herniaria, p. 202. n. 554. mul-
 tigrana serpilli facie, *ibid.*
 Hieracium foliis & facie Chon-
 drillæ, Lobelii, folio hirsutum,
 secundum, p. 124. n. 343.
 Hieracium Chondrillæ folio
 glabrum, *ibid.* Aphacoides,
ibid. p. 125. Hieracium phlo-
 moides, p. 125. n. 345. alpi-
 num latifolium Pannonicum,
 primum latifolium, *ibid.* mon-
 tanum, latifol. non sinuatum,
ibid. n. 346. montanum hir-
 sutum ramosum, *ibid.* n. 347.
 Hieracium montanum latifo-
 lium glabrum minus, p. 126.
 n. 348. alterum grandius *ibid.*
 n. 349. montanum angusti-
 folium fruticosum majus, pri-
 mum, Sabaudum, tertium vel
 tertii generis, *ibid.* Hieraci-
 um dentis leonis folio mono-
 clonon, *ibid.* n. 350. inty-
 baceum, *ibid.* foliis oblongis,
 in ambitu aculeatis, monoclo-
 non, Joh. Læf. *ibid.* n. 351.
 Hieracium majus, *vid.* Dens le-
 onis, p. 61. n. 105. minus
 vel parvum, *ibid.*
 Hippia, *vid.* Alfine.
 Hippolapathum minus. *vid.* La-
 pathum, p. 135. n. 378. syl-
 vestre, n. seq.
 Hip-

INDEX LATINUS.

- Hippuris minor*, *vid.* *Equisetum sylvestre*, p. 65. n. 157. *major*, *nuda*, *major altera*, p. 66. n. 159.
- Hirundinaria*, *vid.* *Asclepias* & *Chelidonium*.
- Hirundinare*, *quid?* *apud veteres*, p. 47. n. 119.
- Holosteum Dioscoridis floribus albis*, *vid.* *Caryophyllus arvensis glaber flore majore*. *Holostium Caryophyllæum*, *vid.* *Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore*.
- Holosteum vel Holostium*, *vid.* *Gramen junceum sextum*, p. 115. n. 312.
- Holosteo affinis*, p. 127. n. 352. *item*, *Holosteon vel Holostium Loniceri*, *ibid.*
- Holostium Lacunæ*, p. 194. n. 535.
- Hydrolapathum*, *magnum sive aquaticum sylvestre*, *vid.* *Lapathum* p. 135. n. 377. *minus*, *ibid.* n. 378.
- Hydropiper*, *vid.* p. 191. n. 528
- Hyoscyamus albus*, *candidus*, *alterum genus in maritimis*, *item*, *secundus*, p. 127. n. 353.
- Hypericum*, *vulgare & herba perforata*, *vid.* p. 127. & *seq.* n. 354.
- Hypogenista*, p. 186. n. 515.
- Hyssopus campestris*, *montanus*, *sylvestris*, *vid.* *Chamæcissus*.
- Hyssopus agrestis*, *vid.* *Satureja hortensis*.
- I.
- Jacea*, p. 257. n. 741.
- Jaceanigra major*, *squamosâ capite*, *montana prima*, *Austriaca prima*, p. 128. n. 355. *flore albâ*, *ibid.* n. *seq.* *Jacea laciniata squamata*, *tertia Cretica* p. 129. n. 357. *latifolia capite hirsutâ*, *austriaca secunda*, *montana villosâ capite*, *quarta elatior*, *ibid.* n. 358. *latifol. cap. hirsuto flore albâ* *ibid.* n. 359.
- Jacobeæ vel Jacobææ vulgaris*, *laciniata*, *item herba Jacobææ*, *Jacobææ senecio*, p. 129. n. 360. *flos Jacobæus*, *ibid.*
- Jacobæa Barbareæ instar laciniata* p. 129. n. 361.
- S. Jacobi Flos sive herba*, *item Flos Jacobæus*, *vide Jacobæa* p. 129. n. 360.
- Iberis Nasturtii foliâ* p. 130. n. 362. *item Iberis secunda*.
- Icteri cura magnetica*, p. 48. n. 121.
- Ilex urbe Româ vetustior*, p. 213. n. 584.
- Impia Plinii*, *vid.* *Gnaphalium* p. 107. n. 281. *vel impia herba*, *ibid.*
- Intybum & Intubum agreste sylvestre*, *vid.* *Cichoreum sylvestre*. *Inu-*

INDEX LATINUS.

Inula, *vid.* Helenium p. 123.
n. 338.

Jovis barba, *vid.* Sedum majus.
Ips qualis vermiculus ? p. 291.
n. 754.

Irio, *vid.* Erysimum, p. 69. n.
171.

Iris pratensis angustifolia humi-
lior, p. 130. n. 363. tenui-
folia, undecimæ altera species,
angustifoliæ secundæ species
altera, *ibid.* Ischæmon Plinii,
item vulgare, *ibid.* Gramen
dactylon, p. 110. n. 289.

Isopyron, *vid.* Trifolium palu-
stre.

Juncus palustris major, maximus,
aquaticus maxim9, holoschœ-
nos grandis, levis aquaticus,
rotundus tertius, p. 130. n.
364. floridus, major n. seq.
cyperinus, cyperoides palu-
dosus & floridus, *ibid.* p. 131.
lævis paniculâ non sparsâ,
ibid. n. 366. palustris minor
ibid.

Juncus bombycinus, *vid.* Gra-
men pratense. p. 114. n. 307.

Juncus λυχνάριον major,
vid. Gramen arundinaceum,
p. 118. n. 321. tenuis minor,
p. 119. n. 322.

Juncellus Cyperoides capitulô
simplici, p. 131. n. 367.

Juniperus fruticosa, p. 131. n.

n. 368. vulgaris, it. baccifera,
minor, primum genus, humi-
lis, nostras, *ibid.* vulgaris ar-
bor, p. 132. n. 369. vulgaris
cellior & arborefscens, *ibid.*

K.

Kali foliô gramineô, p. 132.
n. 370. spinoso affinis, p. 133.
n. 371.

Κόβαλοι, Germ. Kobold qui-
nam olim dicti dæmones vi-
sibiles, p. 241. n. 638.

S. Kunigundis herba p. 70. n.
174. dicta prima, *ibid.*

L.

Labrum Veneris *vid.* Dipsacus
p. 62. ejus species *ibid.*

Lactuca agnina, p. 278. n. 723.

Lactucella, p. 194. n. 536.

Lagopodium flore luteo, p. 144.
n. 399.

Lagopus p. 274. n. 714.

Lagopus, *vid.* Gnaphalium, p.
106. n. 280.

Lamium purpureum & album
non foetens p. 133. n. 372.

album & purpureum, *ibid.*

primum, *ibid.* purpureum foe-

tidum, p. 133. n. 373. luteum,

foliô oblongô, p. 134. n. 374.

flore luteô, *ibid.* maximum,

sylvestre foetidum, *ibid.* n. 375

minus folio caulem ambiente,

n. seq.

Lam-

INDEX LATINUS.

Lampſana p. 228. n. 610. flore
melinô. *ibid.*

Lampſana ſylvatica, p. 259. n.
679.

Lancea Chriſti, p. 179. n. 499.

Lanceola, p. 198. n. 543. mi-
nor, *ibid.* n. ſeq.

Laparſum, *vid.* Acetoſa,

Lapathum aquaticum folio cu-
bitali ſive magnum, p. 135. n.
377. ſativum, paluſtre, *ibid.*

aquaticum minus, *ibid.* n.

378. foliô ſubrotundô, n.

379. foliô minus acutô, vel
retuſô, *ibid.* Lapathum foliô

acuto, p. 135. n. 380. unctu-
oſum, p. 136. n. 381.

Lappa major, purp. perſonata,
vel perſonatia, p. 136. n. 382.

Lappa major candida, p. 137. n.
383. minor, *ibid.* n. 384.

Lathyris latiore folio, p. 138. n.
385. Lathyris Narbonenſis,
ibid.

Lathyrus latifolius p. 138. n. 385.
minor, *ibid.*

337 Lathyrus Anguſtifolius, p. 138.
n. 386. Lathyrus ſylveſtris,
ibid. n. 387.

Laureola folio deciduo flore pur-
pureo p. 138. n. 388.

Laurus puſilla, p. 138. n. 388.

Ledum Sileſiacum, *vid.* Ciſtus,

Ledon. p. 49. n. 125.

Ledum temulentiam accerſit, p.

49. n. 125. Ledum in haram
congeſtum porcos à phthyriafi
curat, *ibid.*

Legumen Leoninum, p. 186. n.
515.

Leonina herba, p. 186. n. 515.

Leontopetalon alterum, *vid.* Fu-
maria bulbôſa, p. 78. n. 193.

Leontopodium alterum vulgare
vid. Gnaphalium p. 107. n.
282.

Lepores Chelidonii quid? p. 47.
n. 119.

Leptophylla omnium viliffima,
p. 181. n. 504.

Lens major repens, p. 274. n. 715.

Lenticula paluſtris vulgaris, p.
139. n. 389. Aquatica *ibid.*

Lenticula aquatica triſulca,
ibid. n. 390. paluſtris bifolia

338 *ibid.* n. 391. Lenticula pa-
luſtris anguſtifolia, p. 140.
n. 392.

Leucas montana, *vid.* Lamium
p. 134. n. 374. quarta, *ibid.*
n. 376.

Libanotis alba, *Vide* Sefeli Æthi-
opicum.

Lichen petræus latifolius, p. 140.
n. 393.

Licopodium & Lycopodium, p.
169. n. 463.

Liliago cordi, p. 193. n. 533,

Lilium floribus reflexis alterum.
lanugine hiruſutum, p. 140. n.

INDEX LATINUS.

394. *Lilium montanum*, *ibid.*
Saracenicum, *ibid.* purpureum mas, *ibid.* *Lilium convallium album*, p. 141. n.
 95. *Lilium convallium minus*, *ibid.* n. 396.
Limodoron, seu *Orobanche*, p. 186. n. 515.
Limnopleuce, *Vid.* *Equisetum palustre*, p. 65. n. 158.
Limonium, sylvestre, p. 210. n. 577.
Limonium pratense, *Vid.* *Trifolium palustre*.
Limonium, *vid.* *Bistorta*.
Linaria vulgaris lutea flore majore, p. 142. n. 397. *Linaria maritima floribus odoratis*, *ibid.* n. 398. *Linaria quinta*, p. 174. n. 484.
Lingva avis, *Vide* *Fraxinus*, p. 76. n. 190.
Lingva passerina, *vide* *Fraxinus* p. 76. n. 190.
Lingva serpentina, p. 179. n. 499
Lingula vulneraria, p. 179. n. 499.
Linum pratense, *vid.* *Gramen pratense*, p. 114. n. 307.
Liquiricia, *vid.* *Glyzyrrhiza*, p. 106. n. 297.
Λιθοσπέρων p. 172. n. 475.
Lithospermum majus erectum, p. 142. n. 399. arvense, radice rubra, p. 143. n. 400.
Lolium decimum. *vid.* *Gramen leporinum*, p. 112. n. 300.
Lolium 6. & *Miliaria herba Plinii*, p. 120. n. 327. *Lolium & triticum temulentum*, p. 121. n. 331.
Loto affinis vulneraria pratensis, p. 144. n. 401. *Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra*, p. 145. n. 402. *Lotus coronata*, *ibid.* *Lotus urbana*, p. 161. n. 436. *Lotus sylvestris*, *ibid.*
Lotus palustris, *vid.* *Trifolium palustre*.
Lunaria græca nostras, p. 145. n. 403. *Lunaria racemosa*, p. 146. n. 404. *Lunaria botrytis polyphyllus*, *ibid.*
Lupulus mas, p. 146. n. 405.
Lupulus sativus & sylvestris, *ibid.* *Lupulus salictarius* *ibid.*
Lupulus foemina, p. 147. n. 406.
Lusus Augusti nucibus ocellatis & quales hæ fuerint, p. 57. n. 140. quomodo ludicræ præterea rei materia sit, *ibid.*
Luteola herba salicis folio, p. 147 n. 407.
Lychnis sylvestris alba simplex, p. 147. n. 408. *Lychnis sylvestris floribus purpureo-rubentibus*, p. 148. n. 409.
Lychnis sylvestris rubra, *ibid.*
Lychnis sylvestris rubello flore,

INDEX LATINUS.

re, *ibid.* Lychnis sylvestris
aquatica purpurea simplex,
ibid. Lychnis segetum major
p. 148. n. 410. Lychnis ar-
vensis, *ibid.* Lychnis inter tri-
ticum, *ibid.* Lychnis sylve-
stris Beenalbum vulgò p. 148
n. 411. Lychnis sylvestris vi-
scosa rubra angustifolia, p.
149. n. 412. Lychnis sylve-
stris purpurea, *ibid.* sylvestris
quarta, *ibid.* Lychnis sylve-
stris flore incarnato, *ibid.*
Lychnis viscosa flore musco-
so, p. 149. n. 413. Lychnis
sylvestris viscosa foliis Otiti-
dis, p. 150. n. 414.

Lycopsis *vid.* Buglossum sylve-
stre minus.

Lycopsis, *vid.* Echium vulgare
p. 64. n. 154.

Lycostaphylon foemina, *vid.* Sam-
bucus aquatica.

Lyfimachia lutea major, p. 150.

n. 415. Lyfimachia lutea com-
munis *ibid.* Lyfimachium lu-
teum, *ibid.* Lyfimachia pri-
ma, *ibid.* Lyfimachia vera,
ibid. Lyfimachia lutea salica-
ria, *ibid.* purpurea, p. 153. n.

415. Lyfimachia Communis
perpetua major, *ibid.* Lyfi-
machia bifolia flore globoso
luteo, p. 151. n. 416. Lyfi-
machium aquatile, *ibid.* Ly-

simachia filiquosa hirsuta ma-
gnò flore p. *ibid.* n. 417. Ly-
simachia purpurea, *ibid.* Ly-
simachia filiquosa prima, *ibid.*
Lyfimachia vel salicaria pri-
ma, *ibid.* Lyfimachia filiquo-
sa hirsuta parvo flore, p. 151
n. 418. Lyfimachia filiquosa
secunda, *ibid.* Lyfimachia fi-
liquosa glabra major, *ibid.*
Lyfimachia filiquosa flore al-
bò, p. 152. n. 419. Lyfima-
chia glabra minor, p. 152.
n. 420. Lyfimachia filiquosa
glabra minor flore albo, p. 152
n. 421. Lyfimachia Chamæ-
nerion dicta latifolia, p. 152.
n. 422. Lyfimachia Antonia-
na, *ibid.* Lyfimachia spicata
purpurea fortè Plinii, p. 152.
n. 423. Lyfimachia purpurea
ibid. Lyfimachia spicata cœ-
rulea, p. 153. n. 424. Lyfi-
machia cœrulea hortensis,
quorundam veronica recta. *ib.*

Lyfimachia cœrulea galericulata
p. 155. n. 425. Lyfimachia
galericata, *ibid.* Lyfimachia
hirsuta purpurea flore galeri-
cato, p. 156. n. 426.

M.

Malva sylvestris folio sinuato, p.
156. n. 427. Malva sylvestris
major, *ibid.* Malva agrestis
major, *ibid.* Malvæ vulgaris
al-

INDEX LATINUS.

- altera species, *ibid.* Malva sylvestris procerior vulgaris, *ibid.* Malva vulgaris major, *ibid.* Malva sylvestris elatior, *ibi* l. Malva sylvestris recta, *ibid.* Malva sylvestris rotundo folio p. 157. n. 428. Malva sylvestris pumila, *ibid.* vulgatissima, *ibid.* Malva minor *ibid.* Malva vulgaris minor, *ibid.* Malva sylvestris minor *ibid.* sylvestris recens pumila *ibid.* Malva agrestis minor, *ibid.* Malva sylvestris supina, *ibid.*
- Malus sylvestris minor p. 157. n. 429. Mala sylvestria, *ibid.* Malus sylvestris major alba, *ibid.*
- Malum cur homini os claudat, Mala verò aperiant? *vid.* p. 158. n. 429,
- Manna, quomodo ad edendum præparetur, *vid.* Gramen Man-
næ, p. 108. n. 285.
- Maratriphyllum palustre alterum p. 165. n. 446.
- Marrubium album vulgare, p. 158. n. 430. Marrubium vulgare, *ibid.* Marrubium album, *ibid.* Marrubium candidum, *ibid.* Marrubium cras-
sum, *ibid.* Marrubium album odorum, *ibid.* Marrubium nigrum foetidum, p. 159.
- n. 431. Marrubium majus, *ibidem.*
- Marrubium Cardiaca dictum p. 159. n. 432. Marrubium palustre glabrum p. 160. n. 433. Marrubium Aquaticum, *ibid.* Marrubium Aquaticum vulgi, *ibid.*
- Matrisylva, *vid.* Asperula.
- Medica frutescens, *vid.* Trifolium sylvestre luteum.
- Melampyrum luteum latifolium p. 160. n. 435. Melampyrum purpurascens comâ, p. 160. n. 434. Melampyrum primum p. 161. n. 435.
- Melilotus officinarum germaniæ p. 161. n. 436. Melilotus Germanica flore luteo, *ib.* Melilotus vulgaris major, *ibid.* Melilotus vera, *ibid.*
- Melissa sylvestris, p. 159. n. 432.
- Membrum virile priscis temporibus Veneri & Baccho sacrum, variis afficiebatur honoribus, p. 91. n. 235.
- Mentha Cataria vulgaris & major, p. 161. n. 437. Mentha felina, *ibid.* Mentha sylvestris folio longiore, p. 162. n. 438. Mentha sylvestris altera, *ibid.*
- Menthastrum vel mentha sylvestris altera, p. 162. n. 438. Menthastrum sylvestre, *ibid.*

INDEX LATINUS.

Mercurialis spicata seu foemina,
p. 162. n. 439. **Mercurialis**
vulgaris & prima, *ibid.*

Mercurialis montosa spicata, p.
163. n. 440. sylvestris foe-
mina, *ibid.* Mespilus apii fo-
lio sylvestris spinosa, p. 163.
n. 441.

Μήτρα vocabulum æquivocum,
p. 243. n. 638.

Militaris, 164. n. 442. Milita-
ris seu millefolium flore pur-
pureo, *ibid.* n. 443.

Millefolium vulgare album, p.
164. n. 442. vulgare, *ibid.*
terrestre vulgare Dioscoridis,
ibidem. flore albò seu mi-
litaris, *ibidem.* album, *ibidem.*
Stratiotes millefolia, *ibid.*
terrestre majus, *ibid.* millefo-
lia stratiotes *ibid.* Millefo-
litum & Achillæa. *ibid.* Mille-
folium, *ibid.* Achillæa, *ibid.*
Millefolium purpureum 164.
n. 443. purpurei floris, *ibid.*

vulgare purpureum minus,
ibid. Terrestre purpureis flo-
ribus, *ibid.* millefolium mi-
nus, *ibid.* Vulgare flore diluti
ruboris, *ibid.* Rubrò colore,

Millefolium aquaticum lenti-
culatum, p. 164. n. 444.
Aquaticum filamentis folia-
ceis. p. 164. n. 446. Aqua-
ticum flore luteo galericulato

ibid. n. 444. Millefolium a-
quaticum flosculis ad foliorum
nodos, p. 165. n. 445. Mil-
lefolium aquaticum foliis foe-
niculi, ranunculi flore & capi-
tulo, p. 165. n. 446. Mille-
folium aquaticum pennatum
spicatum, *ibid.* n. 447. fla-
mentis foliaceis, *ibid.* Mille-
folium aquaticum seu viola
aquatica caule nudo, *ibid.* p.
166. n. 448. (555.

Millegrana minima, p. 202. n.
Moly montanum, p. 9. n. 17. 18
Mollugo montana angustifolia,
Mollugo vulgatio herbario-
rum, Mollugo prima, mollu-
go montana seu secunda. p.
166. n. 449.

Μονόφυλλον bulbosa p. 180. n.
501.

Monorchis flosculis pallidè viri-
dibus, p. 184. n. 510.

Moschatella Cordi, p. 220. n.
594.

Morsus Diaboli *vid.* Succisa.

Morsus Gallinæ *vid.* p. 134. n.
376.

Morsus Gallinæ folio hederulæ,
p. 13. n. 28.

Morsus Ranæ, p. 178. n. 496.

Mulieres olim faciem fucabant
succo mororum acidorum p.
233. n. 619.

Multibona seu Veeltgutta, *vid.*
Api-

INDEX LATINUS.

- Apium montanum, & Oreoselinum, p. 18. n. 45.
 Muscus terrestris vulgaris, p. 166 n. 450. palustris, *ibid.* vulgarissimus, *ibid.* Hortensis, *ibid.* Pennatus, p. 167. n. 451. Pennatus tectis vetustis insidens, p. 167. n. 452. Muscus pennatus major cauliculis ramosis in summitate velut spicatus p. 167. n. 453. Muscus pennatus minor cauliculis ramosis in summitate velut spicatus p. 167. n. 454. Muscus filicinus minor repens, *ibid.* n. 455. Muscus bifolius procumbens foliis subrotundis p. 167 n. 456. Muscus ramosus erectus oblongifolius p. 168. n. 457. Muscus erectus foliis in orbem sparsis, p. 168. n. 458. Muscus uvida amans foliis subrotundis expansis, p. 168. n. 459. Muscus Cupressiformis ramosus p. 168. n. 460. Muscus membranaceus pilosus, *ibid.* n. 461. Muscus erectus ramosus saturè viridis p. 169. n. 462. Muscus terrestris globatus p. 169. n. 463. terrestris, *ibid.* terrestris sive Lycopodium, *ibid.* Musci genus prospicà celticà, p. 169. n. 463. Muscus clavatus foliis cupressi, p. 170. n. 464. Muscus coralloides muralis, p. 170. n. 465. Muscus pyxidoides terrestris, p. 171. n. 466. Muscus terrestris pyxidatos alabastriculos imitatus, *ibid.* n. 466. Muscus terrestris coralloides erectus incanus, p. 171. n. 468. Muscus pyxidoides saxatilis, *ibid.* n. 467. Muscus terrestris coralloides erectus cornibus rufescentibus, *ibid.* n. 469. Muscus arboreus pyxidoides pilosus, *ibid.* n. 470. Muscus capillaceus cinerei coloris è ramis ilicis dependens, *ibid.* n. 471. Muscus capillaceus longissimus, *ibid.* Muscus arboreus, *ibid.* n. 472. Muscus arborum, *ibid.* Muscus quernus, *ibid.* Muscus pulmonarius sive pulmonaria officinarum, p. 172. n. 473. Muscus pulmonarius corpusculis fuscis papillatus, *ibid.* n. 474. Muscus marinus λιτοπώγων dictus, *ibid.* n. 475. Muscus marinus capillaceus *ibid.* n. 476. Muscus aquaticus ceratoides, *ibid.* n. 477. Muscus aquaticus denticulatus, p. 173. n. 478. Muscus aquaticus bombycinus retiformis, p. 173. n. 479. Muscus aquaticus bombycinus tenuissimis filamentis, *ibid.* n. 480. Muscus aquaticus tenuissimis foliis cauliculis adhaerens.

INDEX LATINUS.

hærentibus, *ibid.* n. 481. Muscus aquaticus subterraneus, *ibid.* n. 482. Muscus quidam incognitus cubito longior ex puteo egestus, *vid.* p. 174. n. 482.

Myagrûm filiquâ longâ, p. 174. n. 483. Alterum Thlaspi effigie, *ibid.* Myagrûm secundum *ibid.* Myagrûm sativum, *ibid.* n. 484. Myagrûm primum, *ibid.* Myagrion sive Camelina, *ibid.* Myagrûm monospermon hirtutum filiquis rotundis, *ibid.* n. 485.

Myosotis hirsuta reptans, *vid.*

Echium p. 63. n. 151. Myosotis scorpi. p. 64. n. 153.

Myosuros vel Myosuron, *vid.*

Holosteio affinis, p. 127. n. 352.

Myriophyllum, p. 177. n. 491.

Myriophyllum aquaticum minus, p. 165. n. 445. Myriophyllum, *ibid.* n. 446. Myriophylli species coliculis fluitantibus, *ibid.* n. 446. Myriophyllum alterum equisetifolium fluviatile, p. 166. n. 448. Myriophyllum alterum, *ibid.*

Myrrhida Plinii, *vid.* Geranium cicutæ folio moschatum, p.

104. n. 274. & n. seq.

Myrrhis sylvestris seminibus lævibus, p. 175. n. 486. Myr-

rhis, *ibid.* sylvestris, *ibid.* seminibus asperis, *ibid.* n. 487. nova Æquicolorum, *ibid.* inodora, *ibid.* n. 488.

Myrtillus p. 288. n. 748. Myrtillus exiguus, p. 289. n. 749. N.

Napellus, *vid.* Aconitum cœruleum, p. 5. n. 8.

Napeta vulgaris, p. 161. n. 437.

Napeta fruticosa, *ibid.* Napeta Germanica. *ibid.*

Nasturtium aquaticum, p. 175.

n. 489. Et secundum, *ibid.*

supinum, *ibid.* Pratense, *ibid.*

n. 490. Pratense magno flore, *ibid.* Aquaticum simplici

flore, agreste, *ibid.* Sylvestre

tenuissimè divisum, *ibid.* 491.

Nasturtium *μυρίσφυλλον*, p.

177. n. 491.

Nasturtium palustre, *vid.* Eruca

lutea, p. 68. n. 165. hybern-

um, *ibid.*

Nenuphar luteum, p. 177. n.

493. Nenuphar album, *ibid.*

n. 495.

Neottia, p. 184. n. 511.

Nepeta agrestis, *vid.* Calamin-

tha arvensis verticillata.

Noli me tangere, *vid.* Balsamine

lutea.

Nummularia major lutea, p. 177

n. 492. Nummularia, *ibid.*

Nummularia sive Centmor-

bia, *ibid.* Nux

INDEX LATINUS

Nux avellana, sylvestris agrestis, pontica, *vid.* Corylus, p. 55. n. 140. est admodum fructifera, *ibid.* quatuor earum differentia, *ibid.* cur nuces olim in nuptiis sparserint, p. 57. n. 140. Nuces in epulò sartorum amygdalarum locò appositæ, *vid.* Historia p. 58. Nux miraculum præbuit *ibid.* & seq.

Nux quadruplex in Prussia observatur p. 55. n. 140. Nux varios ludos antiquis subministravit. *ibid.* p. 57. Nuces spargere quid? *ibid.*

Nux sympatheticè melancholiam curat, p. 57. n. 140. Nux ridiculam aliquando Regiomonti præbuit historiam. *ib.* p. 58.

Nux post mortem alicujus miraculum præbuit, p. 58. n. 140.

Nymphæa lutea major p. 177. n. 493. Lutea *ibid.* Citrina *ibid.* altera flore extoto luteò *ibid.*

Nymphæa lutea minor parvo flore *ibid.* n. 494. Nymphæa parva alia *ibid.* Nymphæa lutea minor septentrionalium *ib.*

Nymphæa alba major, *ibid.* n. 495. alba *ibid.* candida *ibid.* Nymphæa alba, lotus

Ægyptia Alpini, major alba, *ibid.* Alba minima *ibid.* n. 496. Alba minor, *ibid.*

O.

Ocimastrum verrucarium, p. 256. n. 668.

Ocimastrum alterum, *vide* Scrophularia.

Ocimum vulgatius, p. 179. n. 497. Medium vulgatius, *ibid.* Ocimum medium, *ibid.* magnum *ibid.* mediocre, *ibid.* tertium & medium, *ibid.*

Oculus bovis, *vid.* Bellis major.

Ocymastrum sive Ocimoides, p. 147. n. 408.

Ocymoides rubrum, p. 148. n. 409. Ocymoides purpureum vel roseum, *ibid.*

Odontis, Odontitis, p. 41. n. 108.

Odontitis Plinii, p. 41. n. 108.

Oenanthe, *vid.* Filipendia, p. 73. n. 181. Oenanthe filipendula, item vulgaris, *vid.* *ibid.*

Oleaster Germanicus, p. 231. n. 616.

Onagra campestris hirsuta, p. 151. n. 417.

Onitis major, p. 185. n. 512.

Onobrychis floribus vicia dilutè cæruleis, p. 179. n. 498 secunda, *ibid.* Clusii secunda, *ibid.*

Ononis, *Vid.* Anonis spinosa, p. 16. n. 41. Ononidis radix medetur calculo, Ictero,

INDEX LATINUS.

Hydropi omnesque viscerum infarctus expedit, p. 17.

n. 41. Ononis in hortis coli non debet, *ibid.* quænam optima? *ibid.*

Ophioglosson, p. 179. n. 499. vulgatum, *ibid.* Ophioglossum *ibid.*

Ophris bifolia, 180. n. 500.

T. 57. Ophris $\mu\omicron\nu\epsilon\phi\upsilon\lambda\lambda\alpha$ bulbosa,

T. 58. *ibid.* n. 501. Ophris $\delta\upsilon\phi\upsilon\lambda\lambda\alpha$ bulbosa, *ibid.* n. 502

Ophris bifolia bulbosa, *ibid.*

Orchis alba bifolia minor calcare oblongo, p. 181. n. 503. Or-

chis bifolius, *ibid.* Orchis flore albo minor, *ibid.* Orchis

serapias primus, *ibid.* Orchis palmata palustris tertia, *ibid.*

n. 504. Orchis palmata pratensis maculata, *ibid.* n. 505.

Orchis serapias Lobelii, *ibid.*

T. 59. Orchis palmata flore galericulato dilute viridi, p. 182.

n. 506. Orchis palmata palmis inversis flore albo, *ibid.*

n. 507. Orchis muscam referens major, p. 183. n. 508.

Orchis myodes altera, *ibid.*

T. 60. Orchis muscæ corpus referens

T. 61. maculosa, *ibid.* n. 509. Orchis Coleo unicò seu Monorchis

flosculis pallide viridibus

p. 184. n. 520. Orchis abortiva fusca, *ibid.* n. 511. Orchis

abortiva, *ibid.* Orchis sylve-

stris, *ibid.* Orchis abortiva Lobelii. *ibid.*

Oreoselinum, p. 18. n. 45.

Origanum vulgare, p. 184. n.

512. Origanum sylvestre, p.

185. n. 512. Oryganum 185

n. 512. Oryganum Italicum,

ibid. Oryganum sylvestre al-

bum, p. 186. n. 513. Origa-

num album sylvestre flore al-

bo, *ibid.* Origanum minus,

Vid. Clinopodium p. 49. n.

126. item Verticillatum, *ibid.*

Ornithogalum luteum, p. 186.

n. 514.

Ornus, *vid.* Ostrea, p. 188. n. 250.

Orobanche major garyophyllum

olens, p. 188. n. 515. Oro-

banche, *ibid.* Orobanche ve-

ra, *ibid.* Orobanche prima,

ibid. Orobanche secunda,

ibid. Orobanche seu Limod-

doron, *ibid.*

Orobanche $\mu\omicron\nu\epsilon\phi\upsilon\lambda\lambda\alpha$ radice

acuminata, p. 187. n. 516.

radicè dentatâ major, *ibid.* n.

seq. Orobanche, *vid.* Con-

volvulus minor arvensis, p.

52. n. 133.

Orobus sylvaticus purpureus ver-

nus, p. 187. n. 518. pannoni-

cus primus *ibid.* viciæ foliis

p. 187. n. 519. pannonicus

secundus, *ibid.*

Orobus sylvestris, *vid.* Vicia se-

pium. *Ostrea*

INDEX LATINUS.

- Ostrya ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis, p. 188. n. 520.
- Otites Lychnidis sylvestre genus p. 149. n. 413.
- Oxygalis, *vid.* Acerosa, 1.
- Oxycantha, *vid.* Mespilus, p. 163. n. 441. acuta spina, *ibid.* Matthioli, Dioscoridis, & Plinii spina appendix, *ibid.*
- Oxycoccus, Oxycoccum, p. 289 n. 751.
- Oxytriphylon, p. 274. n. 716. P.
- Palma Christi palustris secunda, p. 181. n. 504. Palma Christi maculata, *ibid.* n. 505. Palma Christi, *ibid.* Palma officinarum Christi, *ibid.* Palma Christi, p. 182. n. 504.
- Panicastrum, *vid.* Gramen panicum, p. 120. n. 329.
- Panis forma seu figura olim varia fingebatur, p. 271. n. 705
- Papaver erraticum majus, p. 188 n. 521. erraticum rubrum, *ibid.* Papaver Rhæas, *ibid.* rubrum, *ibid.* erraticum primum, *ibid.*
- Papaver spumeum seu Ocymastrum alterum, p. 148. n. 411.
- Paralysis herba, *vid.* Primula veris, p. 279. n. 725.
- Parietaria sylvestris secunda, p. 161. n. 435. Parietaria sylvestris Eystett. *ibid.*
- Paris herba, p. 257. n. 671.
- Paronychia, *vid.* Bursa Pastoris minor.
- Pastinaca sylvestris tenuifolia, p. 188. n. 522. Dioscoridis, *ibid.* Matthioli, *ibid.* erratica, p. 189. genuina, *ibid.* altera, *ibid.* n. 523.
- Pastinaca sylvestris, p. 189. n. 524. Arabum, p. 190. latifolia, *ibid.*
- Pedicularia lutea, *vid.* Pedicularis pratensis, p. 190. n. 525. Pedicularis pratensis lutea, p. 190. n. 525. secunda, *ibid.* purpurea, *ibid.* n. 526. altera *ibid.* campestris prior, *ibid.* candida, p. 191. n. 527.
- Pentaphyllum (lon) vulgare, p. 216. n. 586. primum & secundum, *ibid.* minus, *ibid.* majus, p. 217. *ibid.* minus luteum, *ibid.* Pentaphyllum majus vulgare, p. 216. 217. n. 586. Epilepsie medetur, *ibid.*
- Percunos qualis Prussorum antiquorum Deaster? p. 214.
- Perfoliata Mascula, p. 180. n. 500. Perfoliata napifolia siliquosa, p. 29. n. 73.
- Periclymenum, *vid.* Chamæcerasus.
- Perficaria urens, p. 191. n. 528. prima, primum genus, mordax,

INDEX LATINUS.

- dax, *ibid.* mas, *ibid.* mitis, maculosa & non maculosa, n. 529. altera, *ibid.* minor, p. 192. n. 530. pumila, pusilla repens, *ibid.* Persicaria siliquosa, *vid.* Balsamine lutea.
- Pes columbinus, *vid.* Geranium columbinum, p. 102. n. 271.
- Pes Leonis, *vid.* Alchimilla.
- Petasites major & vulgaris, p. 192. n. 531. florens & sine flore, flore punicante, mas *ibid.* minor, p. 193. n. 532. albo flore, candido, foemina & Leucanthemos, *ibid.*
- Peucedanum aquaticum, p. 165. n. 446.
- Phalangium non ramosum, p. 193. n. 533. parvo flore, cauliculis simplicibus, *ibid.*
- Phalaris pratensis minor, *vid.* Gramen leporinum, p. 112. n. 300.
- Phellandrium, *vid.* Cicutaria palustris tenui folio.
- Phragmites, *vid.* Arundo.
- Phu, *vid.* Valeriana.
- Phyllitis lacustris p. 206. n. 564
- Phyllon Thalygonon Theophrasti p. 162. n. 439.
- Φύσινξ quid propriè significet? p. 9. 10. n. 18.
- Phytovma foliis rapunculi, p. 228 n. 611. Matthioli, p. 229. n. 614.
- Picea, *vid.* Abies, p. 1. n. 1.
- Pilosella, p. 193. n. 534. [major altera, *ibid.* repens hirsuta, n. 535. prima, *ibid.* media, p. 194. n. eod. minus hirsuta, vulgò, p. 194. n. 536.
- Pilosella minor, *vid.* Gnaphalium montanum, p. 107. n. 280. Pilosella Dodonæi, *ibid.*
- Pimpinella saxifraga major umbellâ candidâ, p. 194. n. 137. magna, p. 195. *ibid.* nostras communis major, vulgaris major, *ibid.* Saxifraga minor p. 195. n. 538. nostras communis minor, *ibid.* hircina, parva, tertia species, hircina minor, Germanica minor, saxifraga altera, *ibid.* Sangvisorba major, *ibid.* n. 539. major altera Italica, ejusque secundum genus, *ibid.* p. seq.
- Pinus sylvestris sive pinaster, p. 196. n. 540. sylvestris montana, sponte proveniens, *ibid.*
- Piper montanum, p. 138. n. 388
- Pirola, p. 209. n. 577.
- Pistilochia, *vid.* Fumaria bulbosa, p. 77. n. 193.
- Pisum marinum, p. 197. n. 541.
- Plantæ siccatae plerumque citius nigrescunt parte pronâ, quàm aversâ. p. 160. n. 432.
- Plantago latifolia sinuata, p. 197. n. 542. major, latifolia lævis, rubea, polycopos major, *ibid.* Angustifolia major,

INDEX LATINUS.

- jor, p. 198. n. 543. Planta-
go quinquenervia lanceolata,
minor, *ibid.* angustifolia mi-
nor, *ibid.* n. 544. penta-
copos minor, *ibid.* latifolia
glabra, minor, *ibid.* n. seq.
Plantago latifolia incana, p.
198. n. 546. major, incana,
media, Dodonæi secunda, mi-
nor Dioscoridis *ibid.* p. seq.
aquatica, latifolia, p. 199. n.
547. aquatica, foliis Betæ aut
Plantaginis, flore albi Galli,
ibid. aquatica leptomacro-
phyllus, *ibid.* n. seq. 762
- Plantaria, Plantanaria, *vid.* Spar-
ganium.
- Platanus ingens, p. 213. n. 584
- Pneumonanthe, *vid.* Gentiana,
p. 102. n. 268. Cordi, *ibid.*
- Podagraria, p. 16. n. 40.
- Podagræ remedium ex verbasco
p. 280. n. 726.
- Pœna olim adulteri, p. 227.
n. 607.
- Polemonium primum Dodonæi
p. 149. n. 411.
- Polycantha Theophrasti p. 34.
n. 92.
- Polycmenum, *vid.* Clinopodi-
um, p. 40. n. 126.
- Polygala vulgaris, p. 199. n.
549. minor, *ibid.* Polyga-
lon, sive Polygala recentio-
rum rubeis & albis floribus,
p. 200. n. 539. flore rubro
purpurascente, & flore caru-
leo, *ibid.* Polygala Tragi,
carulea, purpurea, alba, *ibid.*
Polygonaton & Rosa Mariana
quinta, p. 149 n. 411.
- Polygonatum, latifolium, vulga-
re, vel vulgatius, majus, p.
200. n. 550. baccis nigris,
ibid. angustifolium non ra-
mosum p. 201. n. 551. an-
gustifolium primum, *ibid.*
polygonatum quintum, alte-
rum, tenuifolium, erectum,
minus, rubris foliis, ambitu
stellato, tenuifolium majus
ibid. Polygonon I. Polygo-
num latifolium p. 201. n. 552,
mas, vulgare, masculum, ma-
jus, *ibid.* oblongo, angustô
foliô p. 202. n. 553. tertium
ibid. minus, *ibid.* n. seq. mi-
nimum, p. 202. n. 555. mi-
nus polycarpum p. 203. n. 556
foemina, angustissimo & acu-
tô vel gramineô folio, *ibid.*
foliis gramineis n. 557. *ibid.* 763
fol. gramin. alterum, p. 204. 764.
n. 556. Polygonum sive Po-
lyganus foemina, *vid.* Equi-
setum palustre, p. 65. n. 158
& seq. sangvinalis foemina,
ibid. semine vidua, *ibid.*
- Polypodium, p. 204. n. 559.
vulgare, majus, *ibid.*

INDEX LATINUS.

Poly spermon, *vid.* Blitum Poly-
spermon.

Polytrichon, *vid.* Adiantum.

Populago, *vid.* Caltha palustris.

Populus nigra, p. 204. n. 560.
alba, *ibid.* p. seq. tremula,
p. 205. n. 561. lybica, nigra
similis in alpinis, populi ter-
tia species, *ibid.*

Potamogeton rotundifolium, p.
205. n. 562. rotundiore fo-
lio, *λεῖοφυλλον* *ibid.* rotun-
difolium alterum, *ibid.* n. 563
J. 65 *Salticis folio. ibid.* n. 564. Po-
tamogeton, angustifol. fonta-
lis & spicata, *τρίφυλλον*, p.
206. *ibid.* foliis latis splendē-
tibus, *ibid.* n. 565. altera, *μα-
λακόνφυλλον*, *ibid.* Potamo-
geton foliis crispis, p. 206. n.
566. *ἐλῶφυλλον*. seu crispum
aut fimbriatum, *ibid.* gra-
mineum latifolium, *ibid.* n.
J. 66 567. gramineum tenuifoli-
um, *ibid.* n. 568.
J. 67

Potentilla p. 206. n. 569.
repens hirsutia incana, p. 207.
n. 570. erecta major, *ibid.*
n. seq.

Potentilla plantula in jus eunti-
bus à Sagis commendatissima
p. 207. n. 569.

Potollo, quale antiquorum Pruf-
sorum Deastrum? p. 213.
n. 584.

Potrympo qualis Prussorum De-
aster? p. 214.

Prædium, ejus etymologia, p.
269. n. 700.

Primula veris, *vid.* Bellis sylve-
stris minor. Primula veris
hortensis, p. 279. n. 725.

Promachium Festum apud Lace-
dæmonios, p. 19. n. 48.

Propolis apum natales, p. 25. n.
66. lac imminuit, *ibid.* ar-
thritidis dolores discutit, *ibid.*

Prunella, *vid.* Consolida, p. 50.
n. 128.

Prunella p. 208. n. 573. flore
purpureo, vulgaris vel sexta,
ibid. Officinarum, *ibid.* flo-
re albô, p. 209. n. 574.

Prunus sylvestris, p. 207. n. 572
vulgaris, *ibid.*

Pseudocrania, *vid.* Cornus p.
55. n. 139.

Pseudohepatorium, *Vid.* Conyza
p. 53. n. 137.

Pseudolysimachium purpureum,
p. 152. n. 419.

Pseudolysimachium cæruleum,
p. 155. n. 424.

Pseudomelanthium, p. 148. n.
410. Pseudomelanthium flo-
re rubescente, *ibid.*

Pseudomelus, *vid.* Caryophyl-
lus montanus minor.

Pseudomyagræm, p. 174. n. 484.

Pseudoorchis p. 180. n. 500.
Pseu-

INDEX LATINUS.

Pseudostruthium, p. 147. n. 407.
 Ptarmica sive Ptarmice, *vid.*
 Dracunculus Pratenfis, p. 63.
 n. 156. Ptarmica Fuchfi,
 fylvestris, item vulgaris, *ibid.*
 Pteridion masculum, *vid.* Filix
 ramosa, p. 74. n. 184.
 Pulegium montanum, *vid.* Cli-
 nopodium, p. 49. n. 126.
 Pulicaria mascula, p. 91. n. 528.
 foemina, n. 528.
 Pulmonaria p. 172. n. 473. Pul-
 monaria tertia, *ibid.* Pulmo-
 naria secunda, *ibid.* Pulmo-
 naria vulgaris *ibid.* Pulmona-
 ria Lichenis quoddam genus,
 ibid. Pulmonaria latifolia,
 vid. Symphytum maculosum.
 Pulsatila vulgaris, p. 209. n.
 575. recentiorum, commu-
 nis, flore crassiore & majore
 dilutiore, *ibid.* foliò Anemo-
 nes secund. n. seq.
 Pulvis argentum constanter de-
 aurans, p. 45. n. 118
 Pycnocomus, p. 16. n. 40.
 Pyra sylvestria, p. 211. n. 583.
 majora *ibid.*
 Pyrola, rotundifolia major, p.
 209. n. 577. à pyri folio, p.
 210. *ibid.* major, vulgati-
 or, in campestribus alia, *ibid.* ro-
 tundifolia minor, *ibid.* n. 578
 quarta minima, *ibid.* *acuti-*
 folia geniculatâ radice, *ibid.*

p. 210. n. 579. folio mucro-
 nato serrato, *ibid.* n. 580. mi-
 nor, secunda tenerior, *ibid.*
 Pyrola frutescens arbuti folio
 p. 211. n. 571. alfines flore
 Europæa, *ibid.* n. seq.
 Pyrus sylvestris, p. 211. n. 583.

Q.

Quercus, p. 211. n. 584. cum
 longo pediculo, vulgaris, pan-
 nonica latifolia, *ibid.* marina
 p. 216. n. 585. maritima ve-
 ficulas habens, *ibid.* Quercus
 ingens olim in Prussia Idolo-
 latrica, p. 213. n. 584. Quer-
 cus ultra ter centum annos
 durat, *ibid.* p. 213. Quercus
 fascino impotentiam creat,
 p. 214. Quercus asylum an-
 tiquis, p. 214. à quercu lo-
 qui quid? p. 214. Empla-
 strum ex quercu Lœselii, p.
 212. n. 584.

Quinquefolium majus repens, p.
 216. n. 586. vulgare quartum.
 majus luteum, *ibid.* majus
 repens luteum, p. 217. n. 587.
 minimum genus vel primum,
 ibid. minus luteum, *ibid.* mi-
 nus repens lanuginosum lute-
 um, minus, *ibid.* n. 588. quin-
 quefolii quarti flavo flore pri-
 ma species & secunda, *ibid.*
 Quinquefolium erectum lute-
 um, p. 118. n. 589. hirsutum

lu-

INDEX LATINUS.

luteum, *ibid.* n. 590. palustre rubrum, *ibid.* n. 591.

R.

Radicula magna, p. 226. n. 607

Radicula sylvestris, p. 227. n.

608. radix sylvestris p. 228. n. 610.

Radix dulcis, communis, *vid.*

Glyzyrrhiza, p. 106. n. 279.

Radix cava, item Radix cava major, *vide* Fumaria bulbosa p. 77. n. 193. radix cava herbariorum, *ibid.* & p. seq.

Ranunculus nemorosus luteus,

Ranunculus phragmites, p.

219. n. 592. sylvestris alterum genus, *ibid.* ranunculi

species tertia, quarta, *ibid.* ranunculus

nonus, nemorosus, *ibid.*

ibid. nemorosus albus, *ibid.*

n. 593. candidus, quarta species,

lactea, sylvarum, *ibid.* ranunculus

octavus phragmites, flore albo,

ranunculi tertii tertium & quartum genus, *ibid.*

Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus, p. 220. n.

594. minimus, Septentrionalium, *ibid.*

nemorosus hirsutus foliis caryophyllatae,

ibid. n. 595. pratensis, erectus,

acris, *ibid.* n. 596. pratensis surrectis cauliculis, sylvestris & secundus, hortensis

secundus, polyanthemus ma-

culatus, p. 221. n. 596. pra-

tensis repens hirsutus. p. 221.

n. 597. Ranunculus pratensis

radice verticillae modo rotunda,

Ranunculus bulbosus, p.

221. n. 598. radice bulbosa,

ibid. tuberosus, exiguus &

primus; ranunculi tertia species, *ibid.* minor, nona species,

ranunculus quintus lanuginosus primus, *ibid.* Arvensis

echinatus, p. 222. n. 599. ar-

vorum, arvensis angustifolius

sive decimus quartus, sylvestris

tertius, sativus, hortensis

simplicis prima species, sativus,

quinta species, *ibid.* Ranunculus

palustris Apii foliò lævis, p. 222. n. 600. rotundiore

foliò, foliò Apii tertius, primus. *ibid.*

primum ejus genus, tertius, p. 223. *ibid.* Palustris

apii foliò lanuginosus, *ibid.* n. 601. Ranunculi

secunda species, vel secundus, p. 223. n. 601. Aquaticus

foliò rotundò, &c. *ibid.* n. 602 aquaticus

Hepaticae facie, fluviatilis, *ibid.*

Ranunculus longifolius palustris

major, p. 223. n. 603. lanceatus

major, *πλάτυφυλλος*, *ibid.*

Palustris serratus p. 224 n. 604. aquatilis angustifol.

serratus lanceatus sive decimus

nonus

571

INDEX LATINUS.

- nonus, *ibid.* montanus Aconiti foliò, flore globosò, p. 225. n. 605. alpinus, luteus sive undecimus, sextus, montanus, alpinus, glomeratus, globosus sive montanus, *ibid.* Aconitifolius, folio rotundo *ibid.* ad radicem præstolante, *ibid.* n. 606.
- Raphanis magna, p. 226. n. 607
- Raphanus sylvestris, p. 225. n. 607. major, vulgaris seu rusticanus, crassa radice, agrestis, *ibid.* p. 226. aquaticus p. 227. n. 608. sylvestris officinarum aquaticus, *ibid.* aquaticus alter, *ibid.* n. 609. Raphanus pœna olim adulterorum, p. 226. n. 607. quomodo Raphanus vulgaris orbes stanneos vel ligneos attollat, p. 227. n. 607.
- Rapistrum aquaticum, p. 227. n. 609. flore luteò p. 228. n. 610. arborum, *ibid.*
- Rapum divi Antonii, p. 221. n. 598.
- Rapum genistæ, p. 186. n. 515.
- Rapi sylvestris genus, *vid.* Campanula pratensis flore conglomerato, p. 33. n. 86.
- Rapunculus spicatus, p. 228. n. 611. quintus, sive nemorosus primus, sylvestris, spic. albens, flore albò spicatò, *ibid.* rapunculus alopecuroides, *ibid.* Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo, p. 229. n. 612. scabiosæ capitulo candido, *ibid.* n. 613. Perlicifolius, magnò flore, *ibid.* n. 614. campanulatus Nerii folius primus, *ibid.* Rapunculum sylvestre, p. 228. n. 611. alopecuroides. *ibid.*
- Rapuntium majus Alopecuri, p. 228. n. 611. montanum capitatum leptophyllon, p. 229. n. 612.
- Regina Prati, *vid.* Barba capræ.
- Resta bovis, p. 16. n. 41.
- Rhamnus catharticus p. 230. n. 615. alia species, Rhamnus solutivus, *ibid.* salicis folio angusto, fructu flavescente; Rhamnus secundus, *ibid.* n. 616. primus Dioscoridis creditus p. 231. n. 616. Rhamnus quorundam, *ibid.*
- Ribes officinarum. item. Arabum, rubra, Fuchf. vulgaris, hortensis, vulgò, p. 121. n. 333. vulgaris nigrò fructu, it. sylvestris, nigra, baccis nigris, *ibid.* n. 334. sylvestris. p. 122 n. 335.
- Ribesum fructu nigrò, *vid.* Grossularia, p. 121. n. 334.
- Rickojothi quale antiquorum Prussorum Deastrum? p. 213.
- Ro-

INDEX LATINUS.

Robertiana & herba Roberti,
vid. Geranium Robert. p.
105. n. 276.

Robigo, p. 292. n. 759.

Rorella, p. 231. n. 617. minor
prima, *ibid.*

Ros Solis, p. 231. n. 617. foliò
rotundò, *ibid.* major, *ibid.*

Rosa sylvestris vulgaris flore o-
dorato, p. 231. n. 618. odo-
rata incarnato flore, ejus pri-
mum genus, *ibid.* p. 232. ca-
nina, odorata, sylv. altior. *ib.*

Rosmarinum sylvestre, *vid.* Ci-
stus Ledon, p. 49. n. 125.

Rostrum ciconiæ, *vid.* Gerani-
um cicutæ foliò p. 104.
n. 274. inodorum, item vul-
gare, *ibid.* n. seq.

Rubeola, *vid.* Asperula.

Rubertiana vulgò, *vid.* Gera-
nium Robertianum, p. 105.
n. 276.

Rubigo, p. 292. n. 759.

Rubus vulgaris sive fructu ni-
grò, p. 232. n. 619. primus
arvensis, grandis & secundus,
vulgaris. *ibid.* Batis *ibid.* re-
pens p. 233. n. 620. minor,
humilis Belgicus, humilis &
primus, *ibid.* rubi alterum
genus, reptans, *ibid.* idæus,
spinosus, idæus Diosc. *ibid.*
n. 621, idæus vulgaris, exili-
bus spinis, *ibid.*

Rubus tertius montibus proprius
p. 234 n. 621. saxatilis alpi-
nus, *ibid.* 622. parvus saxa-
tilis, alpinus, alpinus humilis,
ibid.

Rumex palustris *vid.* Lapathum
p. 135. n. 377. Rumicis quin-
tum genus, *ibid.* agrestis, *ib.*
n. 379. tertium genus, p. 136.
n. 381.

Russi quomodo pulvere clavo-
rum musci terrestres ignes su-
os celebrent Chaldaicos, ac
flammas ludicras excitent, p.
p. 170. n. 463.

Ruta pratensis, herbariorum, p.
267. n. 659.
S.

Saginx spergula, p. 13. n. 29.

74 Sagitta aquatica foliis variis p.
234. n. 623. aquatica, mi-
nor latifolia, sagittalis, sagit-
taria minor, *ibid.* Sagitta a-
quatica minor angustifolia,
p. 235. n. 625.

Salix prima vel procera, p. 235.
n. 626. Salix perticalis, quar-
tum genus, Dioscoridis, *ibid.*
vulgaris alba arborescens, *ibid.*
caprea rotundifolia, p. 236.
n. 627. latò foliò, latifolia,
rotunda platiphyllis, alia *ibid.*
vulgaris rubens, *ibid.* n. 628.
primum item tertium genus,
ibid. Salix Sabina feu Ame-
rina,

INDEX LATINUS.

- rina, minor, viminalis & Gallica, p. 237. n. 628.
- Salix caprea latifolia, p. 237. n. 629, folio ex rotunditate acuminatò, *ibid.* sylvestris latifolia, *ibid.* n. 630. sylvestris angustifolia p. 238. n. 631. alterum genus fativalutea tertia, vitellina, *ibid.* fragilis latifolia, salicis tertium genus & salix alba, candida, candidò cortice *ibid.* n. 632. fragilis tenuifolia, *ibid.* n. 633.
- Salix rubra obtusò latiore folio, p. 239. n. 634. oblongò salviæ folio, *ibid.* n. 635. humilis angustiore oblongo folio, *ibid.* n. 636. pumila angustifolia prima, *ibid.* n. 637. altera pumila angustifolia, *ibid.* pumila brevi angustòque foliò incanò. *ibid.*
- Salix Amerina olim erat coronamentum, p. 239. n. 637.
- Salsiflora, p. 231. n. 617.
- Sambucus, p. 240. n. 638. Ejus primum genus, fructu in umbellà nigrò, vulgaris, campestris, *ibid.*
- Sambucus olim erat domicilium Putschæti tutelaris numinis, cui rustici quondam litare soliti sunt ad propitium ipsis reddendum Marcopolum Deum Magnatum, p. 241.
- Sambucus glires & mures fugat. p. 243. n. 638.
- Sambucus humilis sive Ebulus, p. 243. n. 639.
- Sambucus aquatica flore simplici p. 243. n. 640. Sambucus palustris, *ibid.* p. 244. Syrupus ejus ex succo affectibus faucium salutaris, *ibid.* p. 244. Baccæ emeticæ sunt, *ibid.*
- Sanctum derivatur à sagminibus, p. 282. n. 729.
- Sangven *vid.* Cornus, p. 55. n. 139.
- Sangvinaria *vid.* Gramen dactylon, p. 110. n. 289.
- Sangvinaria, p. 201. n. 552.
- Sanicula, Officinarum, p. 244. n. 641.
- Sapinus quid? p. 1. n. 1.
- Saponaria major lævis, p. 244. n. 642. in lue Gallicà utilis, *ibid.*
- Sardous ranunculus, p. 223. n. 601.
- Satureja hortensis, fativa, p. 245. n. 643.
- Satyrion octavum, *vid.* Helleborine, p. 123. n. 339.
- Satyrion decimum, p. 180. n. 500. Satyrion foemina foliis maculatis, p. 181. n. 505. Satyrion foemina, *ibid.* Satyrion Basilicon Græcorum, *ibid.* Satyrion Basilicon foemina, *ibid.*

INDEX LATINUS.

- Satyrion aborrivum species
 Hypocyti, p. 184. n. 511.
 Satyrium novum, *ibid.*
 Savina sylvestris, p. 170. n. 464.
 Savina sylvestris Tragi, *ibid.*
 Savina Tragi sylvestris seu si-
 laginis Plinianæ prima species
 p. 170. n. 464.
 Saxifraga rotundifolia alba, p.
 245. n. 644. Chelidonides
 dicta. *ibid.*
 Saxifraga lutea, p. 161. n. 436.
 Saxifraga Anglica, p. 203. n.
 556. Saxifraga rotundifolia
 aurea, p. 246. n. 644.
 Saxifragia, *vid.* Saxifraga.
 Saxum ingens in frustra artificia-
 liter redigere, p. 215.
 Scabiosa major squamatis capi-
 tulus flore purpureo p. 240.
 n. 646. flosculis candidissi-
 mis, *ibid.* n. 647.
 Scabiosa pratensis hirsuta officina-
 rum seu vulgaris, p. 247.
 n. 648.
 Scabiosa multifido folio, flore
 flavescente, p. 247. n. 649.
 Scabiosa sylvestris minor cœru-
 lea p. 229. n. 612. media,
 ferrato angustifolio flore glo-
 bulariæ, *ibid.*
 Scirpi primum genus, *vid.* Gra-
 men arundinaceum, p. 118.
 n. 321. Scirpi alterum ge-
 nus, p. 119. n. 322.
 Scordium, p. 247. n. 650. ma-
 gnis & multis virtutibus pol-
 let, *ibid.*
 Scorpioides tertium, p. 63. n.
 151. minus, aquaticum, *vid.*
 Echium, p. 63. n. 151. majus
 Dodonæi, p. 64. n. 153.
 Scorzonera foliis nervosis, Ger-
 manica, p. 248. n. 651.
 Scrophularia aquatica major cau-
 le *fimbriato*, p. 248. n. 652.
 Tineis & phagedænæ mede-
 tur, *ibid.* p. 249. Amule-
 tum præstat, *ibid.* p. 250.
 Scrophularia, nodosa foetida, p.
 250. n. 653. multis morbis
 medetur, *ibid.*
 Securidaca, p. 250. n. 654.
 Sedum aquatile, *vid.* Aloe pa-
 lustris. Sedum majus vulgare,
 p. 251. n. 655. Sedum mi-
 nus, *vid.* sempervivum minus.
 Selago tertia, p. 169. n. 462. Se-
 laginis species altera, *ibid.* n.
 463.
 Sempervivum majus, p. 251. n.
 655. Sempervivum minus ver-
 miculatum acre, p. 251. n.
 656. Sempervivum caulicu-
 lis repentibus, p. 252. n. 657.
 Senecio minor vulgaris, p. 252.
 n. 658. inflammationi mam-
 marum, nec non ictui ap-
 medetur, *ibid.*
 Seriphium Germanicum, p. 177
 n. 491.

INDEX LATINUS!

n. 491. *Seriphium absynthi-*
um, *ibid.* *Seriphium ibid.*
Seris Picris, vid. *Cichoreum syl-*
vestre.
Serpillum vulgare majus, p. 253.
n. 659. *Serpillum minus, ibid.*
n. 660. *Serpillum minimum*
repens, flore candido, ibid.
n. 661.
Serratula, p. 253. n. 662.
Serretta five Ceretta, Vid. *Serra-*
tula.
Sesamoides magnum Salmanti-
cum, p. 149 n. 413.
Sesamum. p. 174. n. 484.
Seseli Æthiopicum, p. 253. n. 663
Sideritis vulgaris hirsuta erecta,
p. 254. n. 664. *Sideritis ar-*
vensis latifolia glabra, p. 255.
n. 665. *Sideritis arvensis an-*
gustifolia rubra, p. 255. n. 666
Sideritis prima Heraclia, p. 160.
n. 433. *Sideritis secunda*
Matthioli, ibid.
Sideritis secunda Dioscoridis. p.
196. n. 539. *Sideritis cæ-*
rulea, p. 156. n. 425.
Sigillum S. Mariæ. vid. *Helle-*
borine, p. 124. n. 339. *Sigil-*
lum S. Mar. tertium, ibid. n.
341.
Sigillum Salomonis, latifolium,
p. 200. n. 550. *angustifoli-*
um p. 201. n. 551.
Siler Plinii, vid. *Evonymus*, p.
70. n. 173.

Sinapis agrestis, p. 228. n. 610.
Sion, Sium, five Apium palustre
foliis oblongis, p. 254. n. 667
Sion Cratevæ Erucæfolium. p.
176. n. 489.
Sifer sylvestre, vid. *Pastinaca*
sylvestris, p. 189. n. 524.
Sisymbrium aquaticum, p. 176.
n. 489. *Sisymbrium aquati-*
cum primum, ibid. *Sisymbri-*
um Cardamine, ibid. *Sisym-*
brium alterum, ibid. *Sisym-*
brium alterum Dioscoridis,
ibid. *Sisymbrium aquaticum*
secundum, ibid. n. 490. *Si-*
symbrium Cardamine secun-
dum ibid. *Sisymbrium syl-*
vestre, p. 227. n. 608.
Sisyrinchion p. 186. n. 514.
Smilax lavis, vid. *Convolvulus*,
p. 51. n. 131. & seq.
Snips quid? p. 260. n. 754.
Solanifolia Circaea dicta major,
-p. 256. n. 668.
Solanum officinarum &c. p. 256
n. 669. *Solanum scandens*
feu dulcamara, p. 256. n. 670
Solanum quadrifolium bacci-
ferum, p. 257. n. 671.
Solidago Saracenica latifolia &
angustifolia ferrata, p. 286.
n. 742. 743.
Sonchus asper, p. 258. n. 674.
Sonchus asper laciniatus lati-
folius, p. 257. n. 672. *Son-*
chus

INDEX LATINUS.

778
779

chus angustifolius, p. 258. n. 673. lævis lanceatus angustifolius, *ibid.* n. 674.

Sonchus lævis minor paucioribus laciniis, p. 259. n. 676. Sonchus laciniatus latifolius, *ibid.* n. 677. Sonchus laciniatus muralis parvis floribus, *ibid.* n. 678.

Soncho affinis, Lampfana sylvatica, p. 259. n. 679.

Sophia Chirurgorum, p. 177. n. 491. Sophia, *ibid.* Sophia latifolia, *ibid.*

Sorbus sylvestris domesticæ similis, p. 260. n. 680. contra calculum & Ischuriam facit, *ibid.*

Sorbus aculeata, *vid.* Mespilus, p. 163. n. 441.

Stoechas citrina, *vid.* Elichrysium, p. 64. n. 155.

Sparganium ramosum, p. 260. n. 681.

Spergula, p. 13. n. 29.

780

Spergula bifolia lini capitulis, p. 261. n. 682. Spergula perpusilla lanceatis foliolis, p. 261. n. 683.

781.

Spica Celtica p. 169. n. 463.

782

Spina alba tomentosa latifolia sylvestris, p. 261. n. 684.

Spina cervina, alba, infectoria, pumila prima, p. 230. n. 615. cervalis, *ibid.*

Spondylium vulgare hirsutum, p. 262. n. 685. ridiculam præbet historiam, *ibid.*

Sponsa Solis, p. 231. n. 617.

Sportulæ quid? p. 207. n. 569.

Sputatores adversus & tussientes singularis antipathia mulieris cujusdam, p. 282. n. 730.

Sqmamatia, *vid.* Orobanche, p. 187. n. 517.

Staphylinus sylvestris, *vid.* Patrinaca sylv. p. 188. n. 522.

Stuppars, *vid.* Conyza, p. 54. n. 137.

Stelis quid? p. 1. n. 1.

Stellaria, *vid.* Alchimilla, p. 7. n. 13.

D. Stephani herba, p. 256. n. 668.

Straminea aut scirpea antiquorum simulachra in spectaculis adhibita, quid sint, p. 118. n. 321.

Stratiotes, *vid.* Aloe palustris.

Stratiotes millefolia, 164. n. 442.

Stratiotes fluviatilis, p. 166. n. 448.

Succisa hirsuta cœrulea, s. Morsus Diaboli p. 262. 263. n. 686.

Herba polychresta est, *ibid.*

Succisa hirsuta candida, hirsuta cœrulea p. 263. n. 687. foliis incisis laciniatis, p. 263. n. 688.

Su-

INDEX LATINUS.

Superba, *Vid.* Caryophyllus plu-
marius albus.

Symphytum, Consolida major,
p. 264. n. 689. ungventum
hopliatricum Anshelmi, *ibid.*
Symphytum maculosum, seu
Pulmonaria latifolia, p. 265.
n. 690. Symphytum Petræ-
um. p. 208. n. 573.

Symphytum medium, *vid.* Con-
solida media, p. 50. n. 128.
T.

Tanacetum vulgare luteum, p.
256. n. 691. Helminthago-
gum est hydropicū & diure-
ticum, *ib.* p. 268. Tanacetum
foliis crispis, p. 268. n. 692.
Tanacetum album seu acutum,
vid. Dracunculus pratensis, p.
63. n. 150.

Taraxacon minus, *vid.* Dens le-
onis, p. 61. n. 165.

Taxus, p. 266. n. 693. scobsta-
xi canibus rabidis medetur, *ib.*

Telephium vulgare, p. 266 n.
694. superstitiosè usurpatur
à vulgo. p. 267. n. 694.

Testiculus vulpinus primus, cu-
jus flores culices exprimunt,
p. 181. n. 503. Testiculus
latifolius, *ibid.* Testiculus bi-
folius, *ibid.* Testiculus mu-
scarius quartus p. 183. n. 508

Teucrium, *vid.* Chamædri spu-
ria major.

Teucrium, *Vid.* Veronica.

Thalictrum majus filiquâ angu-
losâ aut striatâ, p. 267. n. 695.

Thalictrum pratense angustifo-
lium, *ibid.* n. 696. Thali-
ctrum angustissimò foliò, p.
268. n. 697.

Thalictrum p. 177. n. 491. Do-
donæi, *ibid.* Sophiæ, *ibid.*

Thapsus barbatus, *vid.* Verba-
scum mas, p. 279. n. 726.

Theligono affinis herba, p. 246.
n. 644.

Thilypteris filix fœmina, p. 74.
n. 183.

Thlaspi arvense filiquis latis, p.
268. n. 698. Thlaspi fruti-
cosum incanum, *ibid.* n. 699.

Thlaspi alterum p. 225. n. 607.
majus vel magnum, p. 226.
n. 607.

Thymbra vera & fativa, *vid.* Sa-
tureja hortensis.

Thymelæa, p. 138. n. 388.

Tilia fœmina folio majore, p.
268. n. 700. arbor Borussis
olim idololatrica fuit, p. 269
n. 700.

Tiliæ lignum teredinis expers,
p. 268. n. 700. Tiliæ lignum
materia simulachrorum fuit,
ibid. Tiliæ cortex materiam
funibus rebusque aliis paran-
dis præbet, *ibid.* Tiliæ scobs
aurum subito colliquari facit,
p. 269. n. 700.

Ti-

INDEX LATINUS.

- Tithymalus helioscopius*, p. 269
n. 700.
- Tithymalus sylvestris* *vid.* Balsamine lutea.
- Tomentum seu centunculus*, *vid.* Gnaphalium, p. 107. n. 181.
- Tormentilla sylvestris*, p. 270.
n. 702.
- Trachelium vulgare*, foliis urticae; *vid.* Campanula vulgarior.
- Trachelium minus*, p. 33. n. 86.
- J43* *Tragopogon luteum abortivum*
p. 270. n. 703. *Tragopogon pratense luteum majus*
p. 270. n. 704.
- Tragopogon majus*, p. 194.
n. 537.
- Tragopogon petraeum*, p. 195.
n. 538.
- Tragum, Tragon, vel Tragus*,
vid. Kali, p. 133. n. 371.
- Tribulus aquaticus* p. 271. n. 705. *Tribulus olim Thracibus panem subministrabat*, *ib.*
- Trifolium palustre, fibrinum, Castoris. &c.* p. 271. n. 706.
- Trifolium pratense purpureum*, p. 272. n. 707. *Trifolium album*, p. 272. n. 708.
- Trifolium luteum capitulo brevior*, *ibid.* n. 709. *Trifolium pratense luteum capitulo lupuli, vel Agrarium*, p. 273. n. 710. *Trifolium montanum album*, *ibid.* n. 711.
- Trifolium purpureum majus*, *ibid.* n. 712. *Trifolium spicatum longissimum rubente*, p. 273. n. 713. *lac auget* p. 274. n. 713. *Trifolium arvense humile spicatum, sive lagonum*, p. 274. n. 714. *Trifolium sylvestre luteum siliqua cornuta*, p. 274. n. 715. *Trifolium acetosum vulgare*, *ib.* n. 716. *hepaticum flore simplicis*, p. 275. n. 717.
- Trifolium frugiferum*, *Vid.* Fragaria vulgaris, p. 75. n. 188.
- Trifolium hepaticum flore simplicis*, p. 275. n. 717.
- Trifolium odoratum s. Melilotus*, p. 161. n. 436. *Trifolium odoratum primum Dodonæi*, *ibid.*
- Triglochin*, *Vid.* Gramen junceum, p. 114. n. 308.
- Trinitas, Trinitatis herba*, p. 275. n. 717.
- Trinitatis flos*, p. 285. n. 741.
- Trips, qualis vermiculus*, p. 291.
n. 754.
- Triticum vaccinum*, p. 160. n. 434.
- Trollius flos*, p. 225. n. 605.
- Tunica minima*, *Vid.* Caryophyllus minimus muralis.
- Turca*, p. 202. n. 554.
- Tussientes adversus & sputatores singularis antipathia*, p. 282. n. 730. *Tussi-*

INDEX LATINUS.

Tussilago vulgaris p. 275. n. 718. lanugo ejus certo modo præparata fomitem igniarum tenerrimum subministrat p. 276. *ibid.* Tussilaginatum optimum loco Tabaci præparare, *ibid.*

Tussilago altera, p. 31. n. 83.

Tussilago major, p. 192. n. 531.

Typha palustris major, p. 277. n. 719.

V.

Vaccinia nigra, p. 288. n. 748.

Vaccinia rubra, *ibid.* n. 749.

Vaccinia palustris, *ibid.* n. 751.

Valeriana sylvestris major, item vulgaris, p. 277. n. 720. Semen catharticum est *ibid.* p. 278. Radix loco amuleti oculos confortat, *ibid.*

Valeriana Græca, cœrulea, peregrina, p. 278. n. 721. palustris minor, *ibid.* n. 722. campestris inodora major, *ibid.* n. 723.

Valeriana palustris foliis subrotundis parum incilis, p. 279. n. 724.

Venti herba, p. 209. n. 575.

Verbasculum pratense odoratum p. 279. n. 725. Verbascum mas latifolium luteum, *ibid.* n. 726. Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascens,

ibid. n. 727. nigrum flore candido, *ibid.* n. 728.

Verbasci lanugo certo modo præparata fomitem igniarum tenerrimum præbet. p. 276. n. 718.

Verbena communis cœruleo flore p. 251. n. 729. Verbena recta, *ibid.* Verbenaca *ibid.* Verbena supina, *ibid.*

Verbena supina, p. 34. n. 89.

Verbena supina, item recta, *vid.*

Conyza palustris, p. 53. n. 137.

Verbena foemina, *Vid.* Senecio minor vulgaris.

Veronica mas supina & vulgarissima, p. 182. n. 730. Veronica spicata angustifolia, recta p. 283. n. 731.

Veronica pratensis serpillifolia, *ibid.* n. 732.

Vetonica, *Vid.* Betonica.

Vicia sepium folio rotundiore acuto, p. 283. n. 733. Vicia multiflora hirsuta, cœrulea, p. 284. n. 734. purpurea, p. 284. n. 735. candida glabra, *ibid.* n. 736.

Vicia semine rotundo nigro, p. 284. n. 737. Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis, p. 284. n. 738.

Victoralis rotunda, *vid.* Gladiolus, p. 105. n. 277. Victo-

INDEX LATINUS.

rialis herba, *ibid.* foemina, *ibid.*
 Vincetoxicum, *Vid.* Asclepias.
 Vicia martia, purpurea flore simplici odore, p. 285. n. 739. Viola inodora sylvestris, *ibid.* n. 740. Viola tricolor hortensis repens, *ibid.* n. 741. Viola flammea, *ibid.*
 Viola aquatilis, p. 166. n. 448.
 Virga aurea, Solidago Saraceni-
 ca dicta, latifolia & angustifolia ferrata, p. 286. n. 742. 743. Virga latifolia ferrata, p. 287. n. 744. vulneraria est & lithontriptica, *ibid.*
 Virga pastoris major, *vid.* Dipsacus p. 62.
 Virga sanguinea, *vid.* Cornus, p. 55. n. 139. Ossea, *ibid.*
 Virgula divinatoria quomodo paretur, p. 56. n. 140.
 Virgulæ metallorum indagatricis materies est Corylus, p. 56. n. 140. illa quomodo cædatur & tractetur, *ibid.*
 Viscum, p. 287. n. 745. quercus & Coryli antepilepticum est, pyri sylvestris contracturas sanat, *ibid.* p. 287. 288.
 Viscum fraxini baccis ex albo luteis, p. 288. n. 746.
 Vitis Idæa foliis subrotundis exalbida, p. 288. n. 747. Vitis foliis oblongis crenatis fructu nigricante, p. 288. n. 748

Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis baccis rubris, p. 289. n. 749. Vitis Idæa foliis oblongis non crenatis baccis rubris, *ib.* n. 750. Vitis Idæa palustris, *ibid.* n. 751. Vitis Idæa Rorismarini folio aversâ parte albido & nervoso, *ibid.* n. 752.
 Vitis nigra, *vid.* Bryonia alba p. 29. n. 75.
 Ulmaria vulgi, *vid.* Barba capræ.
 Ulmus p. 289. n. 753. vulneraria est, *ibid.* Ulmi præcox foliorum decidium pestem jumentis portendit, *ibid.* p. 260. Ulmo affinis arbor, *ibid.* n. 754.
 Ungula Caballina, *vid.* Tussilago
 Urinæ incontinentia auditu Phormyngis aut Screatûs. p. 282. 283. n. 730.
 Urinaria, *vid.* Dens leonis, p. 61. n. 165.
 Urtica vulgaris mortua, labeo foemina, iners *vid.* Lamium, p. 133. n. 372. non mordax vulgaris, foetens, purpurea, iners altera, *ibid.* n. seq. iners tertia, sexta tabea, p. 34. n. 374.
 Herculea, undecima, foetida maxima porphyranthemos, *ibid.* n. seq.
 Urtica urens maxima, cui usui inserviat? p. 291. n. 755.
 Urtica sceptrum ministravit Antigono, p. 292. n. 756.
 Ur-

INDEX LATINUS.

- Urtica fatua sylvestris p. 292.
 n. 758. aculeata, p. 291. n.
 755. Urtica urens maxima
 five major, p. 291. n. 756.
 Urtica urens minor, p. 292.
 n. 757.
- Urtica aculeata foliis non serra-
 tis, p. 292. n. 758.
- Ustilago, p. 292. 293. Ustilago
 pictoribus colorem fuscum
 suppetitat, *ibid.* n. 759.
- Ustilago Tritici, p. 292. n. 758.
 Ustilago fecalis, p. 292. n.
 759. Ustilago hordei, p. 293.
 n. 760. Ustilago avenæ, p.
 293. n. 761.
- Ufnea Officinarum, p. 171.
 n. 472.
- Uvularia major, *vid.* Campanu-
 la vulgarior.
- Uvularia exigua in pratis, p.
 33. n. 86.
 X.
- Xanthium Dioscoridis, p. 137.
 n. 384. Xanthion seu Lappa
 minor, *ibid.* Xanthium seu
 frumaria, *ibid.*
- Xiphium seu gladiolus cœru-
 leus minor, *vid.* Iris pratensis,
 p. 130. n. 363.
- Xiphion-Spatha, *vid.* Gladio-
 lus p. 105. n. 277. Xiphi-
 on minus, *ibid.*
- Xylosteum, *vid.* Chamæcerasus
- Xyris minor, *vid.* Iris pratensis
 p. 130. n. 363.

FINIS.

Corrigenda.

Numerus prior paginam, alter lineam,
 l. lege, denotat.

3. 15. tufa l. tusa. 6. 19. Ackerwurz / 1. Ackerwurz.
 17. 29. Reib-Kraut / 1. Reib-Kraut. 21. 30. Artractylis
 l. Atractylis. 22. 20. Schweiß l. Scheiß. 23. 26. Greiß/
 Bart l. Geiß-Bart. 24. 15. Viperibus l. visceribus. 24. 29.
 Camp. l. Cam. 27. 3. addit l. additur. 27. 3. dilucior l. dilu-
 cidior, 27. 4. incolo l. in colo 29. 24. Card. l. Cord. 35. 28.
 Cer-

CORRIGENDA.

Cerdopatium. 1. Cardopatium. 36. 23. **Burnf.** 1. **Brutnf.** 37. 5. cat-
 tharros 1. catarrhos. 39. 25. **stipatis** 1. **stipatos**. 41. 1. **flosculi** 1. **flos**
Cuculi. 58. 6. **Renano** 1. **Re anno.** 78. 26. **illis** 1. **locis**
 79. 6. **fari** 1. **favi.** 96. 23. **punulis** 1. **punctulis.** 98. 4. **fos-**
sulum 1. **fossulam.** 98. 7. **Spithamum** 1. **spithamam.** 123. 14.
Hippocomis 1. **Hippocamis.** 139. 3. **Traog.** 1. **Trago.** 164
 12. **Cod.** 1. **Cord.** 179. 13. **Thab.** 1. **Tab.** 196. 24. *vox Ga-*
bata deleatur. 219. 1. *lege ita: pag. 326. Roth Wasser-*
Sünff Finger Kraut. In pratis uliginosis passim. DXCII.
Ranunculus Nemorosus Luteus. C. B. Pin. pag. 178. &c.
 22. 24. **levis** 1. **lævis.** 234. 1. **retrius** 1. **tertius.** 279. 1.
Valeriana. 1. * **Valeriana.** 2 85. 10. **Lond.** 1. **Lonic.**

Corrigenda in Indice Latino.

Ss, Tt 2, Vv 3 &c. folia quaternionum, literæ *a, b, c, d,*
 quatuor columnas singulorum foliorum, numeri
 lineam Columnarum denotant.
Ss, 3. a. 6. **mera** 1. **rubra.** **Ss. 4. c. 17.** **Belis** 1. **Bellis.** **Tt. c. 17.**
Canis 1. **Cania.** **Tt. d. 33.** **Carcum** 1. **Carvum.** **Tt 2. b. 21.** **Cer-**
dopatium 1. **Cardopatium.** **Vv. c. 16.** **metricius** 1. **meretricius.** **Vv 2.**
b. 24. **Geranii** 1. **Geranium.** **Xx. 2. c. 31.** **pro 41 f. l. 423.**
Yy c. 31. **musculosa** 1. **maculosa.**






Num. 1. ad pag. 10.



*Alnus cum nulis floribus et
fructibus.*

Num. 2. ad pag. 12.

Alsine marina foliis
Portulacae.







Alsine bifolia fructu
Coriandri radice ge-
niculata¹.

Num. 3 ad pag. 13.




Atractylis aculeata foliis maxime
laciniatis, capitulis albis.



Num. 4. ad pag. 21.





No. 5. ad pag. 34.



Carduus spinosissimus

angustifolius


Vulgaris, C. D.

N^o. 6 ad pag. 37

Caryophyllata
flosculis elegantissimis.


prolifera.





N^o. 7 ad pag. 39,

Coronilla arvensis calyculo florum numeroso.



Nº 8 ad pag. 43.



Chamacistus vulgaris flore luteo, C.B.



No. 9 ad pag. 47



*Chrysanthemum
foliis Tanacetii.*

N^o. 10. ad pag. 53.



*Comiza palustris foliis
tripartito' divisis.*





No. 11. ad pag. 54




Comyla palustris
foliis serratis

No. 12. ad pag. 67.



*Equisetum sub aqua
repens foliis bifurcis.*



N^o. 13. ad pag 68.

Eruca sylvestris minor foliis
Subasperis in orbem sparsis.



N^o. 14 ad pag. 69.

Erysimum hirsutum
Siliquis Erucae.









№. 15. ad pag 77.

Fucus marinus πολυχιδύς.




Fungus pyxioïdes seminifer.







N^o. 17. ad pag. 99.
Fungus digitatus alveariorum.



N^o. 18 ad pag 103



Geranium columbinum
erectum tenuius laciniatum
flore magno.






No 19. ad pag 104. *Geranium Columbinum procumbens*
tenuius laciniatum flore parvo.



N^o. 26 ad pag. 306

Glaux aquatica folio subrotundo







N^o. 21 ad pag. 108.

Gramen
lentum


maria scu
Prutenicum.




Nº. 22 ad p. nò.



*Gramen montanum
odoratum spicatum.*






No. 23 ad p. 110.
Gramen arvense spica


*compacta
divulsa.*



N^o. 24. ad pag. 110.



Gramen Cristatum
radiculis nigricantibus.





Nº: 25. ad pag. III.


*Gramen paniculatum molle
paniculâ dilutè cœruleâ.*



Nº. 26. ad pag. III



Gramen Maritima Borussorum.





N^o. 27. ad pag. 112.





Gramen Caryophyllatum

polycarpon fructu
triangulo.



Gramen junceum aquaticum Semine racemoso.






N^o. 29. ad pag. 115.

Gramen junceum Semine


acuminato




Nº. 30. ad p. 116.

Gramen Cyperoides palustre spica pendula.







No. 31. ad pag. 116.
Gramen Cyperoides minus
repens spicā divisā.




N^o. 32. ad pag. 117.

Gramen Cyperoides

spicis curtis divulsis.







Nº. 33. ad. pag. 119

*Gramen arundinaceum foliis acutissimis,
panicula multiplici, cyperi facie.*



Nº. 34. ad pag 119



*Gramen arundinaceum
panicum divisa panicula*






Nom. 38 ad 129



Jacobaea Barbarea
instar laciniata .

No. 36 ad pag. 131 Juncellus

cyperoides capitulo
Simplici.










*Lathyrus angustifolius radice
tuberosa.*



N^o 38 p. 140. *Lenticula palustris angustifolia* folio
in apice dissecto.







N^o. 39 ad p. 142.




Linaria maritima
floribus odoratis.

Nº. 40 ad pag. 150.




Lychnis Sylvestris Viscosa
foliis Oritiis.






N^o. 41 ad p. 156.




Lysimachia hirsuta
purpurea flore galericulato.

N^o. 42 ad p. 167.
Muscus pennatus major
Cauliculis ramosis, in Sum-
mitate Veltit spicatus.







N^o. 43 ad p. 167.


*Muscus pennatus minor Cauli-
culis ramosis, in Summitate
Velut spicatus.*



N^o. 44. ad. p. 267.



Muscus filicinus minor repens.





N^o. 45. ad pag. 167.

*Muscus bifolius procumbens foliis
Subrotundis.*



N^o. 46. p. 168.



Muscus ramosus erectus oblongifolius N^o. 47.



Muscus erectus foliis in orbem sparsis.






N^o. 48. ad pag. 168.

Muscus cupressiformis ramosus.



Muscus membraneus pilosus. N^o. 49.



Muscus arboreus pyxioides pilosus. N^o. 50. p. 171








№. 51. ad pag. 172

Muscus marinus λιθοπύγων
dictus.



Musculus aquaticus No. 52 p. 172
Ceratoides.








Muscus aquaticus denticulatus No. 53. pag. 173.



N^o. 54. ad p. 373.

Musculus aquaticus bombycinus
retiformis.








N^o. 55. pag. 173.

Muscus aquaticus bombycinus
tenuissimis filamentis.



No. 56. pag 174.



Myagrum monospermon hirsutum
siliquis rotundis.





Nº. 57. pag. 180.



Ophrys sphegodes bulbosa.

Nº 58 pag. 180.

Ophrys diguilloi bulbosa.







No. 59. p. 182.
Orchis palmata flore galericularo
dilute viridi.



No. 60. ad pag. 183.



Orchis muscae corpus referens maculosa.


THE LIFE OF



OF



Nº 61. pag 184.




*Orchis Coleo unico, Seu
Monorchis flosculis pallide
Viridibus.*

N^o. 62. ad pag. 199.



Plantago aquatica
Λέντονα κρόφυλλος.





N^o. 63. ad pag. 203.



Polygonum foliis gramineis
Spergular Capitulis.

No. 64. ad pag. 204.
Polygonum foliis gramineis
alterum.







Potamogeton rotundifolius alterum

No. 66. pag. 206.

Potamogeton gramineum
latifolium








No. 67. pag. 206

Potamogeton


tenuifolium

gramineum



N^o. 68. ad. pag. 210

Tyrola acutifolia polyanthos
radice genicu latâ.










Quercus florida.



Quinqvesolum hirsutum
luteum paucioribus
lacinis





N^o 71. ad pag. 220.

Ranunculus nemorosus hirsutus
foliis Caryophyllatæ.



No. 72. ad pag. 225.



Ranunculus aconitifolius
folio rotundo ad radicem
praestolante.






N^o. 73. ad pag. 229.


Rapunculus scabiosae capitulo canitido.






Sagittaria aquatica
folius variis.







N^o. 85. pag. 280.



Viscum fraxini baccis ex albo luteis.





N^o. 75. pag. 248.



Scrophularia aquatica
major Caule fimbriato.

N^o. 76. pag. 256.



Sion sive Asium

palustre foliis variis.






No. 77. pag. 257.




Sonchus asper laciniatus
latifolius.

N^o. 78. ad pag. 258.



Sonchus asper laciniatus
angustifolius.






N^o. 79. pag. 258.




Sonchus lavis lanceatus
acutifolius.

N^o. 80. p. 261.



Spargula
Capitulis. *bifolia* Linn








Spargula perpusilla lanceatis foliolis .



Spina alba
latifolia Sylvestris.

tomentosa
C.B.





No. 83. pag. 270.



Tragopogon luteum abortivum.

N^o. 84. pag. 279.



Valeriana palustris
foliis subrotundis

1765 pl. 1
defunct 1774
275



Alnus - - - - - 1.
Alnus Marina

Wm. G. Linder, Carewood. March 27. 1750.







cont
229

101



V

1/11

